Supplemento straordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 215 del 6 agosto 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 agosto 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

MINISTERO DELLA SANITÀ

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° luglio 1983-31 dicembre 1983, indicati nell'elenco n. 20.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° luglio 1983-31 dicembre 1983, indicati nell'elenco n. 20 . . . . . *Pag.* VII

N. Registrazione	Denominazione prodotto		
0135	ZINEB 80	*Pag.*	1
0208	PASTA SARIAF	»	2
0298	CUPRIN	»	3
0300	CUPRIN S.	»	4
0314	TIOCUPRIN «S»	»	5
0368	DACONIL 2787	»	6
0526	FOLPET ramato BLU BAYER	»	7
0599	ACUPRICO	»	8
0602	FONOFOS SHELL DYFONATE 5 GRANULI	»	9
0732	DANICAR	»	10
0780	ACARICIDA 8	»	11
0801	DISERBO MAIS	»	12
0935	ANTRACOL ramato BLU	»	13
0936	ANTRACOL RAMATO	»	14
0961	LONACOL BLU	»	15
0973	POMARSOL 50	»	16
0985	DICONTAL	»	17
0987	STOP-RIS	»	18
1097	PARACOCCIDOL	»	19
1163	RO-NEET	»	20
1230	SANVEX 25 PS	»	21
1362	PRUNIG	»	22
1380	ATRED liquido	»	23
1584	WARTANE L.E.	»	24
1585	ZOLFO COLLOIDALE CAFFARO «85»	»	25
1613	ANTRACOL	»	26
1840	VITIGRAN CONC.	»	27
1881	ELOSAL	»	28
1916	TELONE	»	29
1917	POMARSOL Z f.	»	30
2008	ORTHOFAT	»	31
2040	LINURON 50	»	32
2043	TANOL E.C.	»	33
2055	FOLIOL 80	»	34
2216	FARAN	»	35
2333	E 605 POLVERE	»	36
2403	MILCOZEBE	»	37
2405	BLADAN M 20	»	38
2477	DERVAN	»	39
2483	ANTIGRAM	»	40
2540	CUPRAVIT BLU	»	41
2560	ANTILIMAX	»	42

2592	IMIDAN 50-WP	» 43
2632	MORESTAN	» 44
2698	ATRAB LIQUIDO	» 45
2710	TOPICIDA ASTERIAS P.E.	» 46
2805	CUPROLENE	» 47
2808	BIRGIN	» 48
2817	CRONETON 10 Granulare	» 49
2835	RONILAN	» 50
2861	AMIBEN Liquido	» 51
2892	CABOR 50 PB	» 52
2960	PARA - RAVIT 80	» 53
2987	LONACOL ramato blu	» 54
3034	VALQUAT	» 55
3043	FOLITHION	» 56
3076	MESUROL - Esca	» 57
3100	GESAL ORTO CARBARYL	» 58
3132	SEPR - OIL	» 59
3174	LONACOL ramato	» 60
3181	VITAR	» 61
3273	ETAZIN R BLU	» 62
3320	ANTRACOL Blu	» 63
3322	M 70	» 64
3356	CUPRAVIT MICRO blu	» 65
3391	CAPTAN 83 - BAYER	» 66
3482	ORTHOCIDE 83	» 67
3590	SCALDEX	» 68
3626	RISCALD CONTROL	» 69
3677	BAVIN 85	» 70
3702	STOP SCALD	» 71
3765	FUMISOL	» 72
3772	IPRODIAL	» 73
3801	DALPIR	» 74
3848	CAPTAN BAYER	» 75
3852	DAITAL M	» 76
3859	DURSBAN	» 77
3860	DURSBAN 12	» 78
3864	TERIAL 40 L	» 79
3912	HIVAR X-4 L	» 80
3914	HIVAR X	» 81
3937	AGER ATRA L	» 82
3972	ORTHOCIDE 50	» 83
3993	UNDENE polvere	» 84
4004	BAPAR 20	» 85
4006	BAFOS	» 86
4007	BARIN	» 87
4008	BAPAR 10 G	» 88
4047	BAYLETON	» 89
4197	PROLIN	» 90
4214	AVIOCAFFARO	» 91
4243	VIRICUIVRE MICRONISE	» 92
4281	LORZENE FLOW	» 93
4347	PRESAN	» 94
4398	BROMET	» 95
4338	SEZIN R BLU	» 96
4422	ANTRACOL RAMATO MICRO BLU	» 97
4428	CEREALENE N	» 98
4429	PRODIX	» 99
4450	POLIBARIO-STI 42	» 100
4651	SUMISCLEX	» 101
4680	PHORATE AMONN DARLEM G	» 102
4690	POLVERE TIPO BORDOLESE	» 103
4701	«PIRIMOR» M.G.F.	» 104
4749	LEBAYCID	» 105
4791	LUMAKILLER	» 106
4793	LUMACHENE	» 107

4846 ANTIGRILL » 108
4847 TALPKILLER » 109
4853 AFILENE 25 » 110
4907 POLTAN » 111
4987 RAMROD » 112
5002 INDREX » 113
5003 TIOCUPRIN » 114
5036 BASMETIL » 115
5061 SULCOL » 116
5065 BANTOL » 117
5126 DU-DIM » 118
5151 FENASIP 12 EC » 119
5212 MEDIFEN » 120
5317 FLORTIS » 121
5380 NEMISPOR 70 BLU » 122
5381 MAZEB » 123
5384 ASTER » 124
5387 PRAKOR » 125
5389 TETRAF P.B. » 126
5390 AGER DIURON » 127
5403 LAIFAL CF 125 » 128
5404 VERIPOL » 129
5405 MAINEX » 130
5406 ERBAZID » 131
5408 GERMIDOR » 132
5415 FOXENO ESCA » 133
5416 TRALIN » 134
5417 MESTHAN - 2 » 135
5418 FOLMAN » 136
5419 IDRONET - GR » 137
5420 MORKIT CONCIA SECCA » 138
5421 RIDOMIL COMPLEX P. » 139
5422 TAMARON 25 P.B. » 140
5423 PRECURAN S » 141
5424 FUNGILON D+BAYLETON » 142
5425 TIOSIP » 143
5426 LIMESCA 5 » 144
5427 PREGRANIL » 145
5428 FENASIP COMBI (già FENAZOL) » 146
5429 GASTROCID » 147
5430 FENADIN » 148
5431 ORTHENE COMBI » 149
5432 ETOXIN » 150
5433 ETIL - PARENIL 20-E » 151
5434 BLEND » 152
5435 DERVAN L » 153
5436 SIMAZINA CAFFARO » 154
5437 NOTARET » 155
5438 SUMICIDIN 5 » 156
5439 ACSIUS » 157
5440 FONOFOS DYFONATE 5 G STAUFFER » 158
5441 BETANAL KOMBI » 159
5442 BETANAL N » 160
5443 MOLINAM SG » 161
5445 AUXENE L » 162
5446 MICAL PS » 163
5447 SOFOL PS » 164
5448 FONOFOS TERFOS VERCHIM ASTERIAS » 165
5449 DORITAN » 166
5450 SHELLESTONE » 167
5451 ROTIOFEN 50 » 168
5452 SANDOZOLFO » 169
5453 DELTAMAN » 170
5454 «PIRETRIX 10» » 171
5455 ALASIP COMBI » 172

5456	ACETIN - F	» 173
5457	SKUL 50 PB	» 174
5458	METATHION E	» 175
5459	COSMIC	» 176
5460	RHODAX S	» 177
5461	VITAVAX 38/38	» 178
5462	ANTICASCOLA FC	» 179
5463	SIVAMIL P.B.	» 180
5464	2,4 DISERBIN «P»	» 181
5465	SIMAQUAT	» 182
5466	MALERTOX GR amminico	» 183
5467	«METADENE»	» 184
5468	SALVO	» 185
5469	MOLINUR	» 186
5470	PARAQUAT	» 187
5471	GIBOR	» 188
5472	STICEREAL 2,4 D - Pso	» 189
5473	MITAC 20 CE	» 190
5474	UNDENE 10 SG	» 191
5475	BAYCOR BIETOLA	» 192
5476	NEGRAN S	» 193
5477	MICENE F	» 194
5478	IGRANEB S	» 195
5479	IGRANEB	» 196
5480	POLVOSOL CUPRO MZ	» 197
5481	BAZIN 80	» 198
5482	BORDOVIT	» 199
5484	ERISAN	» 200
5485	TOXENE L	» 201
5486	ATRAFLO	» 202
5487	GEOTAN	» 203
5488	SEMISAN	» 204
5489	CERESIVAM MZ	» 205
5490	GERMOSTOP	» 206
5491	GIBREX	» 207
5492	GIBRETAB	» 208
5493	DODINA 65	» 209
5494	GIBRELIN	» 210
5495	SILTYLATE A Pasta	» 211
5496	MALADUST TERRA	» 212
5497	MELAN ENOTRIA EC	» 213
5498	BAYLETON TOTAL PR	» 214
5499	ROOTING LIQUIDO	» 215
5500	«NIMROD» WP	» 216
5501	BAYCOR CAPTAN	» 217
5502	BAYCOR ANTRACOL	» 218
5503	ANTRACOL RAMATO MICRO	» 219
5504	BAYCOR z.f.	» 220
5505	APAREX 20	» 221
5508	KLOBEN C	» 222
5509	CHIMIGOR 40	» 223
5510	LORAN 4 P	» 224
5511	DESORMONE 80	» 225
5512	MIKAL RAME	» 226
5513	ACTELLIFOG	» 227
5514	SEPRAVAX COMBI 20/33 PB	» 228
5515	VIDDEN D SIAPA	» 229
5516	AME L	» 230
5517	ANTIFITO	» 231
5518	OVILAR	» 232
5519	SILZON	» 233
5520	PALLINAL	» 234
5523	SILTIOCARB 50 EC	» 235
5524	KUMULUS FL	» 236
5525	SILACLOR	» 237

5527 SILQUAT » 238
5528 MIKAL RAME BLU » 239
5529 SILTIOCARB P » 240
5530 T C A 95 » 241
5532 ERREVIT » 242
5533 SOLFANIL » 243
5534 POMARGOL » 244
5535 TELONE » 245
5536 GRAINTOX » 246
5537 RONILAN FL » 247
5538 COPERAL MB » 248
5539 MIKAL F BLU » 249
5540 BENZEB 5 - 60 » 250
5541 BENZEB 10 - 40 » 251
5542 MANCOSOL » 252
5543 CARBOFURAN BAYER CURATER 2,5 GRANULARE » 253
5544 AGER BEMIL » 254
5445 PERTIODIN » 255
5546 NECOBOL » 256
5547 EMISCAM » 257
5548 ALFA TAB » 258
5551 VACLAN » 259
5552 ACSIUS 5 » 260
5553 ELMASIL PD » 261
5554 ENOMETIL » 262
5556 AGER AKAR KT 42 EC » 263
5557 SILDIFAM » 264
5558 SILOXIN T » 265
5559 PHORATE 5 G SILIA » 266
5560 FONGARID 25 WP » 267
5561 LENAR 30 » 268
5562 VITAL R » 269
5563 VITAL F » 270
5564 SEVITAN » 271
5565 CHIMIQUAT L » 272
5566 CERTROL H » 273
5568 CARBOFURAN MARGESIN SOILANE » 274
5569 MICROCAPFOL PB 80 » 275
5570 AGER TRICIL 12 P.B. » 276
5571 SILTIOCARB » 277
5572 SILCLOR » 278
5573 LUMAKIDIN 3 G » 279
5574 LUMAKIDIN 5 G » 280
5575 PRINTAN 22 L » 281
5576 KOLFLOR OLIO B » 282
5577 FENADOR MIX » 283
5578 BAYCOR TIRAM » 284
5579 GRAMINON 50 WP » 285
5580 GRAMINON MCPP » 286
5582 ORTHENE L » 287
5583 COPERAL F » 288
5584 COPERAL RB » 289
5585 TIOWETTING 60 » 290
5586 FOLPET RAMATO BAYER » 291
5588 BORDAGRO » 292
5589 BAYLETON TOTAL PR BLU » 293
5590 TERREX » 294
5591 2-4 DISERBIN PASTA » 295
5592 RUBRUM » 296
5594 GIBRELEX POLVERE » 297
5595 BIOMITE » 298
5596 BIOLFID » 299
5597 ANTICASCOLA BIOLCHIM » 300
5598 SEBIOL 5 P » 301
5599 MICRODIFOLTAN STI » 302

5600 ZOCOLD 80 » 303
5601 VERPHOS » 304
5602 ERBITAN LIQUIDO » 305
5603 URONIL » 306
5604 CLORTAN M » 307
5605 BOLD » 308
5606 VIREM 50 » 309
5608 POLVERE TIPO BORDOLESE BLU » 310
5609 POLVERE TIPO BORDOLESE BIANCA » 311
5610 FLORVITA FUNGICIDA » 312
5611 FRUMIDOR C » 313
5614 ZINEB BLU » 314
5616 ALPEL » 315
5619 DELTAZINA » 316
5620 EPARGOL » 317
5621 FOLMANCAP » 318
5622 AGERPAX 50 » 319
5623 EUPIR » 320
5624 LASSO GD 27/8 » 321
5626 COPERAL FB » 322
5627 PLANIZIN 20 L.E. » 323
5629 MITAN » 324
5630 ANTICASCOLA L » 325
5631 FUNGIL » 326
5632 FENODRIN » 327
5633 VITAL M » 328
5634 SIMAVIT P.B. » 329
5635 PROCIBELLINNE » 330
5636 AGER ACAR KT 18 L » 331
5637 DELTAMAL » 332
5638 DELTAQUAT » 333
5639 DELTAZEB » 334
5640 THIRPET P.B. » 335
5641 OFTANOL CONCIA SECCA » 336
5642 BENTIONIL » 337
5643 ROKAR XL » 338
5644 SILATIN 50 SC » 339
5646 MONITOR » 340
5647 PRATOBELLO » 341
5648 ALAZIN » 342
5649 ZEPEX A » 343
5650 DIAZINATE » 344
5651 ARTIS » 345
5652 BASAGRAN M » 346
5653 OMNIRAT » 347
5654 BETTER » 348
5655 STIPHATE » 349
5656 KROVAR I » 350
5658 EVERGREEN » 351
5659 EXILIN » 352
5660 LENAMON 80 P.B. » 353
5661 SEPRAFORM PS » 354
5662 MALAC » 355
5663 FITODIS D S D » 356
5664 RODAMON ES » 357
5665 NEBUTRIN N » 358
5666 TRICLORAC » 359
5668 TERSOL G » 360
5669 AGERPAX 80 » 361
5671 APPONON » 362
5674 R 6 STOP F » 363
5675 LINURON 50 AMONN » 364
5676 MESTHAN 25 » 365
5678 ENOTHION » 366
5690 RONILAN 20 » 367

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° luglio 1983-31 dicembre 1983, indicati nell'elenco n. 20 *(Pubblicato nel suppl. ord. alla* Gazzetta Ufficiale *n. 171 del 22 giugno 1984).*

0135

Fungicida agricolo per viticoltura, frutticoltura, orticoltura, floricoltura e colture industriali

Composizione:

ZINEB puro	gr. 80
Sostanze inerti e coadiuvanti	q.b. a gr. 100

POLVERE BAGNABILE

III CLASSE
ATTENZIONE
manipolare
con prudenza

BASLINI
Industrie Chimiche Dr. Baslini S.p.A.
Via G. Serbelloni, 12 - Tel. (02) 77.82
20122 MILANO

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in Centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA DI IMPIEGO
Lo ZINEB 80 è un fungicida organico dotato di sospensività e di potere coprente. Sulla vite stimola la vegetazione, aumenta il contenuto zuccherino, favorisce l'allegagione, anticipa la maturazione.
Lo ZINEB 80 combatte le seguenti malattie:

Vite: Peronospora ed Antracnosi — alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.

Pero e Melo: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria — alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.

Pomodoro solo fino alla prima fioritura: Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi — gr. 300-400 per 100 lt. di acqua.

Garofano: Ruggine — alla dose di gr. 200-300 per 100 lt. di acqua.

Pioppo: Ticchiolatura — alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.

Tabacco: Peronospora tabachina — alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua, in semenzaio — alla dose di gr. 250 per 100 lt. di acqua, in pieno campo.
Lo ZINEB 80 si versa nel totale quantitativo di liquido rimescolando energicamente per alcuni minuti fino a formazione di una poltiglia omogenea. Bagnare bene le piante affinchè il prodotto possa distribuirsi uniformemente su tutte le superfici da proteggere.
Si consiglia di aggiungere gr. 100 di PRUNIG ogni 100 lt.. di miscela.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Da non impiegare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA
Lo ZINEB 80 è compatibile con i prodotti con cui normalmente viene consigliata l'unione (bagnante, Parathion - Ossicloruro) e con i più noti prodotti similari della concorrenza.
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA
Si sconsiglia l'impiego di prodotto sulle varietà di Pero sensibili allo ZINEB quali ad esempio: Abate Fétel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana Del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 25

Stabilimento produttore:
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione N. 0135 del 19-9-1972 del Ministero della Sanità

0208

CLASSE III

PASTA SARIAF

Composizione :

gr. 100 di prodotto contengono :

gr. 25 di Rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico)
q.b. a 100 di emulsionanti e diluenti

ATTENZIONE

manipolare con prudenza

Natura del rischio :
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali :
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

La PASTA SARIAF è un anticrittogamico che si impiega su vite, patata, pomodoro, bietola, ulivo e pesco per la lotta contro la Peronospora della vite, della patata, del pomodoro, la Cercospora della bietola, l'Occhio di pavone dell'ulivo, la Bolla del Pesco.

Dosi e modalità d'impiego :
La dose d'impiego è di 500-600 gr. di PASTA SARIAF per 100 litri d'acqua.
Stemperare la dose stabilita di PASTA SARIAF prima in poca acqua, diluire poi, sotto agitazione, fino al volume desiderato.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità :
E' miscibile con i più comuni insetticidi ed anticrittogamici ad eccezione di thiram (Tetrasar 50), polisolfuro di bario (Florbario) e formulati contenenti TEPP.

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità :
Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocività :
La PASTA SARIAF è tossica per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione : da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Registrazione Ministero della Sanità n. 0208 del 22-7-1971

DA NON VENDERSI SFUSO

0298

CUPRIN

Anticrittogamico idrosospensibile efficace contro tutte le malattie cuprosensibili.

E' un prodotto **neutro** non richiede aggiunta di calce. Indicato per i trattamenti con atomizzatori a basso volume.

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) . . . . gr. 16
Coadiuvanti, disperdenti, adesivanti, bagnanti, coloranti ed inerti q.b. a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
— In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI DI IMPIEGO (per ogni 100 litri di acqua):

Peronospora della vite, pomodoro, patate . gr. 400 - 500

Ticchiolatura delle pomacee (melo e pero):

— prima della fioritura . . . . gr. 300 - 500
— dopo la fioritura . . . . gr. 150 - 200

Occhio di Pavone dell'ulivo, Malsecco degli agrumi (limone, arancia, mandarino, chinotto, cedro, pompelmo, bergamotto). Ruggini ed altre Crittogame (antracnosi, alternaria, septaria, cercospora) dei fiori in pieno campo e degli ortaggi (pomodoro, patate, peperone, melanzana, sedano, cipolla, pisello, fagiolo, spinacio, cavoli) . . . . gr. 400 - 500
Cercospora della barbabietola . . . . gr. 500 - 600
Bolla e gommosi del pesco . . . . gr. 500 - 800

Le dosi sopra scritte possono essere aumentate o diminuite a seconda dei casi, delle condizioni climatiche, della gravità degli attacchi. **Impiegando atomizzatori a basso volume** le dosi devono essere proporzionalmente più elevate di quelle indicate.

« Da non impiegare con mezzi aerei ».

COMPATIBILITA': Raccomandiamo di non usare il prodotto in miscela con Diclorane, Thiram. Raccomandiamo, inoltre, di usare con precauzione il prodotto in miscela con Carbaryl, Promecarb, Diazinone, Metiletoato, Parathion, Thiometon, Triclorfon, Binapacryl, Dicofol, Carbendazim, Dinocap, Dodemorf.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante **la fioritura.**
Su pesco, varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA':

— Il « prodotto » è tossico per i pesci. Il contatto e l'irrogazione prolungati possono causare, in alcuni individui particolarmente sensibili, irritazione della pelle e delle mucose.

— **Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.**

— Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

PASQUALE **MORMINO** & FIGLIO S.p.A
OFFICINA DI PRODUZIONE: **TERMINI IMERESE (PA)**

Registrazione n. 0298 del Ministero Sanità del 16-2-1972
DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 5

0300

CUPRIN S

Anticrittogamico idrosospensibile efficace contro tutte le malattie cuprosensibili.

E' un prodotto **neutro** non richiede aggiunta di calce. Indicato per i trattamenti con atomizzatori a basso volume.

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

RAME METALLO (sotto forma di ossicloruro) . . . . gr. 35
Coadiuvanti, disperdenti, adesivanti, bagnanti, coloranti ed inerti q.b. a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
— In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI DI IMPIEGO (per ogni 100 litri di acqua):

Peronospora della vite, pomodoro, patata	gr. 400 - 500
Ticchiolatura delle pomacee (melo e pero):	
— prima della fioritura	gr. 300 - 500
— dopo la fioritura .	gr. 150 - 200
Occhio di Pavone dell'ulivo, Malsecco degli agrumi (limone, arancia, mandarino, chinotto, cedro, pompelmo, bergamotto), Ruggini ed altre Crittogame (antracnosi, alternaria, septaria, cercospora) dei fiori in pieno campo e degli ortaggi (pomodoro, patate, peperone, melanzana, sedano, cipolla, pisello, fagiolo, spinacio, cavoli)	gr. 400 - 500
Cercospora della barbabietola .	gr. 500 - 600
Bolla e gommosi del pesco ..	gr. 500 - 800

Le dosi sopra scritte possono essere aumentate o diminuite a seconda dei casi, delle condizioni climatiche, della gravità degli attacchi. **Impiegando atomizzatori a basso volume** le dosi devono essere proporzionalmente più elevate di quelle indicate.

« Da non impiegare con mezzi aerei ».

COMPATIBILITA': Raccomandiamo di non usare il prodotto in miscela con Diclorane, Thiram. Raccomandiamo, inoltre, di usare con precauzione il prodotto in miscela con Carbaryl, Promecarb, Diazinone, Metiletoato, Parathion, Thiometon, Triclorfon, Binapacryl, Dicofol, Carbendazim, Dinocap, Dodemorf.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Non si deve trattare durante **la fioritura.**
Su pesco, varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITA':

— Il « prodotto » è tossico per i pesci. Il contatto e l'irrogazione prolungati possono causare, in alcuni individui particolarmente sensibili, irritazione della pelle e delle mucose.

— **Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.**

— Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

PASQUALE **MORMINO** & FIGLIO S.p.A.
OFFICINA DI PRODUZIONE: TERMINI IMERESE (PA)

Registrazione n. 0300 del Ministero Sanità del 16-2-1972

DA NON VENDERSI SFUSO

0314

TIOCUPRIN 'S'

polvere scorrevole a base di RAME - ZOLFO

COMPOSIZIONE: **100 gr. di prodotto contengono:**

RAME PURO .... **gr. 10**
(sotto forma di Ossicloruro)

ZOLFO PURO (Esente da Selenio) .... **gr. 59,40**

Eccipienti attivi, coadiuvanti, bagnanti e coloranti q.b. a 100

FINEZZA: Residuo massimo al Setaccio UNI 0,05:5%

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

— In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSE INDICATIVA: Kg. 20-25 circa per ha.

IMPIEGO: Trattamenti a secco contro: **l'oidio della vite**, delle colture ortive (carciofo, cardo melone, anguria, cetriolo, zucca, zucchino, peperone, melanzazna, barbabietola, lattuga, pomodoro, (solo fino alla prima fioritura), pisello) ed ornamentali (rosa, ortensia, begonia) in pieno campo - **mal bianco** delle drupacee e delle pomacee - azione complementare dei trattamentii liquidi contro la **peronospora della vite** e la **ticchiolatura** delle pomacee.

Il « prodotto » è una **polvere** con finezza rilevante che la rende adatta ad essere distribuita con i moderni **atomizzatori-impolveratori** o con i solforatori comuni. Ben distribuito assicura su tutta la vegetazione una **razionale** ed **uniforme difesa. In presenza di umidità**, si fissa meglio su tutte le parti della pianta.

ATTENZIONE: poichè trattasi di polvere fine conviene regolare al minimo l'erogazione delle solfatrici, aumentadola gradatamente fino al raggiungimento della nube.

« Da non impiegare con mezzi aerei ».

COMPATIBILITA': Raccomandiamo, di non usare il prodotto in miscela con calce, mancozeb, maneb, clorfenamidina, olii bianchi o gialli.
Il suo impiego deve essere distanziato di almeno 3 settimane da quello del Captano od olii minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di cacarenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si vericassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÁ: Non si deve dare durante la fioritura su varietà di melo (Abbondanza « Belford », Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clargeau, Passacrasana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili.
Non deve essere impiegato, dopo la fioritura, sulle seguenti varietà di melo perchè ad esse dannoso: Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Roma Beauty, Staman, Cochele Brams.

RISCHI DI NOCIVITA': Il « prodotto » è tossico per i pesci. Il contatto e l'irrogazione prolungati possono causare, in alcuni individui particolarmente sensibili, irritazione della pelle e delle mucose.

— **Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.**

— Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

PASQUALE **MORMINO** & FIGLIO S.p.A.
OFFICINA DI PRODUZIONE: **TERMINI IMERESE (PA)**

Registrazione n. 0314 del Ministero Sanità del 16-9-1971

DA NON VENDERSI SFUSO

0368

DACONIL 2787

ANTICRITTOGAMICO DIAMOND SHAMROCK

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

COMPOSIZIONE	
CLOROTALONIL puro	g 75
Coformulanti q.b. a	g 100

Registrazione n. 0368 del 22-11-1971 del Ministero della Sanità

IV CLASSE

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DIAMOND SHAMROCK AGRICOLTURA S.r.l.
Via V. Monti, 8
20123 MILANO

Stabilimento produttore:
S.B.A. - Rue de Renory 21 - 4200 OUGREE (Belgique)

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: fungicida a vasto spettro d'azione, dotato di persistenza al dilavamento. Consente l'impiego di un solo prodotto contro più malattie

CAMPI D'IMPIEGO, MALATTIE COMBATTUTE E DOSI D'IMPIEGO

VITE:

— per peronospora, antracnosi, escoriosi, marciume nero	g 150/hl
— per escoriosi, marciume nero, antracnosi	g 250/hl
Effettuare due trattamenti il primo a gemme rigonfie ed il secondo a 2-3 foglie	
— per botrytis	g 200/hl

POMACEE (melo, pero, cotogno, nespolo): per ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria, cancri rameali, marciume del colletto

— trattamenti invernali	g 250/hl
— trattamenti pre-florali	g 130/hl
— trattamenti post-florali	g 120/hl

DRUPACEE (pesco, albicocco, nettarina, susino, ciliegio) per bolla, corineo, monilia, ruggine, cancri rameali

— trattamenti invernali	g 250/hl
— trattamenti pre-florali	g 200/hl
— trattamenti post-florali	g 150-180/hl

AGRUMI: per allupatura, antracnosi, fumaggine

— trattamenti invernali	g 250/hl
— trattamenti primaverile-estivi	g 150-200/hl

COLTURE ORTICOLE:

— **Pomodoro, peperone, patata:** per peronospora, alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi non vascolari, muffa grigia e bianca, septoria, rizoctonia, cercosporiosi
g 150-200/hl kg 1,5-2,5/Ha trattamenti in pieno campo ed in serre
g 100/hl trattamenti in semenzaio
— **Cipolla:** per peronospora, muffa grigia e bianca, alternariosi g 200-250/hl - kg 2-3/Ha (aggiungere adesivante)
— **Cucurbitacee:** per alternaria, peronospora, antracnosi, vaiolatura, cladosporiosi, rizoctonia, fusariosi non vascolari g 150-250/hl - kg 1,5-2,5/Ha
— **Sedano:** per septoria, rizoctonia, cercospora, sclerotinia g 200-250/hl kg 2,5-3/Ha
— **Lattughe e radicchi:** per peronospora e sclerotinia g 150-200/hl - kg 1,5-2/Ha
— **Fagiolo, fagiolino:** per peronospora, antracnosi, ruggine g 200-250/hl - kg 1,5-2/Ha
— **Fragola:** per muffa grigia, vaiolatura, peronospora g 200-250/hl - 2-2,5/Ha
— **Cavoli:** per peronospora, alternaria, vaiolatura g 180-200/hl 1,5-2/Ha (aggiungere adesivante)
— **Grano ed orzo:** per ruggini, septoria, elmintosporiosi, fusariosi non vascolari, nerume
  a) trattamenti fogliari: da effettuarsi nel periodo compreso tra inizio levata e fine fioritura alla dose di kg 1,5-2/Ha in almeno 500 litri di acqua
  b) concia del seme: prima della semina mescolare uniformemente il prodotto con il seme alla dose di g 100-200/Q.le di seme
— **Carota:** per alternaria, cercospora e muffa bianca g 200-250/hl - kg 2-2,5/Ha
— **Tabacco:** per peronospora tabacina g 150-200/hl - kg 2/Ha
— **Spinacio:** contro peronospora e ruggine bianca g 150-200/hl 1,5-2/Ha
— **Ribes nero:** per peronospora, ruggine, muffa grigia g 150-200/hl
— **Lamponi:** per muffa grigia g 150-200/hl

COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO: per ticchiolatura, botrytis, ruggine, antracnosi, septoriosi, fusariosi non vascolari, alternaria g 150-300/hl

PIANTE ARBOREE ORNAMENTALI: g 200/hl

EPOCHE D'IMPIEGO: a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

MODALITÀ D'IMPIEGO: bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere onde ottenere una perfetta copertura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con gli oli minerali

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità: su melo e pero attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate: concentrazioni superiori possono provocare rugginosità sulla varietà di Golden ed altre a buccia rossa. Sulle colture da fiore più delicate, eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione. Deve essere irrorato a distanza di almeno 21 giorni dall'impiego degli oli minerali

Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso kg 1

0526

FOLPET ramato blu Bayer

FUNGICIDA CUPRO ORGANICO

per irrorazioni su vite, ortaggi, piante ornamentali e da fiore

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Folpet ramato blu Bayer contengono:
g 15 di Folpet puro,
g 30 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
sostanze adesive, bagnanti e coloranti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora.

Avvertenza: sospendere i trattamenti su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Ortaggi: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) - **pomodoro:** contro peronospora, alternariosi e ticchiolatura; **cocomero, melone, zucchine e cetriolo:** contro peronospora ed antracnosi; **sedano:** contro spetoriosi; **patata:** contro peronospora ed alternariosi; **cipolla:** contro peronospora; **fagiolo e pisello:** contro antracnosi; **insalata** (lattuga): contro peronospora; **fragola:** contro vaiolatura.

Piante ornamentali e da fiore: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) contro ticchiolatura e septoriosi del crisantemo in pieno campo.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Folpet ramato blu Bayer è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: si possono verificare fenomeni di fitotossicità se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con oli minerali e prodotti a base di zolfo. Non si deve trattare durante la fioritura.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia delle uve da vinificare.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 0526 dell'8-10-1974

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

g 100

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

Divisione Agraria

Concessionaria:

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

0599

ACUPRICO 90

Anticrittogamico in polvere bagnabile a base di Ziram

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono:
Ziram puro gr 85,5
Coadiuvanti e inerti q.b. a gr 100

CLASSE III

Attenzione manipolare con prudenza

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente. con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Dosi e modalità di impiego

L'ACUPRICO 90 si impiega a dosi variabili da 100 a 250 grammi per ettolitro di acqua nei trattamenti al verde contro la ticchiolatura del melo e del pero, cancro dei rametti. Septoria, alternaria, ruggini delle colture orticole (fragola, patata, sedano, cocomero, melone) e floreali in pieno campo. Alla dose di gr 400 - 600 per ettolitro di acqua si usa nei trattamenti autunno invernali - alle drupacee contro la gommosi parassitaria e la bolla.

Da non applicarsi con mezzi aerei

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere il trattamento 10 giorni prima della raccolta

— « **Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
— « Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
— « Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207
Stabilimento di produzione:
VISPLANT CHIMIREN s.r.l. - Via Salvi 1 - Renazzo (FE)
Registrazione N. 0599 del 17 febbraio 1972 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO PESO NETTO kg 5

0602

FONOFOS SHELL DYFONATE® 5 GRANULI

CLASSE I

VELENO

Insetticida granulare indicato per la disinfestazione del suolo da Elateridi, Zabbro gobbo, Agrotidi, Maggiolino, Grillotalpa

COMPOSIZIONE IN PESO

Fonofos puro		g 4,75
Diluenti e coadiuvanti	q.b. a	g 100,00

Attenzione: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'Art. 23 del D.P.R. 3-8-1968, n. 1255.

® Marchio registrato della Stauffer Chemical Company, Westport, Conn 06880, USA

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare il prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Evitare di respirare i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti di gomma, maschere ed occhiali protettivi;
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrandole in fosse profonde più di un metro, cospargendo con calce viva);
— In caso di contaminazione degli indumenti togliersi immediatamente quelli molto contaminati; lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente;
— Lavare accuratamente i guanti dopo l'impiego, specialmente l'interno;
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi più gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccato atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni: Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio 2 - 20154 MILANO

Officina di produzione:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 0602 del 29-5-1972

MODALITA' D'IMPIEGO

FONOFOS SHELL DYFONATE® 5 GRANULI si impiega nella disinfestazione del terreno prima o all'atto della semina o del trapianto delle seguenti colture:

mais, sorgo, frumento, patata, tabacco, pomodoro, barbabietola da zucchero, bietola da orto e da foraggio, erba medica, asparago, cipolla, aglio, porro, carota, cavolo e cavolfiore, sedano, finocchio, prezzemolo, carciofo, lattuga, indivia, cicoria, fagiolo, pisello, arachide, rapa, rapanello, menta e tappeti erbosi.

Le dosi d'impiego sono le seguenti:

— 60-80 kg/ha a seconda degli insetti da combattere e per i trattamenti su tutta la superficie: dopo la distribuzione da eseguirsi in maniera uniforme il prodotto deve essere incorporato al terreno con un'erpicatura o una zappatura.
— 7-15 kg/ha per i trattamenti localizzati nel solco di semina con l'impiego di appositi microgranulatori montati sulle seminatrici. Nel caso di forti infestazioni tali dosi possono essere anche raddoppiate.

Avvertenze: Nei terreni destinati alla coltura di carote effettuare i trattamenti 3 mesi prima della semina di tale coltura. Per cipolla, cavolo e ravanello il prodotto deve essere impiegato solo se tali colture sono destinate alla produzione del seme.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non vi è interesse pratico. Tuttavia è sconsigliata l'eventuale miscela con prodotti aventi reazione alcalina.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per il bestiame, gli animali domestici, la selvaggina, i volatili in genere, i pesci, gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto:

0732

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

DANICAR®

Fungicida-acaricida in polvere bagnabile per la lotta contemporanea contro gli Oidi e le forme degli acari che infestano i fruttiferi, la vite, nonché le colture industriali, ortive e floreali

COMPOSIZIONE

g 30 di Dinocap tecnico - costituito da 78% di Dinitro (1-metil-eptil) fenil crotonato, e dal 22% di altri prodotti della reazione, principalmente Dinitro (1-metil-eptil) fenolo.

q.b. a g 100 di sostanze inerti e coadiuvanti.

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 0732 del 26.6.1972

® Marchio, registrato della Rohm & Haas Co. - Philadelphia (USA)

ISTRUZIONI PER L'USO

— Il Danicar agisce anche a temperature relativamente basse e svolge verso gli Oidi un'attività preventiva, curativa ed eradicante. Le dosi superiori andranno adottate nei trattamenti primaverili, le inferiori in quelli effettuati nel corso della stagione estiva. Con temperature superiori ai 32 °C le concentrazioni d'impiego più elevate possono causare qualche danno alle piante più sensibili.
— Qualche varietà di vite (ad esempio Schiava) può risultare suscettibile al Danicar.
— Le sistematiche applicazioni di Danicar volte a contenere gli Oidi sono efficaci anche contro le larve e gli adulti degli acari purché gli intervalli tra un trattamento e quello successivo non superino i 15 giorni. È consigliabile intervenire quando il numero dei ragnetti non supera i 3-5 per foglia.
— Per ottenere i migliori risultati dal Danicar si consiglia di usare elevati quantitativi di acqua, avendo cura di irrorare accuratamente anche la porzione terminale dei rametti e di aggiungere alla dispersione acquosa del prodotto, Fitofil o altro bagnante in ragione di 30-50 grammi ettolitro.
— Vite: g 75-100 ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa primaverile e ripeterli a intervalli variabili secondo l'intensità dell'infestazione usando il Danicar in miscela con l'antiperonosporico.
Con temperature oltre i 30 °C ridurre le dosi a 60-75 grammi ogni 100 litri di acqua.
— Melo: g 75-100 ogni 100 litri di acqua su varietà sensibili all'Oidio. Intervenire prima della fioritura al « mazzetti affioranti » od a « bottoni florali ») e ripetere le irrorazioni ad intervalli variabili dal 7 al 14 giorni a seconda dell'intensità dell'infestazione. Per varietà poco sensibili effettuare 3-4 trattamenti ad intervalli settimanali.
— Pesco: g 70-100 ogni 100 litri di acqua. Effettuare 3-4 trattamenti ad intervalli settimanali a partire dalla « scamiciatura dei frutticini ». Continuare i trattamenti, se necessario, per assicurare anche la protezione delle foglie.
— Albicocco: g 70-100 ogni 100 litri di acqua. Trattare due o tre volte ad intervalli quindicinali iniziando dal momento in cui i frutti presentano la grossezza di una nocciola.
— Tabacco: g 50-85 ogni 100 litri di acqua. Iniziare gli interventi alla prima comparsa della malattia e ripeterli più volte con l'intervallo di 8-10 giorni secondo la necessità.
— Ortaggi: cetriolo, zucchino, melone ed altre cucurbitacee, carciofo, carota, cardo, insalata, ecc. in pieno campo: g 50-85 ogni 100 litri di acqua. Intervenire alla prima comparsa della malattia e ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni secondo le necessità.
— Cetriolo, zucchino, melone ed altre cucurbitacee sotto serra: g 25-50 ogni 100 litri di acqua in trattamenti settimanali da ripetere secondo le necessità.
— Rosa in serra: g 27-50 ogni 100 litri di acqua alla prima comparsa dell'Oidio o degli acari. Ripetere i trattamenti ogni 5-7 giorni secondo le necessità. Adottare le dosi inferiori quando la temperatura si avvicina ai 30 °C. Non trattare con temperature superiori ai 32 °C. In piena aria: g 50-85 ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti al primo apparire dell'Oidio o dei ragnetti e ripeterli ogni 3-5 giorni. Curare la perfetta bagnatura delle piante compresa la pagina inferiore delle foglie.
— Colture floreali: (Aster, Begonia, Crisantemo, Dalia, ecc.) in serra: g 25-40, in pieno campo: g 40-70, ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti all'apparire dell'Oidio o degli acari e ripeterli ogni 7-10 giorni secondo le necessità.
— Vivai: g 75-100 ogni 100 litri di acqua. Iniziando i trattamenti alla schiusura delle gemme.
— Frumento: g 1000 per ettaro. Applicare ai primi accenni dell'insorgenza dell'infezione. Impiegando litri 400-600 di acqua a seconda dello sviluppo della coltura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il Danicar è compatibile con tutti i fungicidi ed insetticidi, ad eccezione degli olii, degli insetticidi oleosi nonché delle poltiglie solfocalciche e bordolesi.
Osservare pertanto un intervallo di almeno 10-12 giorni tra un trattamento con olii e l'applicazione del Danicar.
Non usare il Danicar in miscela con parathion nel corso della fioritura dei fruttiferi.

Avvertenza: In casi di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si richiamano i casi previsti nelle « Istruzioni per l'uso » per alcuni impieghi e nel paragrafo riguardante la Compatibilità.

Rischi di nocività
Il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta: 7 giorni prima solo nel caso di trattamenti sulle Cucurbitacee (cetrioli, zucchine, meloni).

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone, agli animali ed a piante.

DA NON VENDERSI SFUSO

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.

Sintomi di intossicazione
Sudorazione, sete, nausea, spossatezza o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia. Colorazione gialla delle sclere. La morte consegue ad edema cerebrale e paralisi respiratoria e circolatoria.

Consigli terapeutici
Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente. Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione. Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri di acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.

Controindicazioni
Atropina.

65

0780

ACARICIDA 8

PRODOTTO SPECIFICO PER LA LOTTA CONTRO IL RAGNETTO ROSSO DELLE COLTURE DI PERO E MELO

COMPOSIZIONE gr. 100 contengono:	
Tricicloesil Idrossido di Stagno al 95% (pari a gr. 11,8 di p. a. puro)	gr. 12,5
Inerti e Sospensivanti	gr. 87,5

CLASSE III

ATTENZIONE!

Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. IN CASO DI INTOSSICAZIONE CHIAMARE IL MEDICO PER I CONSUETI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: Cefalea Occipitale continua o parossistica - Ronzii auricolari - Iperacusia - Vertigini - Rachialgia - Dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - Ritenzione urinaria - Insufficienza respiratoria e di circolo - Interessamento del sistema nervoso centrale - Nevralgie e Paralisi - Dermatosi.

Consigli Terapeutici di massima condizionati in relazione alla via di contaminazione, abluzioni con la massima efficacia e rapidità effettuando, al caso: Allontanamento della sostanza nociva cutanee - Lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza - Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - Terapia sintomatica.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ACARICIDA 8 esplica la sua azione contro tutte le forme mobili di acari, anche contro le specie resistenti ai prodotti fosforganici e cloroderivati. La grande efficacia, viene esaltata dalla notevole persistenza d'azione del prodotto.

L'ACARICIDA 8 si impiega alla dose di gr. 150-200 per ettolitro di acqua usando la dose minore nelle infezioni lievi (1-2 acari per foglia), e la dose massima in caso di forti infestazioni (4-5 acari per foglia). In ogni caso, perchè il trattamento possa essere valido, si dovrà aver cura di bagnare completamente ed abbondantemente le piante. Ripetere il trattamento alla ricomparsa delle forme mobili. Per aumentare l'efficacia del prodotto nei trattamenti, aggiungere alla miscela gr. 50 di bagnante adesivo VALSOL. Si raccomanda di non ripetere subito il trattamento: il prodotto è lento ad agire (entra in attività dopo 3-4 giorni dal trattamento) e quindi si potrebbe essere tratti in inganno dalla vitalità degli acari anche dopo 1 — 2 giorni dal trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'ACARICIDA 8 è compatibile con la maggior parte dei prodotti usati in fitoiatria. E' sconsigliata la miscela con Polisolfuri di Calcio e di Bario, o con Poltiglia Bordolese. AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali precritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

L'ACARICIDA 8 alle dosi consigliate non è fitotossico.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, i pesci e il bestiame. Per quanto concerne il bestiame, si consiglia di non immettere animali nelle zone trattate prima di 30 giorni dopo il trattamento nè di alimentarli con prodotti trattati direttamente o accidentalmente con il prodotto.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

S.p.A. Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22 Officina di produzione e Sede amministrativa: FAENZA (RA) - Via S. Silvestro, 1

Reg. N. 0780 del 30-9-1976 del Ministero Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 0,500

0801

DISERBO MAIS

Diserbante selettivo per il controllo delle erbe infestanti della coltura del Mais

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Atrazina pura	g 47,5
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

CAFFARO

Stabilimento SIPCAM S.p.A.
Salerano sul Lambro Milano
Registrazione n.0801 del Ministero della Sanità del 9-5-1972

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Il **DISERBO MAIS** va impiegato a primavera in pre-emergenza, cioè durante o contemporaneamente alle operazioni di semina. Si può inoltre intervenire nell'intervallo di tempo tra la semina e l'emergenza delle piantine sino a 10-15 giorni dopo le semine stesse.
Il **DISERBO MAIS** si impiega alla dose di g 400-500 in 50-100 litri di acqua per 1.000 mq di superficie, pari cioè a kg 4-5 di erbicida per ettaro in 500-1000 litri di acqua. Le dosi inferiori sono riferite ad interventi su terreni sciolti o di medio impasto, mentre la dose superiore va riferita a terreni pesanti ricchi di sostanza organica.
La dose stabilita va stemperata in poca acqua, quindi diluita a volume desiderato. Il diserbo va applicato sull'intera superficie operando possibilmente su terreni umidi, o appena dopo una pioggia o un'irrigazione. È utile, prima del diserbo, effettuare la rullatura del terreno in modo da rendere uniforme e ben livellata tutta la superficie; il **DISERBO MAIS** ha così modo di esplicare la sua migliore efficacia su tutti i semi delle infestanti presenti nel terreno.

AVVERTENZE
Si sconsiglia di effettuare il diserbo su terreni torbosi. Si tenga inoltre presente che i terreni diserbati non consentono la coltivazione di piante consociate durante tutta la stagione.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es.: bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi. Attenersi alle dosi indicate. Dopo la raccolta effettuare arature profonde prima di procedere alla semina di altre colture. Aver cura di lavare abbondantemente i mezzi di distribuzione prima di destinarli ad altri usi agricoli.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il **DISERBO MAIS** è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO kg 1

0935

ANTRACOL ramato blu

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

per trattamenti liquidi
su vite, pomodoro solo fino alla prima fioritura, garofano in pieno campo

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Antracol ramato blu contengono:
g 20 di rame metallico (sotto forma di idrossido)
g 15 di propineb puro
sospensivanti, coloranti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,25-0,35% (250-350 g in 100 litri d'acqua) contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano, in pieno campo.

N.B. - a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.

Divieti d'impiego
— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: L'Antracol ramato blu è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: in caso di andamento climatico freddo e piovoso è sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Visplant-Chimiren - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione Ministero Sanità n. 0935 del 21/8/72

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Netto: Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

0936

ANTRACOL ramato

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

per trattamenti liquidi

su vite, pomodoro solo fino alla prima fioritura, garofano in pieno campo

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Antracol ramato contengono:
g 20 di rame metallico (sotto forma di idrossido)
g 15 di propineb puro
sospensivanti, coloranti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,25-0,35% (250-350 g in 100 litri d'acqua) contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano, in pieno campo.

N.B. - a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.

Divieti d'impiego
— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l'Antracol ramato è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: in caso di andamento climatico freddo e piovoso è sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Visplant-Chimiren - Renazzo di Cento (FE)
Registrazione Ministero Sanità n. 0936 del 21/8/72

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Netto: Kg. **1**

B A BAYER E R

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

0961

LONACOL Blu

FUNGICIDA ORGANICO
per trattamenti liquidi
su vite, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano e tabacco

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Lonacol blu contengono:
g 70 di zineb puro
bagnanti, sospensivanti, coloranti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glocosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego:
0,2-0,3% contro la peronospora della vite, la ticchiolatura delle pomacee, la ruggine del garofano.
0,3-0,35% contro l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (fino alla prima fioritura) e la peronospora del tabacco.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Divieti d'impiego
— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Lonacol blu è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: solo alcune varietà di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna) si sono dimostrate sensibili ai prodotti a base di zineb.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco
Registrazione Ministero Sanità n. 0961 del 29-9-72

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Netto: Kg **1**

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

0973

POMARSOL 50

FUNGICIDA ORGANICO

per irroazioni in frutticoltura, orticoltura, floricoltura e per la concia delle sementi e dei bulbi da fiore

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Pomarsol 50 contengono:
g 47,5 di tiram puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: alcool, olii, grassi.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Frutticoltura: 1) Pomacee: contro la ticchiolatura e il marciume dei frutti: 0,3% prima e dopo la fioritura; 0,2-0,15% per i trattamenti al verde; 0,3% per i trattamenti pre-raccolta. 2) Drupacee: contro la bolla e la perforazione delle foglie (gommosi): 0,5-0,7% alla caduta delle foglie in autunno e a fine inverno; 0,25-0,3% per i trattamenti primaverili-estivi.

Orticoltura: contro la vaiolatura, il mal bianco ed il marciume dei frutti delle fragole, la botrytis dell'insalata, la peronospora del cetriolo, il mal bianco del carciofo, la ticchiolatura del pomodoro: 0,2-0,4%.
Per la concia delle sementi: g 800/ql per cavoli, spinaci, porri, cipolle, insalata, pomodori, sedano e riso; g 300/ql per fagioli e piselli.

Floricoltura in pieno campo ed in serra: contro la ticchiolatura, la ruggine, la peronospora, il marciume dei bottoni florali, il mal bianco della rosa, il carbone del garofano, la botrytis dei gladioli e dei tulipani: 0,2-0,3%.
Per la concia dei bulbi da fiore: immergere i bulbi di tulipani, narcisi e giacinti per ½ ora in una soluzione al 2,5% (g 250 in 10 litri d'acqua), per gladioli impolverare con 8-15 g di Pomarsol 50 per kg di bulbi preventivamente inumiditi.

Bieticoltura: per la concia del seme: g 950/ql.

Mais e foraggere: per la concia del seme: g 300/ql.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Pomarsol 50 è miscibile con gli antiparassitari, ad eccezione dell'Eradex, Morestan e prodotti a base di rame, arsenico e oli minerali. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Industria Chimica del Ticino - Marano Ticino (NO)
Registrazione Ministero Sanità n. 0973 del 9-11-72

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

0985

DICONTAL

INSETTICIDA

Per irrorazioni in viticoltura, orticoltura, fragolicoltura, floricoltura, agrumicoltura, frutticoltura, maiscoltura in campo e in serra

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Dicontal contengono:
g 20 di fenitrotion puro
g 20 di triclorfon puro
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: 0,15% contro tignole e tortrice; 0,2-0,3% contro l'eulia.
Fruttiferi (Drupacee): 0,2-0,3% contro cidia, anarsia ed afidi del pesco.
Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementine, bergamotto e cedro): 0,2-0,3% contro tignola e cimice verde.
Ortaggi (cavolo, patata, pomodoro,): 0,15-0,2% contro larve defogliatrici (dorifora, cavolaia); (sedano, cipolla, aglio): 0,2-0,3% contro afidi e mosca.
Fragole: 0,2-0,3% contro afidi, tortrici e tarsonemo.
Mais: 0,2-0,3% contro la seconda generazione della piralide.
Piante ornamentali e da fiore: 0,15-0,2% contro afidi, larve defogliatrici, larve minatrici delle foglie.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Dicontal è miscibile con antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: su piante ornamentali e da fiore data la molteplicità di specie e varietà coltivate, è consigliabile effettuare prove preliminari su un limitato numero di piante.
Nocività: il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 0985 del 5/9/72

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 100

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

0987

Stop-ris

Regolatore per prevenire il 'riscaldo' delle mele durante la conservazione in magazzino.

COMPOSIZIONE

— Etossichina pura	g	83
— Coadiuvanti e solventi: quanto basta a	g	100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo,3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

Registrazione n. 0987 del 29.9.1972 Ministero della Sanita`

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici,conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto impiegato poco prima della raccolta o subito dopo la raccolta elimina o comunque riduce sensibilmente i danni provocati dal 'riscaldo', fisiopatia che si manifesta sulle mele, quasi esclusivamente durante la conservazione o più spesso al termine di essa; questa alterazione provoca la comparsa di un imbrunimento del tessuto epidermico al quale può seguire il disfacimento o rammollimento dei primi strati cellulari sottoepidermici.
Il riscaldo interessa diverse varietà di mele (Granny Smith, gruppo Red Delicious e derivate, gruppo Stayman, Imperatore o Morgenduft, Rome Beauty, Winter Winesap, Golden Delicious e derivate, e inoltre Lavina, Carla, Commercio,Abbondanza).

DOSI, EPOCHE E MODALITA` DI IMPIEGO

Trattamento prima della raccolta: impiegare il prodotto in ragione di 375 cc per Hl di acqua: effettuare la distribuzione della poltiglia sulle piante 2 giorni prima della raccolta curando la più completa bagnatura dei frutti.

Trattamento dopo la raccolta: impiegare il prodotto alla dose di cc 150 per 100 lt. di acqua su Golden Delicious e alla dose di cc 250 per 100 lt. di acqua su altre varietà.

Le mele trattate in pre-raccolta non devono essere trattate in post-raccolta.
La frutta deve essere trattata non oltre una settimana dopo la raccolta; immergere la frutta nella soluzione per almeno 15 secondi senza superare comunque i 25 secondi, oppure irrorare la soluzione sui frutti mentre questi passano sul nastro trasportatore, assicurandosi che il contatto fra i frutti e la soluzione irrorata sia di 15-20 secondi.
Per ottenere i migliori risultati è necessario cambiare ogni giorno la soluzione.
I parziali rinnovi della poltiglia consumata nel corso della giornata vanno effettuati aggiungendo il prodotto alla concentrazione sopra indicata, ma limitatamente alla sola quantità di acqua reimmessa.
Se la soluzione si sporca con terra, foglie, detriti, ecc. deve essere cambiata e la quantità residua eliminata come da prescrizioni sottoindicate.
Le mele debbono essere asciutte prima di essere poste in frigorifero.
Avvertenza: la soluzione eccedente ai trattamenti, prima di essere scaricata dalle vasche, dovrà essere opportunamente trattata per la depurazione o diluita (es. 1:100).

Preparazione della poltiglia: diluire la quantità di prodotto necessaria, direttamente nel totale quantitativo di acqua miscelando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari eccetto quelli a reazione alcalina come Polisolfuri e Calce.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Prima di immettere al consumo le mele trattate lasciare trascorrere non meno di 90 giorni dal trattamento di cui almeno l'ultima settimana fuori frigorifero a temperatura ambiente ed in locale arieggiato e luminoso.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto Lt. 1**

SIPCAM

1097

Il **PARACOCCIDOL**, è un insetticida liquido facilmente emulsionabile, efficace per la distruzione di afidi, cocciniglie, acari, lepidotteri, sia allo stato adulto che di larva o di uovo, che attaccano pomacee, drupacee, agrumi e olivo.

DOSI E MODO D'IMPIEGO

In recipiente pulito si mescola la quantità occorrente di **PARACOCCIDOL** con pari quantità di acqua, stemperando fino ad ottenere una crema omogenea. Si aggiunge poi altra acqua sempre rimescolando, fino a volume desiderato.
Il **PARACOCCIDOL** si impiega alla dose di kg 0,8-1,5 per Hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **PARACOCCIDOL** è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio ad eccezione del Menazon, del Polisolfuro di Calcio, del Chinometionato, del Thioquinox, del Captano, del Diclorofluanide, del Dicloran, del Dinocap, del Folpet, del Metiram, degli Zolfi bagnabili, del Binapacryl.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

PARACOCCIDOL

Insetticida liquido emulsionabile per trattamenti di fine inverno e primaverili alle piante da frutto

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

Parathion puro	g 3,5
Olii minerali puri (al 95 % U.R.)	g 84
Emulsionanti e solventi	q.b.a g 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto cutaneo

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.*
Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento di CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) S.S. 255 Km 46

0901

Registrazione n. 1097 del Ministero della Sanità del 16-4-73

1163

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

RO-NEET®

(LIQUIDO EMULSIONABILE)

DISERBANTE SELETTIVO, PER LA BARBABIETOLA E LO SPINACIO

Registrazione Ministero Sanità n. 1163 del 8-5-1973.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— CICLOATO puro	g 72,7
— Coformulanti	q.b. a g 100

® Marchio registrato della Stauffer Chemical Company - WESTPORT, Conn. - U.S.A.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: nausea, tremori alle estremità ed a tutto il corpo, salivazione, spasmi, dispnea e midriasi.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: se si avvertono sintomi di avvelenamento per ingestione accidentale o per qualsiasi altra ragione, provocare il vomito o lavare con acqua e sapone l'area contaminata.
Chiamare immediatamente il medico.
Antidoto: iniezioni endovena di Cistina o l-Cisteina in dosi di 100 mg.

CARATTERISTICHE

Il RO-NEET controlla una vasta gamma di infestanti graminacee ed a foglia larga quali: Amarantus retroflexus (Amaranto), Avena spp. (Avene selvatiche), Capsela bursa-pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Farinaccio), Cyperus spp. (Ciperi), Dactylis glomerata (Gramigna), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Echinòchloa spp. (Giavoni), Lamium spp. (Lamio), Lolium spp. (Loglio), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Setaria spp. (Setaria), Solanum spp. (Erba morella), Sorghum halepense (Sorghetta) da seme.
Il prodotto, una volta incorporato nel suolo agisce contro le malerbe, principalmente nella fase di germinazione, rispettando la coltura.

EPOCA DI IMPIEGO: in pre-semina delle colture con incorporamento.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Le dosi d'impiego del RO-NEET variano in funzione del tipo di terreno sul quale si opera:

— su terreni leggeri e sabbiosi: 5 lt/Ha

— su terreni argillosi e ricchi di sostanza organica: 7 lt/Ha

Nella coltura di bietola autunnale, in zone con elevata presenza di infestanti graminacee, è consigliabile impiegare 8-10 litri per ettaro di formulato. A queste dosi si avrà anche un apprezzabile controllo di Veronica spp.
Quando, per un ampio controllo delle infestanti a foglia larga, viene miscelato con un prodotto all'80% di Pyrazon (tipo ERBITOX BIETOLE), le dosi più idonee sono: RO-NEET lt. 4-5 (7-8 nella coltura di bietola autunnale) per ettaro - ERBITOX BIETOLE Kg. 2-3 (3-4 nella coltura di bietola autunnale) per ettaro.
Il prodotto va distribuito con 3,5-9 quintali di acqua per ettaro, erogandolo ad una pressione non superiore alle 5 atmosfere. Dopo il trattamento (al massimo entro la giornata), il RO-NEET va accuratamente incorporato nel terreno alla profondità di 4-5 cm., (10-12 cm. nella coltura di bietola autunnale), tenendo conto che l'umidità del terreno agisce negativamente sull'efficacia del prodotto stesso, se non interrato entro breve tempo.
Per la migliore riuscita del trattamento è opportuno seguire i seguenti suggerimenti: distribuire il RO-NEET sul terreno in tempera, ben livellato, sminuzzato e privo di malerbe. E' molto importante che il prodotto venga ben incorporato nel terreno adoperando erpici a dischi, a denti od anche zappe rotanti.
Quando si usano gli erpici è consigliabile effettuare due passaggi, possibilmente in croce, nei terreni pesanti, mentre nei terreni leggeri è sufficiente un solo passaggio, al quale se ne può far seguire un secondo molto superficiale. La semina può essere effettuata anche immediatamente dopo l'incorporamento. Per favorire l'emergenza della barbabietola e dello spinacio è generalmente necessario eseguire dopo la semina una rullatura del terreno.
Dopo il trattamento, anche in presenza della coltura, è possibile effettuare una leggera lavorazione del terreno, senza però superare mai la profondità di incorporamento.
Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il RO-NEET può essere miscelato con il Pyrazon.

AVVERTENZE:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. In caso di dubbio e di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione, si consiglia di eseguire preventive prove parcellari. Far trascorrere 100 giorni dal trattamento prima di seminare la carota.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO KG. 5

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

1230

SANVEX 25 PS

Insetticida in polvere solubile in acqua per trattamenti liquidi contro la Dorifora della patata e contro i Minatori fogliari (Lithocolletis, Cemiostoma, Nepticula) del melo e del pero.

COMPOSIZIONE

- Cartap puro ....g 22,5
- Coadiuvanti,Coloranti,Inerti:quanto basta a......g 100

(R) Marchio registrato e prodotto originale TAKEDA CHEM. IND. Ltd. - Giappone

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 1230 del 28/7/1973 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa par ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione: nausea, tremori alle estremità ed a tutto il corpo, salivazione, spasmi, dispnea e midriasi.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO

Se si avvertono sintomi di avvelenamento per ingestione accidentale o per qualsiasi altra ragione, provocare il vomito o chiamare immediatamente il medico.

Antidoto: iniezioni endovena di Cistina o L-Cisteina in dose di 100 mg.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto agisce per contatto e per ingestione e si impiega alla prima comparsa dei parassiti ripetendo i trattamenti ad opportuni intervalli secondo l'intensità dell'infezione.

FRUTTIFERI

- **contro i Minatori fogliari del melo e del pero (Lithocolletis, Cemiostoma, Nepticula):** intervenire all'inizio dello sviluppo delle larve entro le foglie alla dose di **300-400g** per 100 lt.di acqua irrorati con pompe a volume normale. Ripetere i trattamenti 2-3 volte ad intervalli di 12-15 giorni per ogni generazione larvale.

PATATA

- **contro la Dorifora** : il prodotto si impiega alla dose di **g 200-250** in 100 lt. di acqua per trattamenti con pompe irroratrici a volume normale distribuenti 600-1000 lt. di miscela per Ha. Impiegando atomizzatori a basso volume aumentare proporzionalmente la dose di impiego in rapporto al minore quantitativo di acqua impiegata.

Preparazione della poltiglia: sciogliere il prodotto nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : il prodotto può essere associato alle comuni miscele fungicide ad eccezione della poltiglia bordolese e delle miscele alcaline.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non effettuare trattamenti sulle varietà di melo appartenenti al gruppo Delicious rosso (Delicious, Red Delicious, Stark Delicious, Starking,Starkrimson, Richared) che si sono dimostrate sensibili ai trattamenti con il prodotto. Sono risultate sensibili al trattamenti anche le varietà di melo Annurca, Democrat e Commercio e di pero Decana del Comizio, sulle quali si sconsiglia l'impiego del prodotto.
Sulle patate può essere usato per trattare le più diverse cultivars coltivate in Italia.

Rischi di nocività: non irrorare in fioritura perchè tossico per le api.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali .

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

1362

CARATTERISTICHE

Riduce la tensione superficiale dei liquidi consentendo così una perfetta adesività delle gocce di antiparassitario anche sulle superfici cerose o pruinose delle piante. Evita che le gocce scorrano o vadano perdute a terra aumenta l'efficacia del trattamento, diminuisce il quantitativo di liquido necessario per bagnare bene gli organi vegetali da proteggere

DOSI D'IMPIEGO

gr 50-100 ogni 100 litri di poltiglia antiparassitaria

EPOCHE D'IMPIEGO

Ogni qualvolta si usano poltiglie antiparassitarie

MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare la dose richiesta di prodotto nel totale quantitativo di poltiglia antiparassitaria ed agitare energicamente. Con la miscela così ottenuta bagnare bene tutta la vegetazione da proteggere

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari compresi quelli alcalini. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHIO A SEGUITO DEL TRATTAMENTO

Il prodotto non viene usato da solo. Si consideri il rischio corrispondente agli antiparassitari a cui viene aggiunto

INTERVALLO DI CARENZA

Il prodotto non viene usato da solo. Per l'intervento fra l'ultimo trattamento e la raccolta si segua quello corrispondente all'antiparassitario cui il prodotto viene aggiunto

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

PRUNIG®

Bagnante

Composizione.

Condensati poliossietilenici del nonilfenolo di p.m. medio 600 al 100% di puro	gr 10
Diluenti	q.b. a gr 100

Tipo di formulazione: liquido solubile

IV CLASSE

BASLINI

Industrie Chimiche Dr. Baslini

Via G. Serbelloni, 12 - Tel. (02) 77.82
20122 MILANO

Stabilimento produttore:
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione N. 1362 del 18-1-1974 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Il prodotto non viene usato da solo. Seguire pertanto anche le Norme Precauzionali degli antiparassitari a cui viene aggiunto.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

1380

ISTRUZIONI PER L'USO

L'ATRED LIQUIDO agisce per contatto e per assorbimento radicale sui germinelli delle infestanti annuali. Non è efficace verso le malerbe già sviluppate e profondamente radicate nonché quelle rizomatose (Gramigna, Melghetta, Convolvolo, Stoppione, Artemisia);
effettuare l'intervento su terreno ben lavorato e rullato, senza zolle e residui vegetali;
impiegare pompe per la distribuzione a volume normale, munite di agitatore e di ugelli con foro di 1,5-2 mm di diametro; utilizzare acqua limpida, meglio se potabile, priva di sostanze organiche;
curare l'uniformità di distribuzione. Per trattamenti localizzati sulle file di semina, calcolare accuratamente la quantità di sospensione occorrente in base alla superficie realmente trattata. In ogni caso prima del trattamento fare una « prova in bianco » con solo acqua;
non lavorare il terreno dopo la distribuzione del prodotto.
L'ATRED LIQUIDO si applica nei seguenti modi:

a) **trattamento di pre-emergenza** (subito dopo la semina del mais).
kg 4-5 per ettaro dispersi in 600-1000 l di acqua, su infestanti non ancora germinate o nelle prime fasi di sviluppo (4-5 cm di altezza della parte aerea oppure, in condizioni siccitose, di profondità delle radici).
Adottare la dose inferiore nei terreni sciolti o di medio impasto e la superiore in quelli compatti. Se entro gli 8-10 giorni dopo il trattamento non cade una pioggia è necessario fare una irrigazione.

b) **trattamento di post emergenza** (dopo la nascita del mais).
kg 5 insieme a kg 10-15 di olio bianco emulsionato per ettaro, dispersi in 600-1000 l di acqua, su infestanti alte 4-10 cm. Questo tipo di applicazione è consigliabile nei seguenti casi:
1 - con andamento stagionale asciutto e non disponendo di irrigazione
2 - nei terreni torbosi ove non sono possibili i trattamenti in pre-emergenza
3 - nel controllo di alcune graminacee quali il Giavone e la Panicastrella;
ridurre le dosi indicate a 3 kg/ha, per il mais di secondo raccolto o nei terreni molto sabbiosi o ghiaiosi. In questi casi è opportuno che l'anno seguente non succedano bietole o tabacco.

Preparazione della sospensione

Versare il quantitativo di prodotto necessario in tutta l'acqua prevista agitando accuratamente.
Per la miscela con olio disperdere separatamente i due prodotti in poca acqua e, sempre agitando, versare le poltiglie ottenute nell'acqua occorrente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità - L'ATRED LIQUIDO è miscibile con Diserbo C, Diserbo L e Oli bianchi emulsionati.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Non consociare le coltivazioni di mais e di sorgo trattate ad altre colture. Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre rispettare un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi
Prima di far seguire altre colture, effettuare una lavorazione profonda. Lavare accuratamente le attrezzature usate con acqua prima di destinarle ad altri trattamenti antiparassitari. Ove possibile si destini una sola pompa esclusivamente per la distribuzione dell'erbicida.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: kg 5

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo fresco.

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

ATRED®
LIQUIDO

ERBICIDA SELETTIVO PER IL DISERBO DELLA COLTURA DEL MAIS

COMPOSIZIONE

g 44,5 di Atrazina tecnica al 90% minimo di 2-cloro-4-etilammino-6-isopropilammino-s-triazina, corrispondenti ad un minimo di 40 g di Atrazina pura e ad un massimo di 2,2 g di triazine correlate biologicamente attive.

q. b. a g 100 di veicoli, disperdenti e bagnanti.

GRUPPO MONTEDISON
FARMOPLANT
Fitofarmaci Montedison

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILAN

Stabilimento di **Massa (MS)**

Registrazione Ministero della Sanità N. 1380 del 14-1-1974

® Marchio registrato

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

1584

WARTANE L.E.

Antioidico specifico per la difesa delle colture arboree, orticole, floreali, nonchè del tabacco

LIQUIDO EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

DINOCAP tecnico (costituito da una miscela di isomeri di cui il 78% è il 2,4 Dinitro (1-metil-eptil)-fenil crotonato e dal 22% di altri isomeri prodotti della reazione, tra cui prevalente il 2,6 Dinitro (1-metil-eptil)-fenolo	g 48
Coformulanti	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO DI INTOSSICAZIONE

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle. ***Sintomi di intossicazione:*** *sudorazione, sete, nausea, spossatezza e agitazione psico motoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia, colorazione gialla della sclere, la morte consegue ad edema cerebrale o paralisi respiratoria e circolatoria.* ***Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:*** *Intossicazione acuta. lavanda gastrica con bicarbonato di sodio all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catartici se il paziente è cosciente.* ***Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago molto frequenti nel caso di ingestione.*** *Combattere l'ipertermia con bagni freddi o estese o ripetute applicazioni fredde, spugnature d'alcool, clisteri d'acqua fredda. Trasfusioni e fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propil tiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.*
E controindicata l'atropina.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento di:
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) S.S. 255 Km 46

0901

Registrazione n. 1584 del Ministero della Sanità del 22-7-74

Il **WARTANE L.E.** è un liquido emulsionabile indicato per la lotta contro l'**oidio** delle seguenti colture: vite, pomacee, drupacee, ortaggi (bietola, carciofo, cardo, carota, cucurbitacee, fagiolo, insalata, pisello, pomodoro, zucca, zucchino), tabacco, colture floreali in pieno campo e in serra.

MODALITA E DOSI DI IMPIEGO

Colture arboree: da 25 a 50 g per Hl d'acqua con trattamenti intervallati ogni 15-20 giorni.
N.B.: non trattare durante la fioritura.

Colture ortive: iniziare i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripeterli, a seconda delle necessità terapeutiche, con intervalli minimi di 8-10 giorni.
N.B.: su coltivazioni di cucurbitacee e bietola l'intervallo tra due trattamenti successivi dovrà essere al minimo di 12-14 giorni. La dose ideale è di 25 g di prodotto per Hl d'acqua.

Tabacco: 25-30 g per Hl d'acqua con intervalli di 8-12 giorni tra un trattamento e l'altro.

Colture floreali in serra: da 10 a 12 g per hl di acqua.

Colture floreali all'aperto: da 15 a 20-25 g per hl d'acqua, se necessario ogni 7 giorni.
N.B.: prima del trattamento iniziale su Rose e Crisantemi è necessario procedere ad un saggio di sensibilità su poche piante; alcune varietà potrebbero, infatti, mostrare di non sopportare il prodotto.

ATTENZIONE: le dosi sopra riportate si riferiscono a trattamenti effettuati con attrezzature ad alto volume e le dosi minime vanno utilizzate durante il periodo stagionale più caldo. Effettuando trattamenti a basso volume d'acqua, non si deve mai superare la dose di kg 0,700 per ogni ettaro trattato (kg 0,250 nei mesi più caldi).

Preparazione della emulsione: versare la dose di **WARTANE L.E.** prestabilita in un recipiente contenente poca acqua quindi, agitando, aggiungere altra acqua fino a raggiungere il volume desiderato di emulsione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione basica od alcalina (es. Poltiglia bordolese e polisolfuri), con oli minerali (estivi ed invernali), con formulati oleosi (Carbophenothion, Parathion) e Binapacryl.
E miscibile invece con cautela con Urea e, in quanto possono verificarsi fenomeni di flocculazione fitotossici, con: Endosulfan, Ethion, Chinomethionate, Dicloran, Zolfo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA

Per l'applicazione sul melo nel periodo compreso tra l'apertura delle gemme e la fioritura, usare il Parathion separatamente. Nel caso di impiego di oli non trattare con Dinocap a distanza inferiore di tre settimane.
ATTENZIONE: Non impiegare con temperature superiori a 32°C. Su cultivar di uve sensibili quali Nebiolo, Schiava e Traminer, impiegare i dosaggi più bassi.

NOCIVITA

Il prodotto è tossico per acari ed insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto degli ortofrutticoli; 7 giorni per cucurbitacee.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO Kg 1**

1585

ZOLFO COLLOIDALE CAFFARO « 85 »

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Zolfo puro (esente da selenio): .	g 84
Coformulanti	. q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

0902

Stabilimento di ADRIA - Cavanella PO (Rovigo)

Registrazione n. 1585 del Ministero della Sanità del 22-4-1974

CARATTERISTICHE

Lo **ZOLFO COLLOIDALE CAFFARO « 85 »** controlla efficacemente **l'oidio della vite, del melo, del pesco, delle colture ortive** (cavoli, carciofo, asparago, insalate, spinacio, bietole, cardo, finocchio, sedano, salvia, prezzemolo, basilico, rosmarino, cucurbitacee, pomodoro, melanzana, peperone, fagiolo, fava, pisello, lenticchia, cece, lupino, carota, rapa, ravanello, navone, aglio, cipolla, porro) **e floreali** (rosa, crisantemo, anemone, aster, begonia, calendula, cineraria, ciclamino, garofano, lauro, magnolia, viola, zinnia) ed in genere tutte le malattie prodotte dalle Erisifacee.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

VITICOLTURA: 150 g/hl di acqua prima della fioritura. La dose dovrà essere ridotta a 100 g/hl dopo la fioritura.

FRUTTICOLTURA: 150-200 g/hl prima della fioritura. La dose sarà ridotta a 100-150 g/hl dopo la fioritura.

ORTICOLTURA e FLORICOLTURA: 100-150 g/hl.

Lo ZOLFO COLLOIDALE CAFFARO « 85 » non si cementa nei sacchi, non intasa gli ugelli e non fa schiuma.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Si stempera in poca acqua la quantità di Zolfo indicato fino ad ottenere una pasta omogenea e semidensa, diluire poi il tutto nella quantità di acqua indicata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Lo **ZOLFO COLLOIDALE CAFFARO « 85 »** è compatibile con la maggioranza degli antiparassitari in commercio, ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), degli oli minerali, del Captano, del DDVP, del Binapacryl e del Diclofluanide.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: lo **ZOLFO COLLOIDALE CAFFARO « 85 »** deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
melo: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
pero: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
vite: Sangiovese.
cucurbitacee: può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO kg 10

1613

ANTRACOL

FUNGICIDA ORGANICO

per irrorazioni su viti, pomacee, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano, tabacco e riso

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Antracol contengono:
g 70 di propineb puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
- *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
- *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
- *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
- *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: 0,15-0,2% contro la peronospora.
Pomacee: 0,15-0,2% contro la ticchiolatura.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura: 0,2% contro l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi.
Garofano in pieno campo: 0,15-0,2% contro la ruggine.
Tabacco: 0,2% contro la peronospora.
Riso: 400-500 g/q.le contro le alghe come concia della semente; 3-5 kg/ha per la lotta in pieno campo all'inizio dell'attacco.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Divieti d'impiego
- Divieto d'impiego in serra.
- Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non impiegare con mezzi aerei

Compatibilità: l'Antracol è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: varietà di pere sensibili al propineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 1613 del 29.4.1974

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

1840

® VITIGRAN Conc.

COMPOSIZIONE: Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) puro g 50, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.

20100 Milano - Casella Postale 1847

Officina di produzione CAFFARO S.p.A.
Adria, Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 1840 del 19-4-75 del Ministero della Sanità

® Marchio reg. della Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s/Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s/Meno

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

— **Viticoltura:** contro la peronospora della vite si eseguono trattamenti preventivi ripetuti con g 300-500.
— **Frutticoltura:** contro la ticchiolatura prima della fioritura g 300-200, dopo la fioritura g 200-150. Contro la bolla e perforazione delle foglie del pesco: trattamenti invernali g 800-1000, a foglie aperte g 100.
— **Orticoltura:** contro la cercospora e le ruggini di sedano, cipolla, asparago, fagiolo, pisello, cetriolo, cavolo trattamenti preventivi g 300.
— **Floricoltura:** contro la ruggine e la peronospora di rosa, garofano, crisantemo trattamenti preventivi g 300-400.
— **Colture industriali:** contro la peronospora della patata e del pomodoro, cercospora della bietola g 400-500.
— **Olivicoltura:** contro l'occhio di pavone g 300-400.
— **Agrumicoltura:** contro l'antracnosi, la fumaggine, le decorticazione e mal secco g 500-700.

Le dosi d'impiego prescritte sono riferite a 100 litri d'acqua e hanno valore indicativo puramente orientativo: possono essere pertanto aumentate o diminuite, a seconda dei casi, condizioni climatiche e gravità di attacchi.
Ad esempio in casi eccezionali di forti attacchi di peronospora sulla vite si consiglia di aumentare la dose fino a g 800.
Per preparare la poltiglia si stempera il quantitativo di VITIGRAN Conc. necessario in poca acqua e quindi, sempre rimescolando energicamente, si versa il tutto nella rimanente parte del volume d'acqua richiesto; alla poltiglia così ottenuta non va aggiunta calce.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

VITIGRAN Conc. è miscibile con insetticidi, acaricidi e fungicidi in commercio, comunque si consiglia di effettuare un saggio preliminare su poche piante. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana e di pero Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.383 Kg 1

1881

® ELOSAL

ZOLFO A MICRONIZZAZIONE DIFFERENZIATA COSTANTE OTTENUTO CON PROCEDIMENTO A UMIDO

COMPOSIZIONE: Zolfo (esente da selenio) puro g 79,2, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

— conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.

20100 Milano - Casella Postale 1847

Officina di produzione HOECHST AG
Hoechst, Francoforte s/Meno (Germania Occ.)

Registrazione n. 1881 del 19.4.75 del Ministero della Sanità

® Marchio registrato della Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

— **Frutticoltura:** contro il mal bianco e la ticchiolatura delle pomacee g 300-200 (dosi gradualmente decrescenti dall'inizio della primavera fino in estate). Contro il mal bianco del pesco: g 80-100;
— **Viticoltura:** contro l'oidio da g 100 a g 150 a seconda della frequenza dei trattamenti. Per trattamenti curativi g 150-200. Con temperature elevate adottare le dosi più basse;
— **Orticoltura:** contro il mal bianco di pomodoro, pisello, melone, cetriolo: g 80-100.
— **Floricoltura:** contro il mal bianco di rosa, ortensia, crisantemo: g 80-100.

Le dosi d'impiego prescritte sono riferite a 100 litri d'acqua ed hanno valore indicativo puramente orientativo; possono essere pertanto aumentate o diminuite a seconda dei casi, condizioni climatiche e gravità degli attacchi.
ELOSAL è di facile e rapido impiego, la dose necessaria si versa in poca acqua e si rimesta, fino ad ottenere una poltiglia omogenea, si aggiunge quindi la restante quantità d'acqua, rimestando energicamente.

CARATTERISTICHE

ELOSAL è uno zolfo micronizzato ad azione anticrittogamica con elevata adesività. Trova impiego per combattere la ticchiolatura del pero e del melo, l'oidio della vite, il mal bianco del melo, del pesco e di colture orticole e floricole.

Conservare il prodotto all'asciutto.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ

ELOSAL è miscibile con tutti gli antiparassitari, esclusi quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese ecc.), olii minerali, Captano, DDVP, Binapacryl e Diclofluanide. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

L'impiego del prodotto deve essere distanziato di almeno 3 settimane da quello del Captano o di olii minerali. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di melo: Black Ben Davis - Black Steyman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Steyman Red - Winesap, di pero: Buona Luisa D'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Docana del Comizio e di vite Sangiovese.
Può essere fitotossico sulle cucurbitacee.
Nelle zone a clima caldo e asciutto eseguire i trattamenti nelle ore fresche.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.1282

Kg 1

1916

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

TELONE*

INFIAMMABILE

Fumigante - Nematocida

Composizione

gr. 100 di prodotto contengono
gr. 78 di 1,3 Dicloropropilene puro
Epicloridrina quanto basta a 100

* Marchio registrato DOW CHEMICAL

Natura del rischio:
Intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
- Dopo l'uso distruggere le confezioni, oppure decontaminarle lavandole accuratamente con acqua calda e soda caustica al 3-4% risciacquandole ripetutamente con cura.
- Non utilizzare assolutamente le confezioni per la conservazione di bevande o di prodotti alimentari.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Tenere lontano dal fuoco e dalle fonti di calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico — tempo di latenza: anche parecchie ore. Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.

Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.

Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.

Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.

Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone.

Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.

In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.

In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg.) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena: cortisonici; ossigeno se necessario: se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).

Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in centro di rianimazione.

Controindicazioni:
Non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

CARATTERISTICHE

Liquido fumigante per la lotta contro i nematodi viventi nel terreno e destinato al reimpianto di vite, pesco ed agrumi.

DOSI D'IMPIEGO

- terreni leggeri: litri 150-200/ha
- terreni di medio impasto e forti: litri 200-250/ha

MODALITA' D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato con pali iniettori sempre su terreno nudo, previamente lavorato.

Le buchette debbono raggiungere la profondità di cm. 25-35

La fumigazione può essere effettuata anche con apposite macchine fumigatrici.

Dopo il trattamento il terreno deve essere rullato ed irrigato, onde evitare l'evaporazione del TELONE.

I migliori risultati si ottengono quando la temperatura del terreno, ad una profondità di cm. 15-20 va da 4,4 gradi a 26,7 gradi centigradi ed il terreno possiede il giusto grado di umidità.

Prima di effetturae il traplanto della coltura, effettuare una leggera aratura del terreno.

Il traplanto della della coltura dovrà essere fatto almeno 4 settimane dopo il trattamento con TELONE.

In ogni caso prima dell'impianto della coltura è necessario che il terreno non abbia nessun odore di Telone.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Non effettuare i trattamenti in vicinanza di colture arboree.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Far trascorrere almeno 28 giorni tra il trattamento ed il reimpianto

AVVERTENZE

Il TELONE è corrosivo; non usare recipienti di alluminio, magnesio e loro leghe.

Non pulire le attrezzature con acqua, ma con nafta.

Durante l'intervallo di agibilità degli appezzamenti trattati (48 ore), chi utilizza il prodotto, deve provvedere in modo adeguato a vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente protetti.

E vietato l'impiego in serre ed in ambienti chiusi.

Facilmente infiammabile. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature. Conservare lontano da fiamme e scintille. Adottare provvedimenti contro scariche elettrostatiche.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg. 60

ANTIPARASSITARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5

Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 1916 Ministero della Sanità del 13/4/76

E/1

1917

POMARSOL Z f.

90% di Ziram puro
FUNGICIDA ORGANICO

per irrorazioni
in frutticoltura, orticoltura, floricoltura ed agrumicoltura

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Pomarsol Z f. contengono:
g 90 di ziram puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Frutticoltura: 1) Pomacee: contro la ticchiolatura ed il marciume dei frutti: 0,2% prima, durante e dopo la fioritura; 0,15-0,1% per i trattamenti al verde; 0,2% per i trattamenti pre-raccolta. 2) Drupacee: contro la bolla e la perforazione delle foglie (gommosi): 0,3-0,4% alla caduta delle foglie in autunno e a fine inverno; 0,15-0,2% per i trattamenti primaverili-estivi.

Orticoltura: contro l'alternariosi e la peronospora del pomodoro, la peronospora e la septoriosi del sedano, la peronospora della patata, della cipolla e del cetriolo, l'antracnosi e la ruggine del pisello e del fagiolo: 0,15-0,2%.

Floricoltura: contro la ticchiolatura e la peronospora della rosa: 0,2%.

Agrumicoltura: contro la fumaggine, il marciume dei frutti: 0,15-0,2%.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Pomarsol Z f. è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: solo le varietà di pero Spadona, Gentil bianca, Gentilona, Camellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con Pomarsol Z f.

Nocività: evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana - Cotignola (RA) - Via S. Francesco
Registrazione Ministero Sanità n. 1917 del 19-2-1975

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 100

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2008

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

ORTHOFAT

Insetticida-aficida, in polvere solubile in acqua, per il controllo di insetti dei fruttiferi, della vite, di ortaggi, fiori, colture arboree ed erbacee, quali afidi, tripidi, tortricidi, tignole, lepidotteri vari, mosche minatrici e mosca dell'olivo.

COMPOSIZIONE

Acephate puro . . . . g 42,5
Coadiuvanti ed inerti . . . . q.b. a g 100,0

ORTHOFAT è un marchio registrato della Chevron Chemical Co.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi, o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti: 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità, n. 2008 del 2-7-1975.

MODALITA' DI IMPIEGO

Caratteristiche
L'ORTHOFAT è un insetticida organico che agisce per contatto o per azione sistemica locale, è molto rapido nell'azione contro gli afidi, mentre verso altri insetti (quali per esempio le larve ricamatrici protette dalle foglie) esplica la sua efficacia dopo qualche giorno dal trattamento.

Istruzioni per l'uso
Dosi ogni 100 litri d'acqua per trattamento a volume normale:

Colture	Parassiti da combattere	Dose (g)
Pomacee	Afidi	80-120
	Carpocapsa e ricamatrici	120-150
Drupacee	Afidi	80-120
Agrumi	Afidi	80-120
	Cocciniglie	100-150
Vite	Tignole e cicaline	80-120
	Nottue	120-150
Olivo	Mosca e tignola	80-120
	Cocciniglie	100-150
Fragola	Afidi	80-120
	Tortricidi	120-150
Colture orticole	(cavoli, carciofi, ortaggi a foglia, cucurbitacee, solanacee, legumi, ortaggi a radice)	
	Afidi, Cavolaia, Tripidi e Aleurodidi	80-120
	Nottue	120-150
Colture floreali (in pieno campo)	Afidi	80-120
	Mosche minatrici	120-150
Garofano (in pieno campo)	Bega verde	120-150

Preparazione della poltiglia
Stemperare il prodotto in poca acqua a parte, versandolo poi nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è miscibile con le comuni poltiglie antiparassitarie di impiego primaverile-estivo escluse quelle alcaline come Poltiglia Bordolese e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Su colture fruttifere evitare di effettuare trattamenti ravvicinati a più di 15 giorni. Su pesco interrompere gli interventi nei mesi estivi, eseguire saggi varietali su piccola scala ed evitare interventi prima dell'indurimento del nocciolo sulle cultivar più delicate.

RISCHI DI NOCIVITA'
Non impiegare in fioritura perchè tossico per gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta di colture in genere, 30 giorni nel caso di olivo e pomacee.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto:

2040

LINURON 50

ERBICIDA

COMPOSIZIONE:

Linuron puro g 50
Coformulanti quanto basta a g 100.

Classe III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria. Terapia: per le dermatosi, pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epatoprotettori.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche
Il LINURON 50 è una polvere bagnabile indicata per il diserbo selettivo di mais, carote, patate.
Agisce per assorbimento radicale e per contatto, è di grande efficacia erbicida e nello stesso tempo è decomposto nel terreno. Infatti alle dosi consigliate è completamente eliminato dalla flora microbica del terreno, in 3-4 mesi al massimo.
Controlla le più diffuse erbe annuali quali Giavone, Poligono, Portulaca, Matricaria, Amaranto, Chenopodio, Ranuncolo, Papavero, Setaria, Capsella, ma non controlla le erbe perenni.
Non è volatile, non è corrosivo e non è infiammabile.

Mais - I trattamenti devono essere effettuati in pre-emergenza dalla semina fino al momento dell'emergenza della coltura. Assicurarsi che il seme sia posto ad almeno 5 cm di profondità. Evitare di trattare su terreni eccessivamente sciolti e sabbiosi. Non eseguire lavorazioni dopo i trattamenti. Dosi: Terreni sciolti kg 1/ha - acqua 1 500-800 ha. Terreni di medio impasto kg 1,5 - 2/ha - acqua 1 500-800 ha. Terreni pesanti kg 2-2,5/ha - acqua 1 500-800 ha.

Carote - I trattamenti possono essere eseguiti sia in pre che in post-emergenza della coltura cioè dal giorno della semina fino a quando le erbe hanno uno sviluppo di 1-3 cm e le carote sono allo stadio di 2-3 foglioline.
E' meglio eseguirli in giornate calde ed asciutte.
Dosi: a seconda dei terreni, impiegare dosi da 1 a 2 kg/ha in 500-1.000 l acqua. La distribuzione può essere effettuata con le normali pompe a spalla.

Patate - Trattare in pre-emergenza, dal momento della semina fino all'emergenza delle piantine. A seconda dei terreni impiegare da 1,5 a 2,5 kg/ha in 500-1.000 l acqua.

Avvertenze
— Eseguire il diserbo in giornate poco ventilate.
— Preparare accuratamente il letto di semina.
— Seminare uniformemente e il più profondo possibile in relazione alla specie coltivata.
— Negli impieghi di pre-emergenza non irrorare su terreno secco nello strato superficiale.
— E' necessario che i serbatoi delle irroratrici siano muniti di agitatore affinché, durante l'esecuzione del trattamento, la poltiglia sia costantemente agitata per evitare sedimentazione di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice.
— Evitare di effettuare trattamenti in terreni decisamente sabbiosi e in quelli ricchi di scheletro.
— Lavare accuratamente l'apparecchiatura usata per la distribuzione prima di destinarla ad altri usi.

Evitare di contaminare i generi alimentari e di tenere il prodotto in vicinanza di insetticidi, anticrittogamici, concimi e sementi.
Conservare in luogo asciutto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con altri diserbanti.
Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare zone vicino a colture utili o zone interessate dalle loro radici o zone dalle quali il prodotto può essere portato a contatto con le radici stesse.
— Evitare superdosaggi e sovrapposizioni durante i trattamenti.
— Nei terreni trattati con LINURON 50 si consiglia di non seminare altre colture (al di fuori di quelle per le quali è consigliato il trattamento) se non sono passati, a seconda delle dosi, da due a tre mesi dall'applicazione del prodotto.

Non versare l'acqua di lavaggio o i residui della poltiglia in zone coltivate, vicino ad alberi.

NOCIVITA'

Non versare l'acqua di lavaggio o i residui della poltiglia in corsi d'acqua ove possono bere animali.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 80 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
20093 Cologno Monzese (MI) - Via A. Volta, 16 - Tel. (02) 253021

Stabilimento di produzione
E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)
Houston Plant - Texas (USA)

Registraz. n. 2040 del Ministero della Sanità del 11 novembre 1975

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso kg 1

2043

TANOL® E.C.

INSETTICIDA

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

PERTHANE puro		gr. 45
Coformulanti	q.b. a	gr. 100

• Contiene cicloesanone e xilolo •

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Caratteristiche: insetticida ad azione per contatto ed ingestione.

Parassiti combattuti: psille, tingidi, anarsia, tripidi, cleono, lixus, altiche, casside, mosche della frutta ed altri coleotteri, lepidotteri e ditteri parassiti delle colture.

Colture protette: vite, melo, pero, pesco, ciliegio, fragola, barbabietola da zucchero, cavoli, pomodoro, peperone, colture industriali di floreali, piante ornamentali e forestali.

Dosi d'impiego: gr. 250-500 ogni 100 litri d'acqua.

Epoche d'impiego: alla prima comparsa dei parassiti, ripetere i trattamenti a seconda del numero delle loro generazioni.

Modalità d'impiego: bagnare abbondantemente ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere, ed in particolare la pagina inferiore delle foglie.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione che con quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con Binapacryl, Zolfo, Folpet e prodotti rameici. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per le api e gli altri insetti pronubi.

Sospendere i trattamenti 15 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61 - 79.94.62
Telex: VERKIM 511046

Registrazione n. 2043
dell' 11-11-1975
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
SIPCAM S.p.A.
SALERANO SUL LAMBRO (MI)
su formula e procedimento originale della
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

2055

FOLIOL 80

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Insetticida a base di oli minerali bianchi emulsionati.

COMPOSIZIONE

— Oli minerali bianchi, con UMR minimo 94% g 80,0
— Emulsionanti, diluenti quanto basta a g 100,0

FOLIOL è un marchio SHELL.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento: VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Ozzano Emilia (BO)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 2055 del 11-11-1975

ISTRUZIONI PER L'USO

Epoche e dosi d'impiego:

Agrumi

— Trattamento tra la raccolta dei frutti e la fioritura oppure nel periodo estivo (luglio-settembre): al 3% contro la Cocciniglia Cotonosa e contro l'Iceria;
— trattamento tra la raccolta dei frutti e la fioritura oppure nel periodo estivo (luglio-agosto): al 2% contro le altre Cocciniglie.

Fruttiferi

(Pomacee: pero, melo; Drupacee: albicocco, ciliegio, pesco, susino: Olivo; Vite)

— Trattamento prima della ripresa vegetativa: al 4% contro le Cocciniglie (Aspidiotus perniciosus, Diaspis Leperii, Parlatoria oleae) e Ragno rosso;
— trattamento alla ripresa vegetativa (fase delle «orecchie di topo» o «mazzetti affioranti» per le pomacee e all'«ingrossamento alle gemme a fiore» per le drupacee): al 2% addizionato ad un estere fosforico (es. fentoato, metilparathion, parathion), contro Cocciniglie e Ragno rosso. Antonomo del melo, larve di Ricamatrici, Psilla del pero.

Modalità di preparazione dell'emulsione

Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima dell'uso indi versare la quantità occorrente di FOLIOL 80 in un recipiente, aggiungere eguale quantità di acqua e mescolare sino ad ottenere una crema senza grumi. Aggiungere l'acqua rimanente mantenendo la poltiglia in continua agitazione.

Norme applicative

Non trattare in giornate molto ventose e molto umide. Usare le comuni pompe a mano od a motore curando che il getto sia abbastanza forte e fine in modo da ben penetrare nelle screpolature dei tronchi.

Irrorare le piante in ogni loro parte, comprese le estremità dei rametti e tutto il tronco.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

Il FOLIOL 80, emulsionato in acqua, è miscibile con fentoato, dimetoato, parathion, metilparathion. In particolare la miscela tra FOLIOL 80, un estere fosforico ed un anticrittogramico si effettua aggiungendo alla sospensione già preparata dell'anticrittogamico la dose prescritta di estere fosforico e successivamente, il voluto quantitativo di FOLIOL 80 precedentemente disperso in poca acqua.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

20 giorni se usato da solo. Tuttavia, per le miscele di Foliol con formulati a base di parathion, il periodo di carenza è elevato ad un minimo di 30 giorni.

Attenzione: «Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto: l 20

2216

CARATTERISTICHE
Acaricida-insetticida sistemico ad azione per ingestione e contatto, contro uova, larve ed adulti

PARASSITI COMBATTUTI
Acari

COLTURE PROTETTE
Vite, melo, pero, pesco, agrumi, olivo, pomodoro
Rosa, garofano in pieno campo

DOSI D'IMPIEGO
gr 200-300 ogni 100 litri d'acqua

EPOCHE D'IMPIEGO
Alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione

MODALITÀ D'IMPIEGO
Bagnare bene ed uniformemente le superfici vegetali da trattare ed in particolare la pagina inferiore delle foglie. Si consiglia di aggiungere ogni 100 litri di poltiglia, gr. 100 di bagnante PRUNIG.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione che con quelli alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con olii minerali e binapacryl. Si sconsiglia la miscela con promecarb, dinocap e dodina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ
Usare precauzione nell'impiego su giovani piante

RISCHIO A SEGUITO DEL TRATTAMENTO
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

FARAN®

Acaricida - Insetticida

Composizione:

PROTOATO PURO	gr	14,25
TETRADIFON PURO	gr	5,00
Emulsionanti, solventi e diluenti (CONTIENE XILOLO)	q b a gr	100,0

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 D.P.R. 3-8-1968, N. 1255

I CLASSE VELENO

BASLINI

Industrie Chimiche Dr. Baslini S.p.A.
Via G. Serbelloni, 12 - Tel. (02) 77.82
20122 MILANO

Stabilimento produttore
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione N. 2216 del 13-4-1976 del Ministero della Sanità.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua
Evitare di respirarne i vapori
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

SINTOMI DI INTOSSICAZONE:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI:
Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi

2333

E 605 POLVERE

CLASSE I

INSETTICIDA UNIVERSALE

per la distruzione degli insetti dannosi ad apparato boccale succhiatore e masticatore come afidi, larve defogliatrici, forbicine, formiche, grillotalpa, maggiolini, vespe

COMPOSIZIONE

g 100 di E 605 Polvere contengono:
g 1,5 di metilparathion puro;
eccipienti quanto basta a 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino); **Drupacee** (pesco, albicocco, ciliegio, susino); **Pomacee** (melo e pero); **Vite, Olivo, Patata, Fragola; Ortaggi** (cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio, cipolla, carciofo, asparago); **Barbabietola da zucchero, Tabacco, Pioppo, Vivai, Colture forestali, Colture floreali ed ornamentali** in pieno campo e in serra.

Modalità d'impiego: iniziare i trattamenti alla comparsa dei parassiti e ripeterli 2 o 3 volte, in caso di necessità, ad intervalli di 10-12 giorni. I trattamenti devono essere eseguiti in giornate asciutte e senza vento, mai quando le piante sono umide di pioggia o di rugiada.

Dosi d'impiego: 15-20 kg/ha a seconda delle dimensioni e della fittezza delle piante. Contro gli insetti del terreno distribuire uniformemente sul terreno 15 g di E 605 Polvere per metro quadrato e quindi interrarlo mediante una leggera zappatura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l'E 605 Polvere deve essere impiegato da solo.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Bayer AG-Leverkusen (Germ. Occ.)

Registrazione Ministero Sanità n. 2333 del 6-10-1976

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

Divisione Agraria

Concessionaria:

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2403

M I L C O Z E B E®

Anticrittogamico, in polvere bagnabile, a base di mancozeb

Composizione
gr. 80 di mancozeb puro
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

Informazioni per il medico
— Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
— Terapia
In caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Modalità di impiego

Campo di applicazione	Parassiti combattuti	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
Vite	Peronospora, Antracnosi, Marciume nero	0,2 % = gr. 200
	Escoriosi	0,35% = gr. 350
Pomacee	Ticchiolatura	0,15-0,2 % = gr. 160-200
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)	Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi	0,2-0,3 % = gr. 200-300
Tabacco	Peronospora	0,2 % = gr. 200
Pioppo	Marssonina brunnea	0,4-0,5 % = gr. 400-500
Garofano in pieno campo	Ruggine	0,2-0,3 % = gr. 200-300
Concia semi di:		
• grano	Carie e Fusariosi	gr. 150 per q.le di seme
• riso	Piricularia, Elmintosporiosi, Fusariosi	gr. 200-250 per q.le di seme
• mais	Carbone, Fusariosi, Gibberella, Elmintosporiosi	gr. 250-300 per q.le di seme
• barbabietola da zucchero	Phoma, Fusariosi, Rizoctonia, Cercospora	gr. 600 per q.le di seme
• sementi orticole	Fusariosi, Rizoctonia, Pythium	gr. 250-600 per q.le di seme
Cereali in campo	Ruggini, Septoriosi	kg. 2-2,5 per ettaro

In generale gli interventi con MILCOZEBE dipendono dalle condizioni ambientali e dalla biologia dei parassiti, attenersi comunque ai calendari dei trattamenti suggeriti in zona.
Contro l'Escoriosi della vite intervenire alla ripresa vegetativa con due trattamenti da eseguirsi nella fase della gemma cotonosa e dell'uscita delle prime foglie.
Nei riguardi della «concia dei semi» provvedere a mescolare accuratamente ed omogeneamente il MILCOZEBE con la semente da trattare, inoltre per le sementi orticole, aumentare la dose con il diminuire della dimensione del seme.
Per la preparazione della poltiglia: versare la quantità necessaria di MILCOZEBE nel serbatoio della motopompa, contenente metà dell'acqua occorrente, facendo funzionare l'agitatore; portare poi a volume, con l'acqua mancante, sempre agitando.
Da non applicare con mezzi aerei.
Non impiegare in serra.
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità
Il MILCOZEBE è miscibile con tutti gli antiparassitari di produzione SANDOZ; è incompatibile con la poltiglia solfo-calcica, il permanganato di potassio.
Per la preparazione delle poltiglie miste, ad esempio MILCOZEBE + TIOVIT, procedere come indicato per l'approntamento della poltiglia a base di MILCOZEBE da solo, soltanto che prima di portare a volume con acqua si verserà il quantitativo necessario di TIOVIT, stemperato a parte in poca acqua, sempre agitando. Per la miscelazione del MILCOZEBE con un insetticida o un acaricida, aggiungere l'antiparassitario prescelto alla poltiglia di MILCOZEBE, già pronta per l'uso, rimescolando a fondo.
«AVVERTENZA»: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si deve evitare di trattare le varietà di pero sensibili, quali Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna. Su pomodori è bene evitare trattamenti con MILCOZEBE miscelato a concimi fogliari contenenti boro.
Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle istruzioni riportate sulla confezione è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ - S.p.A. MILANO
Divisione Agrochimica

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE
Officina di confezionamento:
S.I.C.O. di Sigognini Pietro
Via del Boschetti - Mozzanica (BG)

Registrazione n. 2403 del 23-12-1976 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 25**

• MILCOZEBE è marchio registrato dalla Rhom and Haas Co. Philadelphia USA.

2405

BLADAN M 20

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi
in agrumicoltura, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, bieticoltura, tabacchicoltura, pioppicoltura, cotonicoltura, colture forestali, piante da fiore ed ornamentali in pieno campo ed in serra

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE

g 100 di Bladan M 20 contengono:
g 19 di metilparathion puro;
emulsionanti e solventi quanto basta a 100:
« contiene xilolo ».

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi

ISTRUZIONI PER L'USO

Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino); **Drupacee** (pesco, albicocco, ciliegio, susino); **Pomacee** (melo e pero); **Vite, Olivo, Patata, Fragola; Ortaggi** (cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fagiolino, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio, cipolla, carciofo, asparago); **Barbabietola da zucchero, Tabacco, Pioppo, Cotone, Vivai, Colture forestali, Colture floreali ed ornamentali** in pieno campo e in serra.

Dosi d'impiego: 0,08-0,125% (80-125 g in 100 litri d'acqua) contro: afide brunastro e afide verde del pesco, afide grande della rosa, afide nero delle fave, afide verde della patata, afide del cotone, tignole dell'uva, altiche, antonomo del melo, casside, maggiolini, sigarai, tignola del melo, cavolaia, larve defogliatrici, tentredini delle mele, delle pere e delle susine, cecidomia delle perine, afide rosa del melo e del pero, afide degli agrumi, tingidi, tripidi, vespe, formiche;
0,125-0,15% (125-150 g in 100 litri d'acqua) contro: carpocapsa (verme delle mele e delle pere), afide verde e afide lanigero del melo, cocciniglie (S. Josè) allo stadio larvale iniziale, tignola dell'olivo;
0,15-0,25% (150-250 g in 100 litri d'acqua) contro: tignola orientale del pesco, larve minatrici delle foglie, mosca, tignola e minatrice delle cipolle, mosca dell'aglio;
0,25-0,35% (250-350 g in 100 litri d'acqua) contro: cocciniglie degli agrumi, mosca delle olive, mosca della frutta, bega o tortrice del garofano, psilla del pero, stilpnozia, crisomela, cimicetta, afide lanigero e minatrice delle foglie del pioppo;
0,5-1,3% (500-1.300 g in 100 litri d'acqua) contro: punteruolo, saperda, tarlo-vespa e gli altri tarli del pioppo.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Bladan M 20 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; quando invece si tratta di polisolfuri o poltiglia bordolese, è consigliabile usare al più presto possibile la poltiglia ed aumentare di 1/3 la dose di Bladan M 20. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Bayer AG-Leverkusen (Germ. Occ.)
Registrazione Ministero Sanità n. 2405 del 27-12-1976

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

Lt10

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2477

CARATTERISTICHE

Il **DERVAN** agisce contro tutte le erbe infestanti che crescono lungo i viali, i margini stradali, le sedi ferroviarie e tranviarie, nei cortili, nei piazzali, nelle aree industriali, nei cimiteri, nei campi sportivi.
Il **DERVAN** esplica un'azione erbicida pronta ed energica, le piante irrorate avvizziscono e ingialliscono, finendo con l'essiccare in brevissimo tempo. Anche le radici più profonde sono attaccate ed il diserbo risulta così completo e duraturo.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Il **DERVAN** si impiega alla dose di 100-400 kg/ha, secondo la natura e la vigoria delle erbe da distruggere.
- Per vegetazioni esili, con radici tenui e superficiali da 10 a 15 g per mq;
- per vegetazione rigogliose, con radici più profonde da 15 a 20 g per mq;
- per vegetazioni di pianti perenni, con radici molto sviluppate da 20 a 40 g per mq;
- per vegetazioni aventi radici molto profonde (Gramigna) da 30 a 40 g per mq.

Il **DERVAN** si impiega diluito in acqua, irrorando la soluzione sul terreno da diserbare, mediante l'uso di qualsiasi pompa irroratrice o ricorrendo semplicemente ad un comune innaffiatoio, avendo cura di impiegare non meno di 50-100 hl di acqua per ettaro. La dose da irrorare è in relazione alla maggiore o minore permeabilità del terreno. È opportuno, prima di effettuare il diserbo, innaffiare il terreno con semplice acqua, meglio se il trattamento viene fatto seguire ad una abbondante pioggia. Le stagioni più propizie per il diserbo con il **DERVAN** sono la primavera e l'autunno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **DERVAN** va usato sempre da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il **DERVAN** è fitotossico, quindi va distribuito solo sulle piante da distruggere.
Evitare il contatto con colture di qualsiasi genere anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione: da impiegare in assenza di colture agricole esclusivamente per gli scopi sopraindicati: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO kg 1

DERVAN

DISERBANTE CHIMICO AD AZIONE TOTALE

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Clorato di sodio puro	g 85
Coformulanti	q.b.a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRECAUZIONI

Evitare di mettere il DERVAN a contatto con materiale combustibile, tenendo inoltre conto delle seguenti norme:
- durante l'impiego non fumare, nè avvicinarsi ad una fiamma o ad una fonte di calore;
- utilizzare materiale metallico o in materia plastica, evitando di ricorrere a recipienti di legno;
- ripulire accuratamente con semplice acqua gli atrezzi che sono serviti all'esecuzione del trattamento.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di BRESCIA

Registrazione Ministero della Sanità n. 2477 del 19-3-1977

2483

ANTIGRAM

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Soluzione emulsionabile

Diserbante di pre-emergenza per il mais

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono

Metolachlor puro	g 45
Coformulanti (contiene xilolo)	q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- — Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- — Conservare la confezione ben chiusa;
- — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- — Non operare contro vento;
- — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo, nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.

Terapia:

Sintomatica.

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità, n. 2483 del 18-3-1977

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce per assorbimento radicale su' semi delle infestanti in germinazione.
E' efficace contro la maggior parte delle infestanti annuali e principalmente sulle graminacee quali Giavone, Poa, Digitaria, Setaria, Panico americano (Panicum dicothomiflorum), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), nonchè su alcune dicotiledoni quali Amaranto, Portulaca, Fumaria, Stellaria.
Il prodotto non è efficace sulle malerbe perennanti per rizomi, bulbi, stoloni quali Gramigna, Convolvolo, Sorghetta, Stoppione, Artemisia.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega subito dopo la semina e dopo qualche giorno, ma prima della nascita delle infestanti e preferibilmente in associazione con atrazina (Gesaprim).
Le dosi consigliate per ettaro sono:

Antigram l 2 + Gesaprim kg 2	nella generalità dei casi
Antigram l 3 + Gesaprim kg 2	nelle infestazioni miste con presenza di graminacee resistenti all'atrazina (Digitaria, Setaria).

La dose di Antigram può essere aumentata fino a 4 l/ha in presenza di infestazioni particolarmente gravi di Panicum dicothomiflorum e soprattutto in terreni pesanti. Il prodotto può essere usato anche da solo dove predominano le graminacee o nel mais di seconda raccolta.
Le dosi consigliate sono di l 5-7 per ettaro a seconda della natura del terreno; cioè la dose inferiore nei terreni sciolti e la dose maggiore in terreni ricchi di sostanza organica.
Un buon grado di umidità nel terreno subito dopo il trattamento, favorisce l'azione del prodotto. Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno non interessato dall'erbicida.
L'azione del prodotto si esaurisce durante il ciclo della coltura e non lascia residui pericolosi per le colture successive.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri antiparassitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto.

2540

CUPRAVIT BLU

per irrorazioni
in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Cupravit blu contengono:
g 35 di Rame metallico (sottoforma di idrossido)
sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Frutticoltura: 1) Pomacee - Contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde. 2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% per i trattamenti invernali.

Viticoltura: contro la peronospora della vite: 0,5-0,7%.

Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,4-0,7%.

Floricoltura in pieno campo e in serra: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano e del crisantemo: 0,3-0,5%.

Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie, la peronospora: 0,5-1%.

Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone: 0,3-0,5%.

Agrumicoltura: contro l'antracnosi, il marciume dei frutti, il mal secco: 0,3-0,5%.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Cupravit blu è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50, Tuzet).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa mantovana), e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 2540 del 16-6-1977

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

g 100

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2560

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ANTILIMAX

Specifico per la lotta contro le lumache

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 5 Metaldeide pura
Sostanze organiche q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— *Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.*

Sintomi d'intossicazione:

Violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua), riscaldare il paziente, cardiotonici, fleboclisi clorurate e glucosate con noradrenalina, diuretici, barbiturici, neuroplegici, anfetamina e derivati in caso di torpore.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilim.: Ousssolo (To)

Reg. n. 2560 Ministero della Sanità del 22 - 6 - 1977

12 / 1982

CARATTERISTICHE

L'**ANTILIMAX** agisce contro tutte le lumache (con o senza guscio).

L'**ANTILIMAX** è appetito dai molluschi dei quali provoca la morte anche se ingerito in piccole quantità; esso presenta inoltre il vantaggio di facile e pratico impiego.

DOSI E NORME D'IMPIEGO

Gr. 300 ogni 100 mq. su terreni molto infestati e in genere negli orti, giardini, serre.

Gr. 100 ogni 100 mq. in pieno campo e in genere su terreni poco infestati.

Distribuire il prodotto uniformemente a spaglio su tutta la superficie da disinfestare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto viene impiegato da solo.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

2592

IMIDAN® 50-WP

Polvere bagnabile

Insetticida - Acaricida fosforo-organico

COMPOSIZIONE :

100 grammi di prodotto contengono :

— Phosmet puro	g	52
— Coformulanti ed inerti q. b. a	g	100

® Marchio depositato
Stauffer Chemical Company
Westport - Connecticut - U.S.A.

II CLASSE

N O C I V O

STAUFFER CHEMICAL ITALIA S.p.A.
Sede legale:
Via Visconti di Modrone, 18 - 20122 Milano
Sede amministrativa:
20078 San Colombano al Lambro (Milano)
telefono 0371 / 89418 - 9
Codice Fiscale: 00830810156

Officina di produzione:
INDUSTRIAS QUIMICAS SERPIOL S.A.
Calle Jativa, 15
VALENCIA, 2 - SPAIN

Reg. Ministero Sanità n° 2592 del 13 Giugno 1977

NATURA DEL RISCHIO :

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI :

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere innocue le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio bruciando o interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE :

lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO :

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropicizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI :

Morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

PRINCIPALI IMPIEGHI DELL' IMIDAN 50 WP

Pomacee, contro il verme delle pere e delle mele (**Carpocapsa pomonella**), contro gli adulti dei minatori fogliari (**Cemiostoma, Nepticula, Lythocolletis**), contro la Psilla del pero, contro i punteruoli (fillobi), contro il Ragno rosso (**Panonychus ulmi**) e altri acari trattare con IMIDAN 50 WP, alla dose di 150-200 g per ettolitro di acqua. Contro l'afide verde ed altri afidi la dose è di 150 g aggiungendo sempre 50-60 g di bagnante adesivo irreversibile.

Drupacee: contro la Tignola orientale del pesco (**Cydia molesta**), contro il Ragno rosso ed altri acari trattare con IMIDAN 50 WP alla dose di 150 g per ettolitro di acqua.

Agrumi: contro la Cocciniglia rossa degli agrumi (**Aonidiella aurantii**) trattare con IMIDAN 50 WP a 60-70 g per ettolitro; contro la Mosca della frutta (**Ceratitis capitata**) e contro gli afidi (**Toxoptera aurantie**), intervenire con ripetuti trattamenti a seconda della intensità dell'attacco alla dose di 150 g/hl di acqua.
L' IMIDAN 50 WP si è inoltre rivelato attivo contro i ragni e i tripidi infestanti le colture agrumicole.

Olivo: contro la Mosca delle olive (**Dacus oleae**) impiegare l' IMIDAN 50 WP in forma preventiva o al massimo quando si notano le primissime punture fertili, alla dose di 125-150 g/hl di acqua.
Contro la Tignola dell'olivo (**Prays oleellus**) ridurre la dose a 100 g/hl di acqua.
Contro la Cocciniglia nera (**Saissetia oleae**) la dose deve essere invece di 150 g/hl di acqua ed i trattamenti vanno eseguiti non appena si avvertono i sintomi della infestazione.
Nella lotta contro la Mosca delle olive e della frutta, l' IMIDAN 50 WP può essere miscelato con un attrattivo proteico secondo il seguente rapporto : 150 - 300 g di insetticida più la dose consigliata di esca proteica in 100 litri di acqua. La dose d'impiego dell' IMIDAN 50 WP verrà scelta in relazione al prevedibile grado di attacco della mosca. Per la distribuzione della miscela IMIDAN 50 WP + attrattivo proteico si può impiegare la pompa a spalla, ottenendone pertanto gocce grosse, oppure qualsiasi altra pompa irroratrice.
L'irrorazione deve interessare solamente una parte della chioma e perciò bastano solo 200-250 cc di miscela per pianta; è buona norma inoltre orientare il getto irrorante in modo da investire la pianta dal basso verso l'alto.

Sull'Olivo sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta.

Patata: contro la Dorifora (**Leptinotarsa decemlineata**) intervenire con ripetuti trattamenti alla vegetazione alla comparsa delle larve sulle foglie alla dose di 150-200 g/hl di acqua.

Preparazione della poltiglia.

Riempire per metà con acqua il serbatoio della pompa - aggiungere l' IMIDAN 50 WP lentamente tenendo la miscela costantemente agitata - aggiungere la rimanente acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l' IMIDAN 50 WP è compatibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune. Si consiglia però di eseguire una prova preventiva di miscelazione ed accertare l'effettiva compatibilità dei coformulanti. L' IMIDAN 50 WP non è compatibile con prodotti alcalini quali ad esempio poltiglia bordolese, poltiglia solfo-calcica, calce e arseniati di calcio e zinco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere il trattamento 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: «da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso».

«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato».

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO. **CONTENUTO NETTO Kg 1**

2632

MORESTAN

Polvere bagnabile

FUNGICIDA - INSETTICIDA - ACARICIDA

per la lotta contro il mal bianco e i ragnetti rossi su pesco, pomacee, vite, pomodoro, cucurbitacee, piante da fiore ed ornamentali in pieno campo ed in serra, e contro la psilla del pero

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Morestan polvere bagnabile contengono:
g 25 di chinometionato puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Melo, Pesco: contro ragnetti rossi e mal bianco: 0,03-0,05% (30-50 g in 100 litri d'acqua).
I migliori risultati si ottengono eseguendo i trattamenti a intervalli di 8-10 giorni.
Pero: contro psilla: 0,15-0,2% alla rottura delle gemme; 0,1% in prefioritura ai mazzetti differenziati.
Vite: contro i ragnetti rossi, con azione secondaria contro l'oidio: 0,05%.
Ortaggi (pomodoro, meloni, cetrioli ed altre cucurbitacee): contro ragnetti rossi e mal bianco: 0,03-0,05%.
Colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra: contro ragnetti rossi e mal bianco della rosa: 0,05-0,06%. Contro i ragnetti rossi del garofano: 0,075-0,1%, evitando di intervenire sui fiori aperti.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Morestan polvere bagnabile è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra formulati come polveri bagnabili. Il Morestan polvere bagnabile non è miscibile con oli minerali e prodotti a base di TMTD; pertanto è necessario lasciar trascorrere almeno 15 giorni da un trattamento con tali prodotti. Evitare anche la miscela con zolfi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: se usato durante la fioritura delle piante da frutto, il prodotto può provocare un leggero imbrunimento dei petali. Non impiegare il prodotto sulla Golden Delicious, sulla varietà di Vite Raboso del Piave o Friularo e sui fiori aperti di garofano.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per gli ortaggi. 21 giorni prima del raccolto per fruttiferi e vite.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 2632 del 2-7-1977

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2698

ATRAB LIQUIDO

DISERBANTE SELETTIVO PER IL MAIS

COMPOSIZIONE

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

g 100 di AtraB liquido contengono:
g 42 di atrazina pura
coadiuvanti e solventi q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Terreni normali: 3-5 kg/ha, diluiti in 600-1000 lt d'acqua, da impiegarsi subito dopo la semina fino all'emergenza della coltura. La dose più bassa è indicata per terreni leggeri e di medio impasto, la dose maggiore per i terreni pesanti.
Il risultato del diserbo è migliore se il terreno è ben sminuzzato e possibilmente rullato dopo la semina e se, al momento del trattamento, è umido per recenti piogge o per irrigazioni.

2-4 kg/ha in miscela con kg 5-15 di Oliocin, diluiti in 500-700 lt d'acqua in post-emergenza delle infestanti (cm 5-10 di altezza), riservando la dose minore in caso di elevate temperature.

2-3 kg/ha in miscela con 2-3 kg di Tribunil per potenziare l'azione del prodotto contro le graminacee: Giavone, Setaria e Digitaria.

N.B. - L'efficacia erbicida si prolunga almeno fino alla rincalzatura anche se si eseguono leggere sarchiature (4-5 cm). Con la rincalzatura, che ricopre le superfici trattate, termina in pratica l'effetto erbicida che è tuttavia sufficiente, in quanto si impedisce lo sviluppo delle infestanti fino a questo periodo, quando ormai il mais non rimane più influenzato dalla loro concorrenza.

Terreni torbosi: 4-5 kg/ha in miscela con kg 12-15 di Oliocin in 500-700 litri d'acqua, in postemergenza delle infestanti, ripetendo il trattamento in caso di successiva nascita di altre infestanti.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto può essere miscelato con oli bianchi (Oliocin), come sopraindicato, per i trattamenti in postemergenza.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Nei terreni trattati non possono essere coltivate, per tutta la stagione, piante consociate (fagioli, zucchini). Nel caso la semina del mais sia effettuata dopo la raccolta del frumento, in terreni sciolti, sabbiosi e poveri di sostanza organica, ridurre la dose d'impiego a 3 kg/ha, se dopo il mais vengono seminate colture sensibili all'atrazina (bietola, pomodoro, grano, tabacco). Non impiegare il prodotto per il diserbo di altre colture e non elevare le dosi consigliate onde evitare eventuali danni alle colture successive. Dopo il raccolto del mais lavorare il terreno con arature profonde (30-35 cm), prima di procedere ad altre semine.

Avvertenze: dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Dopo l'impiego del prodotto, lavare accuratamente le pompe prima di destinarle a trattamenti con altri prodotti antiparassitari.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: I.R.C.A. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione Ministero Sanità n. 2698 del 21-2-78

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare al riparo dal gelo

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2710

TOPICIDA ASTERIAS® P.E.

CONCENTRATO PER LA PREPARAZIONE DI ESCHE

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

WARFARIN puro		gr. 0,5
Supporti	q.b. a	gr. 100,0

Tipo di formulazione: polvere secca

Caratteristiche: topicida ad azione anticoagulante del sangue. Provoca morte indolore per emorragia interna.

Nocivi combattuti e campi d'impiego: topi in genere (topi campagnoli, ratti, arvicole) ed altri roditori nocivi alle seguenti colture: vite, olivo, pomacee, drupacee, agrumi, fico, nocciuolo, melograno, cereali, leguminose da foraggio e da granella, barbabietola da zucchero, girasole, tabacco, colture ortive, colture industriali di piante ornamentali e da fiore, piante forestali. Viene inoltre consigliato per la disinfestazione dei locali di conservazione delle derrate immagazzinati e per la disinfestazione delle ripe dei fossi e dei canali.

Dosi d'impiego: mescolare gr. 20 di prodotto con gr. 250 di farina di granoturco e gr. 30 di zucchero, impastare poi con acqua e poco olio fino ad ottenere una massa simile alla polenta. Suddividerla in piccole porzioni e distribuire queste in vicinanza di colture infestate dai topi.

Epoche d'impiego: durante tutto l'anno, ad ogni necessità.

Modalità d'impiego: collocare l'esca in luoghi non accessibili ai gatti, cani, polli od altri animali domestici. Deporre l'esca in quantità abbondante, su un oggetto impermeabile all'acqua in diversi punti del campo infestato in modo che tutti i roditori possano cibarsene. Non toccare l'esca con le mani perché i topi fiutano e diffidano di ogni odore estraneo. I topi che hanno ingerito l'esca, generalmente muoiono nelle loro tane 4-5 giorni dall'ingestione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si impiega tal quale.

Nocività: il prodotto è nocivo per animali domestici, bestiame, pesci ed insetti utili.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone ed agli animali.

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79 94 61/2 - Telex 511046

Registrazione N. 2710
del 12-1-1978
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso
nel contenitore originale,
in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti ● Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento grave per ingestione.

Sintomi d'intossicazione: *emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizzano la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protrombina, la sintomatologia è prevalentemente emorragica.*

Consigli terapeutici:
Antidoto specifico: Vitamina K₁ - *Vitamina C e P; consigliabili emotrasfusioni, in casi gravi.*

VERCHIM ASTERIAS

2805

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CLASSE III

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il CUPROLENE è una preparazione fungicida a base di ossicloruro di rame in sospensione oleosa. Per il suo contenuto in rame metallico il CUPROLENE è indicato per la lotta su vasta scala contro numerose affezioni fungine delle coltivazioni.
Se ne consiglia in particolare l'impiego nella lotta contro le malattie crittogamiche dell'olivo (occhio di pavone, lebbra, fumaggine) la peronospera della vite, la cercospora della bietola.
Il veicolo oleoso del prodotto consente una distribuzione uniforme della sostanza attiva sulla vegetazione, una bagnabilità ed adesività che conferiscono al trattamento efficacia e persistenza.

DA NON VENDERSI SFUSO

CHIMIBERG

CUPROLENE

OSSICLORURO DI RAME IN SOSPENSIONE OLEOSA

COMPOSIZIONE

Rame metallo (sotto forma di Ossicloruro)	g. 17,1
Olio minerale (grado di insolfonabilità 95%)	g. 57
Sostanze emulsionanti ed additive	q.b. a 100

Prodotto nello stabilimento
SIPCAM S.P.A. DI SALERANO AL
LAMBRO (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 2805 del 30-5-1978

CHIMIBERG
BERGAMO

EPOCA DEL TRATTAMENTO

Trattamenti preventivi da effettuare in primavera ed in autunno.

DOSI DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega tal quale senza diluirlo in alcun liquido disperdente come segue: Oliveto: contro cicloconio, lebbra, fumaggine dell'olivo = kg. 14 di prodotto/Ha. Vigneto: contro peronospora della vite = kg. 10-12 di prodotto/Ha. Bietola: contro cercospora della bietola = kg. 6/8 di prodotto/Ha.

COMPATIBILITA'

Il CUPROLENE è miscelabile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il CUPROLENE è tossico per i pesci.
INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 20 giorni.

- Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONTENUTO Kg. [illegible]

2808

BIRGIN

per impedire la germogliazione delle patate da tavola

COMPOSIZIONE

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

g 100 di Birgin contengono:
g 0,9 di profan puro
eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi.

Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici: lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

ISTRUZIONI PER L'USO

I migliori risultati si ottengono se il trattamento viene eseguito all'immagazzinamento, su patate completamente asciutte.
Il BIRGIN deve essere cosparso uniformemente sui tuberi disposti in strati non superiori a 10-20 cm, in proporzione di 200 g ogni 100 kg di patate. Dopo il trattamento, coprire con teloni o sacchi o carta. Se l'immagazzinamento viene eseguito in cassette, è consigliabile rivestire preventivamente con carta l'interno delle cassette stesse.
Prima dell'immissione al consumo delle derrate trattate, provvedere all'eliminazione dell'antigermogliante residuo mediante lavaggio con acqua.

N.B. - Il prodotto non conferisce alcun odore o sapore alle patate trattate.

Compatibilità: dato il suo specifico campo d'impiego, il prodotto deve essere usato da solo.

Fitotossicità: il prodotto, essendo un antigermogliante, non deve essere impiegato su patate da seme.

**Le patate possono essere immesse al consumo
30 giorni dopo il trattamento**

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 2808 del 4/8/1978

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 300

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2817

CRONETON 10 Granulare

AFICIDA SELETTIVO
SISTEMICO
per trattamenti al terreno

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Croneton 10 granulare contengono:
g 10 di etiofencarb puro;
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

ISTRUZIONI PER L'USO

Patate: 20-30 kg/ha a pieno campo, al momento della semina; 10-15 kg/ha se localizzato lungo le file durante la rincalzatura.

Bietole: 10-15 kg/ha se localizzato lungo le file al momento della semina o di una successiva lavorazione del terreno.

Ortaggi (cavoli, insalata, fava, fagiolo, pisello, fagiolino, carciofo: 20-30 kg/ha a pieno campo al momento della semina o del trapianto o successivamente durante una lavorazione del terreno; 10-15 kg/ha se localizzato lungo le file.

Tabacco: Applicazione in semenzaio: 90 g/10 mq prima della semina, oppure dopo l'emergenza delle piantine, effettuando in tal caso un'abbondante bagnatura del terreno per favorire la penetrazione del prodotto.

Applicazione in pieno campo: trattamento lungo le file: 800-1000 g ogni 100 mt lineari effettuando la distribuzione immediatamente prima del trapianto o alla rincalzatura.

Fiori e piante ornamentali annuali: 20-40 kg/ha lungo le file, ripetendo il trattamento in caso di necessità. Per piante in vaso, comprese quelle legnose (rose, ad es.): 0,5 g per litro di terra, ciò che corrisponde a g 2-3 per vasi piccoli (fino a 20 cm di diametro) e a g 4-5 per vasi grandi (fino a 40 cm di diametro).

N.B. - Il Croneton 10 granulare deve essere leggermente interrato durante o dopo la distribuzione. Dopo l'applicazione è consigliabile effettuare un'irrigazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto va normalmente distribuito da solo; in caso di necessità può essere miscelato con nematocidi o insetticidi granulari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per gli ortaggi e 30 giorni prima del raccolto per le bietole.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 2817 del 30-5-78

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg 10

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

2835

®RONILAN

Fungicida particolarmente efficace contro la Botrite, Monilia e Sclerotinia.

Composizione

100 g di prodotto contengono:
g 50 vinclozolin puro
coformulanti q.b. a 100 g

Classe IV

Distribuzione e vendita in Italia
BASF - Agritalia S.p.A. - Milano
Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N° 2835 del 27-4-1978

®Marchio registrato della BASF

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Ronilan è un fungicida organico in polvere bagnabile ed azione preventiva e bloccante, attivo contro le principali forme di Botrite, Sclerotinia e Monilia. Il Ronilan è tollerato dalle piante e non conferisce alcun sapore ai raccolti.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Botrite della VITE

150-200 g/100 l impiegando per la distribuzione almeno 1000 l di acqua per ettaro.
Il numero di interventi è strettamente dipendente dalle condizioni climatiche, con particolare riguardo alla piovosità. In condizioni favorevoli all'attacco della malattia si consigliano quattro trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: fine fioritura, prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura, tre-quattro settimane prima della raccolta. Su varietà di vite a maturazione precoce o meno sensibili alla malattia, possono essere sufficienti tre trattamenti: prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura e tre settimane prima della raccolta. E' necessario assicurare una ricca ed uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere ed in particolare dei grappoli. Il Ronilan non influisce sulla fermentazione del mosto.

Botrite della fragola

100-150 g/100 l impiegando per la distribuzione almeno 1000 l di acqua per ettaro.
In condizioni favorevoli all'attacco della malattia intervenire nei seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, piena fioritura, e tre settimane prima della raccolta.

Monilia delle drupacee: Mandorlo, Susino, Albicocco, Ciliegio e Pesco

100-150 g/100 l

— Monilia dei rami e dei fiori
  Trattamenti all'inizio e durante la fioritura (intervallo di 8-12 giorni).
— Monilia dei frutti
  Trattamenti 4-5 e 3 settimane prima della raccolta.

Sclerotinia e Botrite delle insalate: Lattuga, Indivia e Radicchio

100-150 g/100 l. Trattare iniziando dopo il traplanto quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie e ripetere eventualmente l'intervento. Distribuire il prodotto con almeno 1 l d'acqua per 10 mq.

Botrytis dei pomodori

50-60 g/100 l. Trattare iniziando dopo la prima fioritura e ripetere l'intervento ad intervalli di 10-15 giorni.
Il volume d'acqua da impiegare è calcolato in funzione dello sviluppo e della fase fenologica della pianta in modo da distribuire: fino al 2° palco fiorale 600-800 l/ha e successivamente 1000-1500 l/ha di poltiglia.

Botrite e Marciume bianco (Sclerotium) delle liliacee e iridacee: Aglio, Cipolla, Gladiolo e Tulipano in pieno campo

Aglio: 4-5 g di prodotto per kg di bulbilli (concia a secco).

Cipolla: 10 g di prodotto per kg di seme (concia a secco).

Bulbose da fiore: 300 g/100 l trattamento per immersione per circa 15'.

Botrite delle colture floricole: Gerbera, Ciclamino, Geranio in pieno campo

50-80 g/100 l. Trattamenti preventivi ripetuti.

Per ottenere una poltiglia più omogenea è utile stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI

Il Ronilan è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio Polyram Combi e Kumulus S. Il Ronilan è miscibile anche con i fertilizzanti fogliari Hakaphos e Basfoliar 34. Si sconsiglia di miscelare il prodotto a poltiglie fortemente alcaline.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

2861

Diserbante liquido specifico per le colture del mais e della soia

CLASSE IV

COMPOSIZIONE

- Chloramben puro .... g 23
- Emulsionanti .... q.b. a g 100

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'AMIBEN LIQUIDO è un erbicida che agisce sulla vegetazione attraverso un assorbimento radicale che è sollecito quando nel terreno esiste un grado di umidità tale da consentire la penetrazione del prodotto nello strato di terreno ove si esplica l'attività delle radici e quando, in condizioni non idonee di umidità, al trattamento seguono brevi piogge o si esegue una leggera irrigazione.

L'AMIBEN LIQUIDO agisce sulle malerbe quando si trovano allo stadio di germinello e pertanto non deve essere applicato su vegetazioni già affrancate.

L'AMIBEN LIQUIDO è un diserbante specificamente studiato per la lotta contro le malerbe annuali che infestano le colture del mais e della soia. In particolare risultano sensibili all'**AMIBEN LIQUIDO** malerbe come Stellaria, Portulaca, Amaranto, Setaria, Giavoni, Digitaria, Chenopodio, Poa, Persicaria, Ortica.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

La dose di impiego dell'**AMIBEN LIQUIDO** è di **10-16 kg** per ettaro di superficie. La dose più bassa è consigliata quando i trattamenti vengono eseguiti in terreni eminentemente sabbiosi. La dose più elevata per contro, si impiegherà nei terreni tendenzialmente pesanti. L'epoca migliore per l'applicazione del prodotto si verifica dopo la semina della coltura; è tuttavia possibile trattare anche dopo, ma comunque non oltre 3-4 giorni dall'avvenuta semina. Il terreno deve essere accuratamente lavorato e le zolle vanno sminuzzate il più possibile onde permettere una omogenea distribuzione del diserbante sulla superficie del terreno. Non eseguire il trattamento in terreni torbosi.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA' : L'AMIBEN LIQUIDO è compatibile con la generalità dei diserbanti.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' : Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Officina di produzione: ANIC AGRICOLTURA S.p.A.
Carrara Avenza (Massa Carrara)

VOLUME LITRI : 1

Registrazione del Ministero della Sanità N° 2861 dell' 8 giugno 1978

DA NON VENDERSI SFUSO

AMIBEN® è un marchio registrato della Union Carbide Agricultural Products Company Inc., USA.

83531

2892

CABOR 50 PB

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Composizione: gr 100 di prodotto contengono:
— CARBARYL puro . . . . gr 47,5
(esente da B-naftolo)
— coformulanti q.b. a . . . . gr 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. - Evitare di respirarne i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *Avvelenamento acuto per ingestione e per contatto cutaneo. (Inibitore della Colinoesterasi).*

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

CONSIGLI TERAPEUTICI: Lavaggi gastrici, con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto.
Atropina solfato (Mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare. Da ripetere secondo il bisogno.

ATTENZIONE a non somministrare dosi eccessive di Atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Il **CABOR 50 PB** si impiega contro la cidia del pesco, carpocapsa del melo e del pero, tignola della vite, olivo, agrumi, ricamatrice della frutta, cacecia ed eulia del melo e pero, cavolaia, dorifora della patata, bega del garofano in pieno campo, piralide e sesamia del mais, altica, casside, mamestra e caradrina della bietola, fitonomo, misurino, apion ed altri fitofagi delle foraggere.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO: il Cabor 50 PB si impiega alla dose di 150-200 gr/hl d'acqua, elevabile a 250 gr/hl quando deve essere controllata la cidia del pesco. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo-bagnante. Sciogliere la giusta dose del prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantità fino ad ottenere la concentrazione prevista.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITÀ: Il Cabor 50 PB è compatibile con la generalità dei fitofarmaci di più comune impiego ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITÀ: L'impiego del Cabor 50 PB è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci ed insetti utili. Non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione n. 2892 del 23/12/1978 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g 200**

SEPRAN s.r.l.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
Telefoni Num.: (0444) 95.81.80 - 95.81.90

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

2960

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

PARA - RAVIT 80

Emulsione insetticida di olii minerali per la lotta contro le cocciniglie e le nuova svernanti del ragno rosso e di altri parassiti degli alberi fruttiferi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 80 Olio di paraffina (insulfonabilita 95%)
Sostanze emulsionanti e disperdenti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confeziono ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'implego del prodotto.
- Non contaminare alimenti c bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Il **PARA-RAVIT 80** è un prodotto composto di olii minerali raffinati (95% di insulfonabili). Non produce ustioni ed è tollerato da piante delicatissime coltivate in serra, può essere impiegato anche nei trattamenti estivi nei climi più caldi.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **PARA-RAVIT 80** può essere impiegato sia in trattamenti invernali che in trattamenti primaverili-estivi da solo o in unione con il **Parafene**.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 2960 Ministero della Sanità del 10 - 11 - 1978

12 / 1982

DOSI

IN FRUTTICOLTURA:

Pomacee e drupacee al risveglio vegetativo, contro l'Aspidiotus Perniciosus, Diaspis Pentagona, uova svernanti di Ragno Rosso, di Afidi, uova di Psilla, crisalidi di Cemiostoma: kg. 2-2.5 per hl. di acqua.

Drupacee nel periodo estivo: contro la Diaspis Pentagona in corrispondenza della fuoriuscita delle Neanidi di prima e seconda generazione a kg. 0.400-0.600 per hl. d'acqua.

IN VITICOLTURA:

Al risveglio vegetativo contro le Cocciniglie kg. 2-2,5 per hl. d'acqua più **Parafene Rosso** gr. 200-300 per hl. d'acqua.

IN AGRUMICOLTURA:

Contro l'Acaro delle Meraviglie alla fine della vegetazione autunnale a kg. 2 per hl. d'acqua.

Contro le Cocciniglie degli agrumi nel periodo maggio-agosto a kg. 1-1.5 più **Parafene Rosso** gr. 200 per hl. d'acqua.

IN FLORICOLTURA: In pieno campo o in serra

Contro le Cocciniglie (Aspidiotus Hederae, Parlatoria Pergandei, Biancorossa, Aonidiella Perniciosa, Aulacaspis rosae e Cocciniglia bianca a kg. 1-1,200 più gr. 200 di **Parafene Rosso**.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **PARA-RAVIT 80** è miscibile al Veravit, M 555, Dithane Z-78, Dithane M 45, Zirasan 90, Parafene, Metilon. Non è miscibile con prodotti a base di zolfo, di Karathane e alla Poltiglia Bordolese e Solfocalcica.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il trattamento di **PARA-RAVIT 80** deve essere distanziato di almeno 15 giorni dal trattamento con Zolfi bagnabili, con Polisolfuri, con Poltiglia Bordolese o con prodotti contenenti Zolfo o Karathane.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

2987

LONACOL ramato blu

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

per irrorazioni su vite, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Lonacol ramato blu contengono:
g 13 di zineb puro,
g 30 di rame metallico (sotto forma di ossicloruro),
bagnanti, sospensivanti, coloranti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. - Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,25-0,4% contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano.

N.B. - a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.
c) Le eventuali differenze di colore non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto.

Divieti d'impiego

— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Locanol ramato blu è miscibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: in caso di andamento climatico freddo e piovoso è sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Visplant-Chimiren - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione Ministero Sanità n. 2987 del 22-12-1978

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: Kg25

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3034

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Evitare di respirarne i vapori - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (es. interrandole in fosse profonde cospargendo con calce). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).

L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale: non attendere la comparsa dei sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata l'emodialisi.

Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza assorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione.

I primi sintomi sono: epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato renali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat (o diquat) nel sangue.

Intossicazione per contatto.

Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).

Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.

Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta

Terapia sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico. In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del paraquat (o diquat) e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla società produttrice di questo presidio sanitario.

VALQUAT

COMPOSIZIONE

Gr. 100 di prodotto contengono:

PARAQUAT dicloruro puro	gr. 17,86
Bagnanti e Diluenti q.b. a	gr. 100

CLASSE I

VELENO

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

DISERBANTE - DISSECANTE PER LE COLTURE FRUTTICOLE, ORTICOLE E PER IL DISERBO DELLE AREE INDUSTRIALI.

S.p.A. Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa: FAENZA (RA) - Via S. Silvestro, 1

Reg. N. 3034 del 5-3-1979 del Ministero della Sanità

MODALITA' D'IMPIEGO

Il VALQUAT distrugge immediatamente le parti verdi della pianta risultando inefficace nei confronti delle parti legnose; può essere usato in qualsiasi periodo dell'anno essendo resistente alla azione dilavante della pioggia anche se questa dovesse cadere poco dopo aver effettuato il trattamento.

Il VALQUAT non lascia residui tossici nel terreno perché completamente inattivato dopo poco tempo. Il trattamento con VALQUAT deve essere effettuato in presenza di infestanti usando attrezzature munite di getto uniforme e controllato.

Per diserbi totali, diserbo controllato e non - coltura dei Vigneti, Frutteti, Agrumeti, preparazione di piazzole per Oliveti, diserbo interparcellare ed interfilare di colture industriali, Orticole e Floreali, diserbo di Asparagiaie

Kg. 2-4 per ettaro di superficie

Per diserbo primaverile Erba Medica

Kg. 2,5-3 per ettaro di superficie

Per diserbo vivai, diserbi pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza, lotta alla cuscuta

Kg. 3-5 per ettaro di superficie

Per diserbo sponde canali

Kg. 5-10 per ettaro di superficie

In genere consigliamo di sciogliere le suddette dosi in un quantitativo di acqua pari a 300-600 litri per ettaro, a seconda dello sviluppo delle infestanti.

Per aumentare l'efficacia del VALQUAT si consiglia di aggiungere alla soluzione 700-800 grammi di VALSOL per ogni ettolitro di soluzione, ad eccezione che nel diserbo della vegetazione sommersa dei canali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con Insetticidi ed Anticrittogamici. Il prodotto è miscibile con la maggior parte dei diserbanti. - AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere nocivo per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia l'uso del prodotto solo sulle colture consigliate. Evitare di colpire colture limitrofe o sensibili.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

E' vietato l'impiego diretto sui Foraggi

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 0,500

3043

FOLITHION

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi
in agrumicoltura, frutticoltura, olivicoltura, orticoltura, cerealicoltura, bieticoltura, tabacchicoltura, pioppicoltura, piante da fiore ed ornamentali in pieno campo ed in serra

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Folithion contengono:
g 48,5 di fenitrothion puro;
emulsionanti e solventi quanto basta a 100.
« contiene xilolo »

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Colture: Agrumi (arancio, clementine, limone, mandarino); **Drupacee** (pesco, albicocco, ciliegio, susino); **Pomacee** (melo e pero); **Vite; Olivo; Patata; Fragola; Ortaggi** (cavoli, insalata, lattuga, spinacio, bietole da foglia e da costa, cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo, pomodoro, peperone, melanzana, fagiolo, fava, pisello, carota, bietola rossa, rapa, aglio, cipolla, carciofo, asparago); **Cereali** (mais, riso, grano, orzo); **Barbabietola da zucchero; Tabacco; Pioppo; Colture floreali ed ornamentali** in pieno campo ed in serra.

Dosi di impiego: 0,15-0,2% (150-200 cc in 100 litri d'acqua) contro: tripidi, aleurodidi, afidi, cocciniglie, larve defogliatrici, tignole, eulia, altiche, larve minatrici, bega del garofano.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Folithion è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra; quando però si tratta di polisolfuri o di poltiglia bordolese è consigliabile usare al più presto possibile la poltiglia ed aumentare di 1/3 la dose di Folithion. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su pomacee e drupacee non usare il prodotto a cavallo della fioritura.

Nocività: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 3043 del 6/4/1979

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare al riparo dal gelo

g 100

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3076

MESUROL - Esca

LUMACHICIDA-INSETTICIDA GRANULARE

per la distruzione di

lumache, chiocciole, limacce, grillotalpe, agrotidi e grilli

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Mesurol-Esca contengono:
g 4 di metiocarb puro
sostanze attrattive, coloranti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dose d'impiego: 3-5 kg/ha a seconda del grado di infestazione.
Modo d'impiego: distribuire il prodotto a spaglio, il più uniformemente possibile. Per evitare invece infestazioni dall'esterno, è consigliabile distribuire il prodotto lungo i margini del campo per una larghezza di 1-2 metri.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto deve essere distribuito da solo.
Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 3076 del 12.5.1979

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 200

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3100

GESAL ORTO CARBARYL

Insetticida in polvere bagnabile per la lotta contro vermi e tignole ed altri insetti in frutticultura, viticultura e orticultura

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono
Carbaril puro (esente da ß-naftolo) gr 47,5
Coadiuvanti e inerti q.b. a gr 100

CLASSE III

Attenzione manipolare con prudenza

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: Avvelenamento acuto per ingestione, contatto cutaneo (Inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici: Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.

Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Dosi e modalità di impiego

Il **NETOX S. 50** si usa alla dose di gr 200 per 100 litri di acqua contro i seguenti parassiti: carpocapsa del melo e del pero, larve ricamatrici, tignole della vite, cydia del pesco, tignole delle susine e delle albicocche, cavolaia delle crucifere, dorifera della patata.

Da non applicarsi con mezzi aerei

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con tutti i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, il pesce e il bestiame.

Sospendere il trattamento 7 giorni prima della raccolta

« **Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. »

AIRWICK ITALIA S.p.A.
Gruppo CIBA - GEIGY - Origgio (Varese)
Officina di produzione: ~~SIPCAM - Salerano sul Lambro~~ (Milano)

Registrazione Ministero Sanità n° 3100 del 18 Aprile 1979

DA NON VENDERSI SFUSO CONTENUTO G. 250

3132

SEPR-OIL

OLIO BIANCO EMULSIONATO

COMPOSIZIONE: gr 100 di prodotto contengono:
— Olio bianco paraffinico al 95-96 % U.R. . . gr 80
— Coformulanti . . . . q.b. a 100

C L A S S E I I I

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DI RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti bevande e corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone - Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: Il **SEPR-OIL** è un insetticida a base di oli minerali che trova applicazione nel controllo delle varie specie di cocciniglie in olivocoltura, frutticoltura, agrumicoltura, piante ornamentali. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia coprendo con una pellicola il corpo degli insetti e occludendo le aperture tracheali. Si impiega sia in trattamenti invernali prima della ripresa vegetativa che in applicazioni primaverili estive.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: in trattamenti a volume normale il **SEPR-OIL** si impiega alle seguenti dosi:
— **Frutticoltura** (melo, pero, pesco): 4 kg/hl nei trattamenti prima della ripresa vegetativa e 2 kg/hl alla ripresa vegetativa addizionati ad un estere fosforico;
— **Agrumicoltura**: 2-3 kg/hl durante il periodo invernale (dalla raccolta alla prefioritura). In estate, e comunque con alte temperature, tali dosi andranno ridotte a 1-1,5 kg/hl.
— **Olivo**: 1,3-1,5 kg/hl addizionati ad un estere fosforico;
— **Piante ornamentali in pieno campo (oleandro, rosa)**: 1-1,2 kg/hl addizionati in un estere fosforico. Durante l'estate, e con le alte temperature tali dosi dovranno essere ridotte a 0,5-0,6 kg/hl.

Sciogliere il prodotto in poca acqua e versare poi l'emulsione così ottenuta nel rimanente quantitativo di acqua necessaria a raggiungere la concentrazione dovuta.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina come gli zolfi ed i polisolfuri. Qualora si fossero effettuati trattamenti con prodotti a base di zolfo, l'applicazione col **SEPR-OIL** deve essere distanziata di almeno 15 giorni.

AVVERTENZA: In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

— **Rischio di nocività**: da non applicare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

« **ATTENZIONE** »: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

S E P R A N s . r . l .
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogollo, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

OFFICINA DI PRODUZIONE: TERRANALISI s.n.c. RENAZZO DI CENTO (FE) - Via IV Novembre

Registrazione N. 3132 del 5/6/1979 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO CONTENUTO litri 0,500

3174

LONACOL ramato

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

per irrorazioni su vite, pomodoro fino alla prima fioritura, garofano

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Lonacol ramato contengono:
g 13 di zineb puro,
g 30 di rame metallico (sotto forma di ossicloruro),
bagnanti, sospensivanti, ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. - Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,3-0,4% contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano.
N.B. - a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.

Divieti d'impiego

— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Locanol ramato è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: in caso di andamento climatico freddo e piovoso è sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 3174 del 4-6-1979

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: Kg **10**

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3181

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

VITAR

Fungicida cupro-organico

VITAR è un anticrittogamico attivo che risulta dall'associazione di un ossicloruro di rame e di un fungicida di sintesi: lo Zineb.

COMPOSIZIONE IN PESO

Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)	g 30,0
zineb puro	g 13,6
diluenti, disperdenti, coloranti	quanto basta a g 100,0

VITAR è un marchio Shell

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto;
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni, alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

In caso di ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

Shell Agricoltura

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3181 del 14/1/1980

MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO

Viticoltura: Il VITAR ha una azione antiperonosporica. Il VITAR non ha alcuna azione sulla fermentazione dei mosti, la qualità e la conservazione dei vini. Dosi: 350-500 g di VITAR ogni 100 litri d'acqua per normali trattamenti. 500 g ogni 100 litri d'acqua per gli ultimi trattamenti e in caso di forti attacchi.

Frutticoltura: Nella lotta contro la ticchiolatura delle pomacee.
Dosi: 300-400 g di VITAR ogni 100 litri d'acqua.

Colture orticole ed industriali: Per la lotta contro la peronospora e l'alternaria del pomodoro. Dosi 350-500 g di VITAR ogni 100 litri d'acqua.

NOTA - *I trattamenti su pomodoro devono essere limitati alla prima fioritura.*

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire il prodotto in poca acqua, rimescolando con cura la miscela, quindi aggiungere la quantità d'acqua necessaria per ottenere la concentrazione stabilita.
E' altresì raccomandabile l'aggiunta di Bagnante Shell per trattamenti in frutticoltura.

Divieto d'impiego.

— **divieto di impiego in serra;**
— **divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.**

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

Il formulato non è compatibile con permanganati di sodio e di potassio.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto non deve essere impiegato in fioritura. Inoltre:
— le seguenti varietà di pero risultano essere sensibili allo zineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
— le seguenti varietà di pero sono cuprosensibili perciò, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione e se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
— le seguenti varietà di melo sono pure cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione e se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la ripresa piena vegetativa: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto:

3273

ETAZIN R BLU

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE BLU
A BASE DI OSSICLORURO DI RAME E ZINEB

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono

Rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico)	gr 30
Zineb puro (etilenbisditiocarbammato di Zinco) . .	gr 13
Coloranti, disperdenti, inerti q. b. a	gr 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, son nolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione. In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

L'ETAZIN R BLU è un prodotto per la lotta contro la Peronospora della vite; la Ticchiolatura del melo e del pero. Si usa a dosi varianti da 400 a 500 grammi per ettolitro di acqua eseguendo i trattamenti alla distanza di 8 - 10 giorni l'uno dall'altro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

Compatibilità: l'**ETAZIN R BLU** è miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili allo ZINEB: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA

Su varietà di melo (*) e pero (**) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonatham, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

(**) Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

TERRANALISI s. n. c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207
Stabilimento di produzione:
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via San Francesco - Cotignola (RA)
Registrazione n. 3273 del 25-10-1979 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO PESO NETTO KG **25**

3320

ANTRACOL Blu

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni su viti, pomacee,
pomodoro fino alla prima fioritura, garofano

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Antracol blu contengono:
g 65 di propineb puro;
bagnanti, sospensivanti, coloranti ed eccipienti q.b. a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: 0,15-0,2% contro la peronospora.
Pomacee: 0,15-0,2% contro la ticchiolatura.
Pomodoro: fino alla prima fioritura: 0,2% contro l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi.
Garofano: 0,15-0,2% contro la ruggine.
N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Le eventuali differenze di colore non hanno alcuna influenza sull'efficacia del prodotto.

Divieti d'impiego
— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l'Antracol blu è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: varietà di pere sensibili al propineb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 3320 del 29-11-1979

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: g 10

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3322

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE - Fungicida organico per la lotta contro la ticchiolatura delle pomacee, la peronospora della vite, l'alternariosi e septoriosi del pomodoro, ruggine del garofano, la marssonina e ticchiolatura del pioppo e la peronospora tabacina.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Mancozeb p.a. puro g 80
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua — Non operare contro vento — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto — Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta — Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Dosi per 100 litri d'acqua: g 150-200.
Vite: contro la peronospora, nei trattamenti pre-fiorali ed in fioritura. **Pomacee**: contro la ticchiolatura, ruggini, corineo, monilia. **Pomodoro**: solo fino alla prima fioritura: contro peronospora alternariosi, cladosporiosi e septoriosi, antracnosi. **Garofano in pieno campo**: contro la ruggine. **Pioppo**: contro la marssonina, ticchiolatura. **Tabacco**: contro la peronospora tabacina.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON IMPIEGARE IN SERRA.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume.

COMPATIBILITA'
l'M 70 è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci, fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese).
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si sconsiglia l'impiego del prodotto su alcune varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per i pesci

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione N. 3322 del 20.11.1979 del Ministero della Sanità

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano - via Piave 2
OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Stabilimento di Bolzano - via Siemens 12

DA NON VENDERSI SFUSO.
(Mancozeb - Brevetto della Rohm & Haas Co. Filadelfia)
Contenuto Kg 1

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

3356

CUPRAVIT MICRO blu

OSSICLORURO DI RAME MICRONIZZATO

per irrorazioni
in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, bieticoltura, olivicoltura e agrumicoltura

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Cupravit Micro Blu contengono:
g 30 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
sospensivanti, bagnanti, coloranti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: *in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

ISTRUZIONI PER L'USO

Frutticoltura: 1) Pomacee - Contro la ticchiolatura: 0,25-0,3% prima della fioritura; 0,2-0,25% dopo la fioritura; 0,15-0,2% per i trattamenti al verde. 2) Drupacee - Contro la bolla del pesco, la perforazione delle foglie: 1% solo per i trattamenti invernali.

Viticoltura: contro la peronospora della vite: 0,4-0,5%.

Orticoltura: contro la septoriosi del sedano e del pomodoro, l'antracnosi del pisello, la peronospora della patata, del pomodoro e della cipolla, l'alternariosi della patata e del pomodoro: 0,5%.

Floricoltura in pieno campo o in serra: contro la peronospora e la ticchiolatura della rosa, la ruggine del garofano, la septoriosi del garofano e del crisantemo: 0,3-0,5%.

Bieticoltura: contro la cercospora o vaiolatura delle foglie e la peronospora: 0,5%.

Olivicoltura: contro il vaiolo o occhio di pavone: 0,5%.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il Cupravit Micro è miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di quelli che contengono TMTD (Pomarsol 50). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino, e varietà di melo (Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana), e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 3356 del 7-1-1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg. **10**

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3391

CAPTAN 83 - BAYER

FUNGICIDA ORGANICO

per irrorazioni

CLASSE IV

COMPOSIZIONE

g 100 di Captan 83-Bayer contengono:
g 83 di captan puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua e digitale).

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,15% contro la ticchiolatura delle pomacee, il Gloeosporium, la peronospora della vite, il marciume grigio (Botrytis) dell'uva, la peronospora e l'alternariosi della patata e del pomodoro, l'antracnosi del fagiolo ed il marciume (Botrytis) delle fragole, la peronospora, la ticchiolatura ed il marciume della rosa, l'alternariosi e altre malattie del garofano, la fumaggine ed il marciume bruno dei frutti degli agrumi.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Contro il marciume delle talee di azalea, garofano e crisantemo: immergere l'estremità inferiore delle talee in una soluzione allo 0,25% e quindi piantarle. Contro il marciume dei bulbi da fiore: immergere i bulbi per 1/2 ora in una soluzione allo 0,6% e quindi piantarli dopo averli fatti asciugare.

Disinfezione del terreno: contro il marciume e l'avvizzimento delle piantine in semenzaio ed in vivaio (Phytium, Phytophthora e Rizoctonia) irrorare o annaffiare il terreno con 0,5-0,75 litri per metro quadrato di una soluzione allo 0,15-025%. Iniziare i trattamenti quando i semi sono germinati e ripeterli settimanalmente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Captan 83-Bayer è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordelese, polisolfuri ecc.), con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto, ma per le uve destinate alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 3391 del 4-4-1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg 25

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

Divisione Agraria

Concessionaria:

3482

ORTHOCIDE 83

FUNGICIDA ORGANICO

CLASSE IV

per irrorazioni in
frutticoltura, viticoltura, orticoltura, floricoltura, agrumicoltura
e per la disinfezione del terreno

COMPOSIZIONE

g 100 di Orthocide 83 contengono:
g 83 di captano puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,15% contro la ticchiolatura delle pomacee (melo e pero), la peronospora della vite, il marciume grigio (Botrytis) dell'uva, la peronospora e l'alternariosi della patata e del pomodoro, l'antracnosi del fagiolo ed il marciume (Botrytis) delle fragole, la peronospora, la ticchiolatura ed il marciume della rosa, l'alternariosi e altre malattie del garofano, la fumaggine e il marciume bruno dei frutti degli agrumi.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Contro il marciume delle talee di azalea, garofano e crisantemo: immergere l'estremità inferiore delle talee in una soluzione allo 0,25% e quindi piantarle. Contro il marciume dei bulbi da fiore: immergere i bulbi per 1/2 ora in una soluzione allo 0,6% e quindi piantarli dopo averli fatti asciugare.

Disinfezione del terreno: contro il marciume e l'avvizzimento delle piantine in semenzaio ed in vivaio (Phytium, Phytophthora e Rizoctonia) irrorare o annaffiare il terreno con 0,5-0,75 litri per metro quadrato di una soluzione allo 0,15-0,25%. Iniziare i trattamenti quando i semi sono germinati e ripeterli settimanalmente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l'Ortocide 83 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.), con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark Delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto, ma per le uve destinate alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 3482 del 13.9.1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg 1

CHEVRON CHEMICAL COMPANY S. A. FRANÇAISE

Concessionaria:

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3590

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 63 di ETOSSICHINA pura
Coformulanti q.b. a 100.

SCALDEX[R]

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

REGOLATORE PER PREVENIRE IL "RISCALDO" DELLE MELE DURANTE LA CONSERVAZIONE IN MAGAZZINO

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

MODALITA' E DOSE D'IMPIEGO:
Effettuare il trattamento dopo la raccolta per immersione o per irrorazione con attrezzature e macchine all'uopo predisposte. Far seguire il trattamento subito dopo la raccolta in presenza di merce a giusto grado di maturazione. Nel caso di mele verdi ed immature, lasciare trascorrere una settimana all'aperto, affinchè avvenga un'idonea maturazione della merce prima di eseguire il trattamento, avendo cura in entrambi i casi, dopo il trattamento, di lasciare asciugare bene le mele prima di immetterle in frigorifero o nelle celle ad atmosfera controllata.

DOSE D'IMPIEGO PER 100 LITRI D'ACQUA
Le dosi variano a seconda delle varietà da trattare:

Imperatore o Morgenduft, Rome Beauty, Stayman Winesap, Granny Smith, Stayman Red, Winter Winesap, Lavina, Carla, Commercio, Abbondanza, ecc.:	250 cc
Gruppo Delicious: (Stark Delicious, Delicious comune, Starking, Richared)	250 cc
Golden Delicious	150 cc

AVVERTENZE: Il contatto tra la soluzione e la frutta deve essere di circa 20 secondi. La soluzione di SCALDEX può essere utilizzata nel corso della giornata per 8 ore. Ogni giorno deve essere preparata fresca e quella residuata del giorno precedente eliminata, nel caso di impianti a spruzzo o a ruscellamento (Drencer).
Se si tratta invece di impianti per immersione in vasca, la soluzione va rinnovata almeno una volta alla settimana. Le aggiunte giornaliere in questo caso vanno effettuate con dosi di prodotto alla concentrazione indicata in etichetta per ettolitro d'acqua. Rinnovare la soluzione nel corso della giornata nel caso che si sporchi, come può accadere, quando si effettuano i trattamenti senza il lavaggio della frutta o si immergano nella vasca destinata al trattamento casse o cassoni sporchi.
La temperatura ideale della soluzione è attorno ai 15 - 18° C. Per la preparazione della poltiglia versare la prestabilita dose del prodotto preparata a parte nel totale quantitativo d'acqua, immescolando con cura.
AVVERTENZA: La soluzione eccedente ai trattamenti, prima di essere scaricata dalle vasche, dovrà essere opportunamente trattata per la depurazione., o diluita(es.1:100)

COMPATIBILITA'
Prima di impiegare lo SCALDEX in miscela con altri prodotti, verificare la compatibilità.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITA' : E' tossico per i pesci.
TEMPO DI CARENZA: DALL'ULTIMO TRATTAMENTO LASCIARE INTERCORRERE 90 GIORNI ED INOLTRE UNA SETTIMANA A TEMPERATURA AMBIENTE PRIMA DELL'IMMISSIONE AL CONSUMO.

"Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

J. & A. MARGESIN S.p.A. - FITOFARMACI - LANA D'ADIGE (BZ)
Officina di produzione: Lana d'Adige (BZ)
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SANITA' N° 3590 DEL 30-5-1980
DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO : LT. 20

3626

CARATTERISTICHE

Il **RISCALD CONTROL** è un preparato a base di Etossichina studiato per prevenire o ridurre l'alterazione chiamata « riscaldo fisiologico » a cui vanno soggette le mele durante la conservazione in magazzino ed in frigorifero.

Le proprietà anti-ossidative del **RISCALD CONTROL** consentono di bloccare o di rallentare i processi biochimici che stanno alla base di questa ben nota fisiopatia.

Le varietà di mele più frequentemente soggette al « riscaldo » sono la « Granny Smith », quelle del gruppo « Red Delicious », quelle del gruppo « Stayman », la « Imperatore » o « Morgenduft », la « Rome Beauty », quelle del gruppo « Golden Delicious » e poche altre di importanza minore quali la « Lavina », la « Carla », la « Commercio » e la « Abbondanza ».

DOSI E MODI DI IMPIEGO

I sistemi di impiego del prodotto sono fondamentalmente due:

— irrorazione dei frutti sulla pianta;

— trattamento per immersione o aspersione dei frutti in fase di pre-selezione in magazzino.

L'irrorazione dei frutti sulla pianta va effettuata non oltre un paio di giorni prima della raccolta, possibilmente verso sera: le mele così trattate non debbono più subire ulteriori applicazioni anti-riscaldo con Etossichina una volta immagazzinate.

Il trattamento dopo la raccolta invece si effettua mediante l'immersione dei frutti (flottazione) in apposite vasche contenenti la sospensione del prodotto in acqua secondo le dosi prescritte sotto, oppure mediante la aspersione dei frutti mentre questi sono condotti da un nastro trasportatore sotto appositi ugelli che spruzzano una sospensione di analoga concentrazione. Il trattamento in magazzino deve essere eseguito non oltre una settimana dopo la raccolta: la durata del trattamento nel caso dell'immersione deve essere di almeno 15 e non oltre 25 secondi; nel caso dell'aspersione il trattamento dovrà durare da 15 a 20 secondi, in dipendenza della regolazione della velocità dei nastri.

Per ottenere migliori risultati la sospensione di **RISCALD CONTROL** in acqua nelle vasche per i trattamenti con immersione va cambiata ogni giorno.

Poichè durante i successivi lavaggi nel corso della giornata il volume della sospensione nelle vasche diminuirà a causa di perdite dovute a sgocciolamenti o traboccamenti, si dovrà periodicamente ripristinare il livello di liquido aggiungendo una sospensione di **RISCALD CONTROL** in acqua di concentrazione corrispondente alle dosi raccomandate.

Se la sospensione presente nelle vasche si sporcasse con terra, foglie o detriti deve essere eliminata, seguendo le precauzioni indicate nell'« Avvertenza » qui sotto, e sostituita con una sospensione di nuova preparazione.

Le mele trattate devono essere perfettamente asciutte prima di essere collocate in frigorifero: è buona norma comunque dopo il trattamento non porre vicino alle bocchette dell'aria fredda durante la refrigerazione le varietà più delicate, quali quelle appartenenti al gruppo « Golden Delicious ».

Le dosi di impiego sono le seguenti:

— trattamenti di pre-raccolta: 325 cc in 100 litri di acqua;

— trattamenti di post-raccolta: 225 cc in 100 litri d'acqua. Sulle varietà del gruppo « Golden Delicious si deve ridurre la dose a 140 cc in 100 litri d'acqua.

Avvertenza: quando si devono svuotare le vasche per rimuovere il liquido o alla fine del trattamenti, bisogna depurare opportunamente o diluire molto (come minimo 1:100) la sospensione, prima di scaricarla.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **RISCALD CONTROL** viene impiegato da solo.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Prima di immettere al consumo le mele trattate lasciar trascorrere non meno di 90 giorni dal trattamento, dei quali almeno l'ultima settimana fuori dal frigorifero a temperatura ambiente in locale arieggiato e luminoso.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 1

RISCALD CONTROL

Per prevenire il riscaldo delle mele nei magazzini e nei frigoriferi

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

Etossichina pura	g 70
Disperdenti e adesivanti	. . . q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

CAFFARO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento di:
CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) S.S. 255 Km 46

0803

Registrazione n. 3626 del Ministero della Sanità del 12-9-1980

3677

BAVIN 85

Insetticida

Tipo di formulazione: polvere bagnabile
Composizione:

Carbaryl puro	gr 85
Supporti, disperdenti q b	gr 100

II CLASSE NOCIVO

BASLINI

Industrie Chimiche
Dr. Baslini

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 77.82
20122 Milano

Stabilimento produttore:
CHIMIREN S.p.A. - Renazzo Di Cento (FE)

Registrazione N. 3677 **del** 19-6-80
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO
Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p. es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)
Sintomi d'intossicazione: nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.

Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio; lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare atropina in dosi eccessive, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CARATTERISTICHE
Il BAVIN 85 è un insetticida per contatto e per ingestione.
COMBATTE
Verme delle mele e delle pere (Carpocapsa), Tignole della vite, dell'olivo, degli agrumi; Tignola orientale del pesco; Ricamatrici delle frutta (Cacoecia, Eulie, Capua); Dorifora della patata; Cavolaia, Mamestra, Idroecia, Depressaria degli ortaggi; Campa del mandorlo; Bega del garofano. Possiede un largo spettro d'azione e poiché non contiene nè fosforo, nè cloro, si manifesta attivo anche contro molti insetti divenuti resistenti agli insetticidi clorofosforici.
È molto persistente.

EPOCA DEI TRATTAMENTI
Iniziare i trattamenti alla prima comparsa dei parassiti e ripeterli ogni 10-15 giorni o comunque ad ogni reinfestazione.
DOSI D'IMPIEGO: per 100 litri d'acqua

Carpocapsa	gr 100-150
Tignole della vite, olivo ed agrumi	gr 100-150
Ricamatrici	gr 150-200
Dorifora	gr 150-200
Cavolaia	gr 100-150
Bega del Garofano	gr 100-150

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari purché non alcalini. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le Norme Precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO A SEGUITO DEL TRATTAMENTO
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame, non impiegarlo durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

3702

Stop Scald®

Regolatore per prevenire il «riscaldo» delle mele durante la conservazione in magazzino.

COMPOSIZIONE:

— Etossichina pura . .	. . . g.	63
— Coadiuvanti e solventi, quanto basta a . .	g.	100
— Contiene Glicole etilenico		

(R) Marchio registrato MONSANTO Co. - USA.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo,3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 3702 del 30.5.1980 Ministero della Sanita'

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto impiegato poco prima della raccolta o subito dopo la raccolta elimina o comunque riduce sensibilmente i danni provocati dal 'riscaldo', fisiopatia che si manifesta sulle mele, quasi esclusivamente durante la conservazione o più spesso al termine di essa; questa alterazione provoca la comparsa di un imbrunimento del tessuto epidermico al quale può seguire il disfacimento o rammollimento dei primi strati cellulari sottoepidermici.
Il riscaldo interessa diverse varietà di mele (Granny Smith, gruppo Red Delicious e derivate, gruppo Stayman, Imperatore o Morgenduft, Rome Beauty, Winter Winesap, Golden Delicious e derivate, e inoltre Lavina, Carla, Commercio,Abbondanza).

DOSI, EPOCHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Trattamento prima della raccolta: impiegare il prodotto in ragione di 375 cc per Hl di acqua: effettuare la distribuzione della poltiglia sulle piante 2 giorni prima della raccolta curando la più completa bagnatura dei frutti.

Trattamento dopo la raccolta: impiegare il prodotto alla dose di cc 150 per 100 lt. di acqua su Golden Delicious e alla dose di cc 250 per 100 lt. di acqua su altre varietà.

Le mele trattate in pre-raccolta non devono essere trattate in post-raccolta.

La frutta deve essere trattata non oltre una settimana dopo la raccolta: immergere la frutta nella soluzione per almeno 15 secondi senza superare comunque i 25 secondi, oppure irrorare la soluzione sui frutti mentre questi passano sul nastro trasportatore, assicurandosi che il contatto fra i frutti e la soluzione irrorata sia di 15-20 secondi.
Per ottenere i migliori risultati è necessario cambiare ogni giorno la soluzione.
I parziali rinnovi della poltiglia consumata nel corso della giornata vanno effettuati aggiungendo il prodotto alla concentrazione sopra indicata, ma limitatamente alla sola quantità di acqua reimmessa.
Se la soluzione si sporca con terra, foglie, detriti, ecc. deve essere cambiata e la quantità residua eliminata come da prescrizioni sottoindicate.
Le mele debbono essere asciutte prima di essere poste in frigorifero.
Avvertenza: la soluzione eccedente ai trattamenti, prima di essere scaricata dalle vasche, dovrà essere opportunamente trattata per la depurazione o diluita (es. 1:100).

Preparazione della poltiglia: diluire la quantità di prodotto necessaria, direttamente nel totale quantitativo di acqua miscelando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari eccetto quelli a reazione alcalina come Polisolfuri e Calce.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Prima di immettere al consumo le mele trattate lasciare trascorrere non meno di 90 giorni dal trattamento di cui almeno l'ultima settimana fuori frigorifero a temperatura ambiente ed in locale arieggiato e luminoso.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Lt. 1

SIPCAM

3765

FUMISOL®

Liquido fumigante per la disinfezione del terreno.

Il prodotto è un liquido fumigante a base di Metilcarbammato di sodio, sostanza attiva che liberando nel terreno Metilisotiocianato sotto forma di gas, esplica azione fungicida contro Fusariosi, Verticillosi, Tracheomicosi, oltre che un effetto erbicida, insetticida e nematocida (solo contro le forme libere di nematodi).

COMPOSIZIONE		
— Metam sodium anidro puro .	g.	32,7
— Coloranti e solventi, quanto basta a	g.	100

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

Officina di produzione:
Industria Chimica del Ticino SpA
Marano Ticino (NO)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 3765 del 19/6/1980 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti bevande e corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Per ottenere i migliori risultati bisogna operare su terreno privo di coltura in modo che i gas, che si liberano dal prodotto, penetrino entro lo strato di terreno esplorato dalle radici della coltura (15-30 cm.).
Al momento della distribuzione del prodotto il terreno deve essere ben preparato come per una semina e finemente sminuzzato senza grosse zolle, che non vengono penetrate dai gas del prodotto, e privo di residui della coltura precedente.
Il terreno non deve essere troppo asciutto, meglio se bagnato una settimana prima del trattamento ma al tempo stesso senza ristagni di acqua e con temperatura non inferiore a 14°C e non superiore a 32°C ad una profondità di 10 cm.
Eventuali letamazioni devono essere praticate almeno un mese prima del trattamento e non dopo per non portare con il letame germi di malattia sul terreno disinfettato.
Il prodotto va impiegato alla dose di 100 g/per metro quadrato di superficie. Tale dose va aumentata a 150-200 g/m², nel caso si operi su terreni pesanti e interessati da Verticillium e Fusarium, oppure per impieghi a temperatura del terreno vicine a quelle più basse sopra consigliate (14°C).

Disinfestazione in pieno campo

Il prodotto va distribuito con una delle seguenti modalità:

a) Diluire il prodotto in un sufficiente quantitativo di acqua e distribuire questa miscela sulla superficie da fumigare, sia con l'impiego di innaffiatoi o pompe irroratrici o per irrigazione.
Subito dopo la distribuzione, ed il più rapidamente possibile, onde evitare perdite di gas per evaporazione, eseguire una lenta ed abbondante irrigazione in modo da far penetrare il prodotto sino ad una profondità di 25-30 cm.
Nei terreni sabbiosi evitare una eccessiva distribuzione di acqua dopo il trattamento.
b) Una ulteriore possibilità per l'applicazione è l'uso di apparecchi fumigatori che distribuiscono il prodotto tal quale entro solchi distanti 15 cm. fra di loro ad una profondità di 15-20 cm., in quanto i gas che si liberano dal prodotto tendono a salire verticalmente piuttosto che a diffondersi orizzontalmente.
Effettuata l'applicazione irrigare in superficie (2-3 cm.) il terreno per evitare una troppo rapida uscita dei gas che si sviluppano dal prodotto. Questo metodo di applicazione è indicato solo in terreni molto sciolti, specie ove viene effettuato anche un trattamento nematocida con fumiganti a base di DD od altri.

Precauzioni

Dopo l'applicazione del prodotto (circa 1 settimana dopo con temperatura elevata e 2 settimane dopo con temperature basse), effettuare una lavorazione superficiale del terreno per facilitare la dispersione dei gas residui dal terreno.
Dopo questa lavorazione attendere ancora 8-12 giorni a seconda della maggiore o minore temperatura, prima di procedere alla semina od al trapianto.
Impiegare il prodotto sempre almeno ad un metro da colture in atto, se si opera in pieno campo, od in serre prive di altre colture.
Con temperature del terreno vicino alla minima consigliata (14°C) si può coprire il terreno dopo l'applicazione con un foglio di plastica onde innalzare la temperatura del terreno stesso e favorire l'azione del prodotto.

Disinfezione dei terricciati per serre:

Preparare il terriccio a strati di 25-30 cm. e distribuire su 10 m² di superficie 1-2 Kg. di prodotto diluiti in 100 litri di acqua. Operare al massimo su due strati sovrapposti in modo di non superare uno spessore di 50-60 cm. Non comprimere il terriccio e ricoprirlo con un foglio di plastica dopo il trattamento.
Dopo 8-10 giorni dall'applicazione arieggiare il terricciato rivoltandolo e rimescolando in modo che circa 3 settimane dopo il trattamento, in condizioni di normale temperatura, si può utilizzare il terriccio per la semina od il trapianto.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci; è nocivo per animali domestici e bestiame.

Far trascorrere 20 - 30 giorni dopo il trattamento, prima della semina.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg. 1**

3772

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

IPRODIAL

Fungicida organico di contatto
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 50 Iprodione puro
Coformulanti q.b. a 100

* **Marchio registrato**

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
  Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'IPRODIAL è un fungicida organico ad azione di contatto, particolarmente indicato per la lotta contro le malattie crittogamiche delle colture di seguito indicate e per la concia delle sementi del frumento e dell'orzo

APPLICAZIONI E DOSI

- **VITICOLTURA:** contro la Botrite a kg. 1,5/2 per ettaro, distribuiti con 10-15 ettolitri d'acqua. Trattare alla sfioritura, prima della chiusura dei grappoli, all'inizio dell'invaiatura, e 2-3 settimane dopo l'invaiatura.

Per le varietà sensibili alla Botrite del peduncolo, effettuare un trattamento anche in pre-fioritura.

Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti, esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.

Il prodotto può essere impiegato anche per effettuare trattamenti polverulenti in miscela con zolfo ventilato, alle stesse dosi sopra indicate

FRAGOLA: contro la Botrite a kg. 1,5/2 per ettaro distribuito con 10-15 ettolitri d'acqua.

Trattare all'inizio della fioritura e ripetere ogni 8-10 giorni, secondo l'andamento stagionale

ORTICOLTURA:

a) **Lattuga:** contro la Botrite e la Sclerotinia della lattuga kg. 1,5/ha con trattamenti fogliari ripetuti.

b) **Indivia:** per combattere le Sclerotinie che possono attaccare le indivie nel terreno, usare gr. 6-8/mq.

c) . · **Peperone · Melanzana:** contro Botrite ed Alternaria gr 100/150/hl. con trattamenti fogliari ripetuti

Dato il gran numero di varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi preliminari

- **FRUTTICOLTURA:**
  - **Pomacee (pero):** contro Alternaria a gr. 150/hl. Iniziare i trattamenti alla caduta dei petali e proseguirli alla cadenza di 15 giorni fino al termine della carenza.
  - **Drupacee:** contro la Monilia del pesco, albicocco, ciliegio, mandorlo, susino a gr. 150/hl. Trattare prima, durante e dopo la fioritura.
- **FLOREALI ED ORNAMENTALI (in pieno campo o in serra):** contro Botrite a gr. 150/hl.; contro Alternaria del Garofano a gr. 200/hl.; contro Rizoctonia del Garofano a gr. 4-8/mq

  Dato il gran numero di specie e varietà e le differenti condizioni ambientali, è consigliabile effettuare saggi preliminari d'impiego.
- **AGLIO:** contro il mal dello sclerozio mediante impolverazione dei bulbilli, a gr. 300 per quintale di bulbilli
- **PATATA:** contro Rizoctonia; immergere i tuberi per 5 minuti in una soluzione di gr. 800/hl., prima della semina.
- **BARBABIETOLA:** contro Phoma, mediante impolverazione a gr. 300 per quintale di seme.
- **CONCIA DELLE SEMENTI:** contro la Carie del frumento e l'Elmintosporiosi dell'orzo: gr. 150-200 per q.le di seme.

Per la preparazione della miscela, mettere la dose in poca acqua, indi mescolare al fine di ottenere una pasta omogenea.

Versare nell'irroratrice e portare a volume agitando

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

L'**IPRODIAL** è compatibile con: Azofol L; Benlate; Cuprothex M 50; Cuprothex S Blu; Delfos M 20; Dithane M 45; Drinfos 20; Gutene; Karathane LC; Lannate 25, Lannate L; Ovotek; Redran PB 25; Sulfosol 80; Tortrin 85; Zirex 90; Zolone Liquido 25; Zolone PB 25.

Per quanto riguarda la miscibilità del prodotto con: Dimetoil E; Emmaton 50; Fitofos 20; Karathane V/D; Sumifos, si consiglia di procedere nel modo seguente:

1) stemperare in acqua l'**IPRODIAL** e versare nell'irroratrice già riempita di acqua per metà;
2) aggiungere il bagnante adesivo Etaldyn a gr. 50 per ettolitro;
3) stemperare in acqua il prodotto da aggiungere e versarlo quindi nell'irroratrice che, agitando, va portata a volume.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto sulla pera Decana del Comizio.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

21 giorni prima della raccolta, su lattuga, indivia, peperone, melanzana, pero, fragola

28 giorni prima della raccolta su vite

40 giorni prima della raccolta sulle altre colture

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

ANTIPARASSITARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.

Direzione: 00193 ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 3772 Ministero della Sanità del 16/6/1980
1/83

3801

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

DALPIR

Insetticida agricolo

Emulsionabile per trattamenti liquidi

Composizione:

Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 4 di Piretrina pura
gr. 16 di Piperonilbutossido puro
gr. 0,1 di antiossidante per piretro
Solventi e emulsionanti quanto basta a 100

Contiene Xilolo

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indument .
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ANTIPARASSITARI B. P. D

Biochimici Pesticidi Diserbanti S.p.A.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 53.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via Provaglia 3 - Tel. 53.32.88

Stabilim.: CAVIT Pagnnica (Aq)

Reg. n. 3801 Ministero della Sanità del 13-10-1980 .

E/2

CARATTERISTICHE

Il Dalpir è un insetticida a base di piretro in combinazione con stabilizzanti alla luce e alla temperatura, studiato appositamente per l'impiego contro gli insetti che danneggiano le colture di: carciofi, crisantemo, fagioli, fave, fragole, garofani, lattuga, rose, susine, asparago, cipolle, carote, cavolo, ciliegio, melo, melanzane e tabacco

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Afidi (delle piante da frutto, degli ortaggi, dei fiori) gr. 70-80 per 100 lt. d'acqua.
Psille e Tripidi gr. 70-80 per 100 lt. d'acqua.
Cavolaia gr. 80-100 per 100 lt. d'acqua.
Moscerino del pomodoro e della frutta in magazzino gr. 80 per 100 lt. d'acqua.

Sulle colture agrarie, sopracitate, effettuare i trattamenti con tempo buono e bagnando abbondantemente le piante affinché il prodotto venga a contatto con gli insetti.

Contro il moscerino della frutta e del pomodoro possono essere trattate direttamente anche le cassette e le ceste contenenti derrate destinate ai mercati tenendo presente che il trattamento dovrà essere sospeso almeno due giorni prima della immissione al consumo delle derrate stesse.

Preparazione della miscela acquosa

Diluire la dose necessaria in poca acqua, agitando con un bastone. Aggiungere quindi il rimanente quantitativo di acqua necessario per ottenere la concentrazione voluta

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

E' generalmente miscibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in confezioni chiuse e al buio.

Sulle colture agrarie è consigliabile l'aggiunta di gr. 10-20 di Bagnante Adesivo L/2 per ettolitro di miscela.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 2 giorni prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg. 0.25

3848

CAPTAN Bayer

FUNGICIDA ORGANICO
50% di Captano
per irrorazioni

CLASSE IV

COMPOSIZIONE

g 100 di Captan Bayer contengono:
g 50 di captano puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,25% contro la ticchiolatura delle pomacee (melo e pero), la perforazione delle foglie (gommosi) delle drupacee (pesco, susino ed albicocco), il marciume bruno dei frutti (Monilia fructigena), la peronospora della vite, il marciume grigio (Botrytis) dell'uva, la peronospora e l'alternariosi della patata e del pomodoro, la septoriosi e la cercospora delle carote, l'antracnosi del fagiolo ed il marciume delle fragole, la peronospora delle barbabietole, la peronospora, la ticchiolatura ed il marciume della rosa, l'alternariosi, la septoriosi e la ruggine del garofano.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Contro il marciume delle talee di azalea, garofano, crisantemo: immergere l'estremità inferiore delle talee in una soluzione allo 0,4% e quindi piantarle. Contro il marciume dei bulbi da fiore: immergere i bulbi per 1/2 ora in una soluzione all'1% e quindi piantarli dopo averli fatti asciugare.

Disinfezione del terreno: contro il marciume e l'avvizzimento delle piante in semenzaio ed il vivaio (Phytium, Phytophtora, Rizoctonia) irrorare o annaffiare il terreno con 0,5-0,75 litri per metro quadrato di una soluzione allo 0,25-0,4%. Iniziare i trattamenti quando i semi sono germinati e ripeterli settimanalmente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Captan Bayer è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordelese, polisolfuri ecc.), con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto, ma per le uve destinate alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Bayer AG-Leverkusen (Germ. Occ.)

Registrazione Ministero Sanità n. 3848 del 13-10-1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg 25

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

Divisione Agraria

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3852

DAITAL M

Anticrittogamico per viticoltura

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

Principi attivi:

MANCOZEB puro	gr. 15
RAME METALLICO (sotto forma di ossicloruro)	gr. 30

Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

Classe III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - **Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.**

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In casi di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti. Nei casi gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione.

Controindicati: alcool, oli, grassi.

MODALITA' E CAMPO D'IMPIEGO

Generalità - Il DAITAL-M è un anticrittogamico studiato per la difesa della vite dagli attacchi della Peronospora. Si presenta sotto forma di polvere bagnabile facilmente sospendibile in acqua per le irrorazioni.

DOSI

Il DAITAL-M si usa alla dose di 300 grammi per ogni 100 litri di acqua dal primo all'ultimo trattamento.

EPOCA D'IMPIEGO

I trattamenti si iniziano in primavera quando si verificano condizioni favorevoli allo sviluppo della Peronospora.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il DAITAL-M è miscibile con Kelthane® e Karathane® o con gli zolfi bagnabili che sono prodotti comunemente usati in viticoltura.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHIO DI NOCIVITA' - E' tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

® Kelthane e Karathane sono marchi registrati della Rohm and Haas di Philadelphia (U.S.A.)

PRODOTTO DA
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero della Sanità N. 3852 del 13-10-80
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG. 1

3859

DURSBAN*

Insetticida emulsionabile dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione.

Composizione (riferita a g 100):

- Chlorpyrifos puro	g 40,8
- Coformulanti	q.b. a g 100,0
Contiene xilolo	

II CLASSE

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirare i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso, e con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Modalità d'impiego:

Agrumeti: Cocciniglie, Dialeurodidi (p. es. Dialeurodes citri). Impiegare alla dose di 125 g per hl di acqua.

Formiche (Formica argentina). Impiegare alla dose di 250 g/hl irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua per ettaro.

Melo e pero: Carpocapsa, Psilla, Tortricidi. Impiegare alla dose di 100-125 g/hl di acqua.

Barbabietola e Tabacco: Altica, Nottue (p. es. Mamestra spp.). Impiegare kg. 1-1,25 di prodotto per ettaro diluiti in 600-800 litri di acqua.

Per la lotta contro le nottue il **Dursban** può essere impiegato anche come esca con crusca e melasso al 2,5% di formulato, distribuendo 50 kg/ha dell'esca preparata.

Le dosi indicate valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

« Da non applicare con mezzi aerei »

Compatibilità — Il **Dursban** è compatibile con la generalità degli antiparassitari, eccezion fatta per i polisulfuri di calcio e di bario.

« Avvertenza »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.

Rischi di nocività. Il **Dursban** è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

Intervallo di sicurezza. Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per colture di melo e pero; 60 giorni nel caso di agrumi, barbabietola e tabacco.

« Attenzione » da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

Prodotto nello Stabilimento di:
KING'S LYNN - INGHILTERRA

Stabilimento di confezionamento:
SCHERING S.p.A. di NOVA MILANESE

DA NON VENDERSI SFUSO

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano

Registrazione del Ministero della Sanità N. 3859 del 19-6-1980

Confezione da lt. 10

3860

DURSBAN* 12

Insetticida emulsionabile dotato di energica azione di contatto, per ingestione e per inalazione.

Composizione (riferita a g 100):

- Chlorpyrifos puro	g 11.75
- Coformulanti	q.b. a g 100.00
Contiene xilolo	

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Modalità d'impiego:

Agrumeti: Cocciniglie, Dialeurodidi (p. es. Dialeurodes citri). Impiegare alla dose di 500 g per hl di acqua.
Formiche (Formica argentina). Impiegare alla dose di 1000 g/hl irrorando il terreno in ragione di 10 hl di acqua per ettaro.

Melo e pero: Carpocapsa, Psilla, Tortricidi. Impiegare alla dose di 500 g/hl di acqua.

Barbabietola e Tabacco: Altica, Nottue (p. es. Mamestra spp.). Impiegare kg 4-5 di prodotto per ettaro diluiti in 600-800 litri di acqua.

Pioppo: Criptorinco: impiegare alla dose di 1000 g/hl di acqua per la lotta contro le nottue. Il **Dursban 12** può essere impiegato anche come esca con crusca e melasso al 9% di formulato, distribuendo 50 kg/ha dell'esca preparata.
Le dosi indicate valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

« Da non applicare con mezzi aerei »

Compatibilità — Il **Dursban 12** è compatibile con la generalità degli antiparassitari, eccezion fatta per i polisulfuri di calcio e di bario.

« Avvertenza »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.

Rischi di nocività. Il **Dursban 12** è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

Intervallo di sicurezza. Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto per colture di melo e pero; 60 giorni nel caso di agrumi, barbabietola e tabacco.

« Attenzione » da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

* Marchio registrato - The Dow Chemical Company

Prodotto nello Stabilimento di:
KING'S LYNN - INGHILTERRA

Stabilimento di confezionamento:
SCHERING S.p.A. di NOVA MILANESE

DA NON VENDERSI SFUSO

Dow Chemical S.p.A.
Via R. Lepetit, 8 - Milano

Registrazione del Ministero della Sanità N. 3860 del 19-6-1980

Confezione da lt. 10

3864

CLASSE II

TERIAL 40 L

Insetticida emulsionabile dotato di energica azione di contatto, di ingestione e per inalazione.

COMPOSIZIONE IN PESO

Chlorpyrifos, puro . . . g 40,8
Conformulanti q.b. a . . . g 100,0

NOTA: Contiene xilolo.
TERIAL è un marchio SHELL.
(*) Chlorpyrifos è un p.a. della The Dow Chemical Co.

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Evitare di respirarne i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni (per es. interrandole in fosse profonde più di 1 metro e cospargendo con calce viva);
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi, o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti: 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino a comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina fintanto che è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato sodico.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

Shell Agricoltura

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 3864 del 19-6-80

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Coltura	Parassiti	Dosi d'impiego	Note
Agrumeti	Cocciniglie	125 g/hl	—
	Dialeurodidi (p. es. Dialeurodes citri)	125 g/hl	—
	Formiche (Formica argentina)	250 g/hl	irrorando il terreno in ragione di 10 hl/ha
Meli Peri	Carpocapsa Psilla, tortricidi del melo, e del pero	100-125 g/hl	—
Barbabietola	Altica, Nottue (p. es. Mamestra spp)	1-1,25 kg/ha	irrorando 6-8 q di acqua
Tabacco	Nottue	1-1,25 kg/ha	
Pioppo	Criptorrinco	250 g/hl	

NOTA - Per la lotta contro le nottue il TERIAL 40 L può essere impiegato anche come esca con crusca e melasso al 2,5% di formulato, distribuendo 50 kg/ha dell'esca preparata.

Le dosi indicate valgono per trattamenti a volume normale. Nei trattamenti a volume ridotto per poter distribuire su ogni ettaro la stessa quantità di principio attivo, le dosi d'impiego del formulato devono essere proporzionalmente aumentate.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

COMPATIBILITA'

Il TERIAL 40 L è compatibile con la generalità degli antiparassitari, eccezion fatta per i polisolfuri di calcio o di bario.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il TERIAL 40 L è nocivo per gli insetti utili, il bestiame, gli animali domestici ed è altamente tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

«Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto nel caso di melo e pero, 60 giorni nel caso degli agrumi, della barbabietola e del tabacco».
Non ripetere il trattamento prima che siano trascorsi 12 mesi.

«Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

« DA NON VENDERSI SFUSO »

Contenuto:

3912

HYVAR® X-4 L

ERBICIDA

® Marchio registrato E.I. du Dont de Nemours & Co. (Inc.)

COMPOSIZIONE:

Bromacile puro g 4
Coformulanti quanto basta a g 100.

Classe III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- **Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.**
- **Mantenere la confezione ben chiusa.**
- **Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.**
- **Non contaminare gli alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Non operare contro vento.**
- **Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.**
- **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**
- **Lavare accuratamente la pompa con molti risciacqui, lavando separatamente ugelli e filtri per essere certi di avere eliminato qualsiasi traccia del prodotto.**
- **Non riusare i recipienti che contenevano il prodotto, ma distruggerli e sotterrarli quando vuotati.**
- **Non contaminare acque di uso domestico.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche
L'HYVAR X-4L, erbicida a base di Bromacile, è un liquido solubile in acqua. Esso viene usato come diserbante totale delle aree non coltivate e come erbicida selettivo negli agrumeti. L'HYVAR X-4L è un erbicida efficace per il controllo delle erbe annuali e di alcune perenni, ad eccezione del Convolvulus arvensis (Convolvolo) e con qualche azione di contenimento del Cynodon dactylon (Gramigna) e Cyperus spp.
Gli effetti sono lenti da vedersi cioè fino a quando il prodotto non raggiunge, per mezzo dell'umidità, la zona delle radici delle infestanti. Il grado di efficacia e la durata dell'effetto diserbante varia secondo la quantità di prodotto usato, tipo di terreno, piogge, irrigazioni o altre condizioni. Il prodotto va distribuito uniformemente con un quantitativo d'acqua tale da assicurare una perfetta distribuzione (da 50 a 500 l/ha, secondo il tipo di apparecchiatura usata).
Attenzione: prodotto combustibile, tenere lontano dalle sorgenti di calore. Dopo averlo disciolto in acqua il prodotto non è più volatile, non è più infiammabile e non è più corrosivo dei metalli, eccetto l'alluminio.
Diserbo selettivo di agrumeti
Si applica su Aranci, Limoni, Mandarini, di almeno 4 anni di età.
Si può effettuare il trattamento con qualsiasi tipo di pompa. Dopo che l'HYVAR X-4L è stato ben disciolto nel serbatoio della pompa non è più necessaria l'agitazione della soluzione. Prima di trattare, determinare la quantità di acqua necessaria per poter effettuare un trattamento uniforme su tutta la superficie fissata. Secondo la pompa usata sono necessari da 1 500 a 2.000 l d'acqua per ettaro.
L'HYVAR X-4L può essere usato in pre o post-emergenza delle erbe infestanti trattando tutta la superficie o solamente parte di essa, e su ogni tipo di terreno escludendo quello sabbioso. Nei terreni sabbiosi l'uso di HYVAR X-4L è limitato ai trattamenti « a macchia » per i cespi delle graminacee perenni. Non deve essere usato nei terreni ghiaiosi. L'umidità è necessaria per attivare il prodotto nel terreno. I migliori risultati si ottengono se l'umidità viene fornita da piogge o con acqua di irrigazione entro due settimane dal trattamento.
Applicare l'HYVAR X-4L prima o durante la prima fase di attiva crescita. Durante il trattamento evitare di bagnare le foglie ed i frutti degli agrumi.
Le dosi consigliate sono:
- Erbe annuali:
  usare da 40 a 57 l per ha. Si può applicare in qualsiasi epoca dell'anno, preferibilmente poco prima o subito dopo la germinazione delle erbe (dopo la preparazione del terreno per l'irrigazione), procurando di avere umidità (irrigazione o pioggia).
- Erbe perenni:
  usare da 105 a 145 l per ha trattando tutta la superficie o a « macchia ». Scegliere la dose secondo il grado di infestazione delle erbe ed usare la dose più bassa nei terreni più leggeri.
  Il trattamento può essere effettuato poco prima o poco dopo la fuoriuscita delle erbe ottenendo il migliore risultato se l'applicazione viene effettuata quando le infestanti sono alte 10-15 cm massimo e durante il periodo del maggior sviluppo vegetativo. Nelle applicazioni di post-emergenza viene raccomandato l'uso di un buon bagnante.
  Effettuare una sola applicazione per anno e non usare dosi superiori a 160 l per ha. Non trattare agrumenti con altre piante intercalate.

Diserbo totale
Per un diserbo delle superfici non coltivate come Ferrovie, Aeroporti, Banchine stradali, Aree di deposito e di fabbriche, le dosi consigliate sono:
- applicare da 65 a 165 l ha di HYVAR X-4L per controllare le erbe annuali e graminacee como Setaria glauca, Lolium multiflorum, Avena fatua, Digitaria, Bromus, Ambrosia artem., Chenopodium album, Tribulus terrester;
- applicare da 165 a 265 l ha di HYVAR X-4L per controllare le erbe perennali e graminacee come Bromus inermis, Poa spp., Agrostis alba, Agropyrum repens, Andropogon, Aster spp., Taraxacum officinale, Eupatorium, Solidago spp., Plantago spp., Daucus carota.
- applicare da 265 a 525 l ha di HYVAR X-4L per controllare il Sorghum halepense e altre erbe resistenti come Cynodon dactylon, Paspalum, Saponaria off., Pteridium aquilinum, Equisetum arvense.

Nelle zone dove le piogge sono limitate (generalmente meno di 100 mm) durante il periodo di crescita attiva, l'efficacia dell'HYVAR X-4L viene ridotta nelle erbe perennali dalle radici profonde come il Sorghum glomerata.
Usare le dosi più alte sui terreni di forte potere assorbente come sono generalmente quelli con alto contenuto in materia organica.
Nelle aree sulle quali l'HYVAR X-4L è già stato applicato in precedenza, le dosi possono essere gradualmente diminuite.
Nel diserbo delle linee ferroviarie, l'aggiunta di Clorato di Sodio all'HYVAR X-4L permette una riduzione delle dosi sopra indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'HYVAR X-4L è compatibile con molti dei comuni erbicidi. Tuttavia si suggerisce di consultare i nostri tecnici prima di eseguire eventuali miscele.
Non miscelare con fertilizzanti, insetticidi o fungicidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Si possono causare danni o provocare disseccamenti degli agrumi stessi o di altre piante utili se non verrà osservato quanto segue:
- Non applicare il liquido né scaricare o lavare gli attrezzi sopra o vicino alle piante di agrumi o utili o sulla superficie di terreno dove le loro radici possono essere estese o in luoghi dove il prodotto può essere trasportato a contatto delle loro radici.
- Non usare il prodotto su prati, sentieri, campi sportivi o simili aree.
- Evitare che spruzzi del prodotto bagnino le piante utili, **le foglie ed i** frutti degli agrumi.
- Evitare il contatto con sementi.

NOCIVITA'
E' tossico per i pesci.
Non contaminare corsi d'acqua o acque di uso domestico.
Tenere lontani, durante i trattamenti, persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.
20093 Cologno Monzese (MI) - Via A. Volta, 16 - Tel. (02) 253021

Stabilimento di produzione
E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)
Houston Plant - Texas (USA)

Registrazione n. 3912 del Ministero della Sanità del 16 ottobre 1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso kg 10

3914

ERBICIDA

® Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

COMPOSIZIONE:

Bromacile puro g 80
Coformulanti quanto basta a g 100.

Classe III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non contaminare fertilizzanti, insetticidi e fungicidi.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Lavare accuratamente la pompa con molti risciacqui, lavando separatamente ugelli e filtri per essere certi di avere eliminato qualsiasi traccia del prodotto.
— Non riusare i recipienti che contenevano il prodotto, ma distruggerli o sotterrarli quando vuotati.
— Non contaminare acque di uso domestico.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Diserbo selettivo degli agrumeti

L'HYVAR X è un erbicida selettivo che può essere applicato negli agrumeti oltre i 4 anni di età. E' efficace per il controllo delle erbe annuali e su alcune perenni, ad eccezione del Convolvulus arvensis e con qualche azione di contenimento su Cynodon Dactylon (Gramigna) e su Cyperus spp. (Cipero).
Non effettuare trattamenti nei terreni sabbiosi. Il prodotto va distribuito uniformemente con un quantitativo di acqua tale da assicurare una perfetta bagnatura (minimo l 1.000/ha).
Assicurarsi che il sistema di agitazione della miscela negli apparecchi di distribuzione sia perfettamente funzionante.
Nel caso di trattamenti primaverili, qualora al trattamento non seguano piogge, è indispensabile per la buona riuscita del trattamento, l'effettuazione di una irrigazione entro due settimane dal trattamento.
Nei trattamenti di post-emergenza delle infestanti è indispensabile, onde ottenere la migliore efficacia, l'aggiunta di un bagnante. Nei trattamenti di pre-emergenza delle infestanti assicurarsi che il terreno sia stato ben preparato e libero da zolle.
— Controllo di erbe annuali
Quando il problema dell'agrumeto è limitato al controllo delle erbe annuali, il miglior periodo di applicazione è la prima primavera (Febbraio-Aprile) subito prima o subito dopo la germinazione delle infestanti.
Applicare da 2 a 3 kg per ha di HYVAR X su tutta la superficie. Usare la dose inferiore in terreni leggeri e la dose più alta in terreni pesanti o molto ricchi di sostanza organica.
— Controllo di erbe perenni
Quando il problema principale da risolvere è l'eliminazione delle erbe perenni, è preferibile un trattamento in post-emergenza, in Aprile-Maggio oppure alla fine dell'estate (Agosto-Settembre), usando da 5 kg per ha nei terreni sciolti a 7 kg per ha in terreni pesanti, arrivando ad un massimo di 9 kg per ha in terreni molto pesanti ed in presenza di gravi infestazioni. Nel caso si abbiano delle erbe perenni ed annuali insieme, effettuare il trattamento primaverile consigliato per le annuali e, in seguito, trattare a macchia le perenni alle dosi indicate per quest'ultime.
Il Convolvolo è resistente alle dosi normali di HYVAR X che controllano le altre perenni. In caso di infestazione da Convolvolo esso può essere facilmente controllato con una applicazione autunnale di un erbicida ormonico non volatile (MCPA sale sodico, 2-4-D sali amminici, ecc.).

Diserbi totali

Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno. I risultati migliori si hanno se le applicazioni sono fatte nel periodo di attiva crescita delle erbe infestanti, quando tuttavia queste non hanno ancora raggiunto un tale stadio di sviluppo da rendere difficile la penetrazione della miscela nel terreno. Distribuire il prodotto nel modo più uniforme possibile, avendo cura di bagnare bene la vegetazione.
L'irrorazione va eseguita con le normali pompe munite di agitatore. Per le piccole superfici possono essere utilizzate anche le comuni pompe a spalla.
Dosi d'impiego:
— Aree poco infestate: applicare da 3-6 kg di HYVAR X per ha (0,3-0,6 g/mq) in 1000-1500 l di acqua (0,1-0,15 l/mq).
— Aree mediamente infestate: applicare da 7-12 kg di HYVAR X per ha (0,7-1,2 g/mq) in 1000-1500 l di acqua (0,1-0,15 l/mq).
— Aree notevolmente infestate: applicare da 15-30 kg di HYVAR X per ha (1,5-3 g/mq) in 1000-1500 l di acqua (0,1-0,15 l/mq).
Nelle aree sulle quali l'HYVAR X è già stato applicato in precedenza le dosi possono essere gradualmente diminuite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'HYVAR X è compatibile con molti dei comuni erbicidi. Tuttavia si suggerisce di consultare i nostri tecnici prima di eseguire eventuali miscele. Non miscelare con fertilizzanti, insetticidi o fungicidi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Si possono avere danni o perdita di alberi desiderati o di altre piante se non verrà osservato quanto segue:
— Non applicare, o scaricare, o lavare gli attrezzi sopra o vicino alle piante desiderate o sulla superficie dove le loro radici possono essere estese o in luoghi dove il prodotto può essere trasportato a contatto delle loro radici.
— Non usare il prodotto su prati, sentieri, campi sportivi o simili aree.
— Evitare che spruzzi della miscela bagnino le piante desiderate, le foglie ed i frutti degli agrumi.
— Evitare il contatto con le sementi.

NOCIVITA'

E' tossico per i pesci.
Non contaminare corsi d'acqua o acque di uso domestico.
Tenere lontani, durante i trattamenti, persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.

20093 Cologno Monzese (Mi) - Via A. Volta, 16 - Tel. (02) 253021

Stabilimento di produzione

Ravit S.p.A. - Stabilimento di Quassolo (To)

Registrazione n. 3914 del Ministero della Sanità del 5 Marzo 1981

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso kg 1

3937

AGER ATRA L

Erbicida selettivo per il diserbo del mais e del sorgo.

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

ATRAZINA puro	gr 44,4
Coadiuvante e solventi q.b. a	gr 100

Contiene Glicole etilenico

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni Mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità d'impiego: L'AGER ATRA L agisce per contatto ed assorbimento radicale contro le più dannose malerbe annuali quali: Giavoni, Erba Morella, Borsa Pastore, Amaranto, Poe, Farinello, Persicaria, Stellaria. Sono resistenti il Vilucchio, Gramigne, Sorgo selvatico, Digitaria, Setaria.

Dose d'impiego: 4 kg. per ettaro in 600-1000 litri di acqua. Effettuare il trattamento in pre-emergenza o subito dopo la semina. Una razionale sistemazione del terreno ed un buon tenore di umidità facilitano l'azione diserbante. Non effettuare il diserbo sui terreni torbosi o comunque ricchi di sostanze organiche.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni diserbanti ma non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri diserbanti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto è fitotossico per arboree, fruttiferi e viti e pertanto non contaminare tali colture. Le pompe e gli utensili impiegati per il diserbo non devono essere usati per altri trattamenti antiparassitari se non siano stati preventivamente lavati con acqua e soda. Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione.

Nocività: non è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame. Il prodotto è nocivo per i pesci e pertanto non impiegarlo come diserbante acquatico e non contaminare fiumi, laghi e canali.

Avvertenza: dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco etc.). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.

Sede Legale: Via Nomentana, 299 - ROMA

Officina di produzione: LABORATORI CHIMICI CIFA - CARAVAGGIO (BERGAMO)

Registrazione N. 3937 del 16-10-1980 dal Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

3972

ORTHOCIDE 50

CLASSE IV

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazioni in
FRUTTICOLTURA VITICOLTURA
ORTICOLTURA FLORICOLTURA
e per la disinfezione del terreno

COMPOSIZIONE

g 100 di Orthocide 50 contengono:
g 50 di captano puro;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Frutticoltura: Pomacee (melo e pero) contro la ticchiolatura ed il marciume bruno dei frutti (Monilia fructigena): trattamenti prima, durante e dopo la fioritura: 0,25%; trattamenti al verde: 0,25%; trattamenti pre-raccolta: 0,25%. Drupacee (pesco, susino, albicocco): contro la perforazione delle foglie (gommosi) ed il marciume bruno dei frutti: trattamenti post-fiorali: 0,25%.
Viticoltura: contro la peronospora: 0,2-0,25%; contro la muffa grigia (Botrytis): 0,25%.
Orticoltura: contro la peronospora e l'alternariosi della patata e del pomodoro, la cladosporiosi e la septoriosi del pomodoro: 0,25-0,3%; contro la septoriosi e la cercospora della carota, l'antracnosi del fagiolo ed il marciume delle fragole: 0,25-0,3%.
Floricoltura: contro la peronospora, la ticchiolatura ed il marciume della rosa, l'alternariosi, la septoriosi e la ruggine del garofano: 0,25-0,3%. Contro il marciume delle talee di azalea, garofano e crisantemo: immergere l'estremità inferiore delle talee in una soluzione allo 0,4% e quindi piantarle. Contro il marciume dei bulbi da fiore: immergere i bulbi per 1/2-1 ora in una soluzione all'1% e quindi piantarli dopo averli fatti asciugare.
Disinfezione del terreno: contro il marciume e l'avvizzimento delle piantine in semenzaio ed in vivaio (Phytium, Phytophthora e Rizoctonia) irrorare o annaffiare il terreno con 0,5-0,75 litri per metro quadrato di una soluzione allo 0,25-0,4%. Iniziare i trattamenti quando i semi sono germinati e ripeterli settimanalmente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l'Orthocide 50 è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.), con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canadà) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima del raccolto, ma per le uve destinate alla vinificazione tale arco di tempo dovrà rispettare i 40 giorni.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: CIFA - Caravaggio (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 3972 del 20.12.1980

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 100

CHEVRON CHEMICAL COMPANY S. A. FRANCAISE
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

3993

UNDENE polvere

INSETTICIDA

per trattamenti polverulenti

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Undene polvere contengono:
g 5 di propoxur puro,
eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi d'intossicazione: nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.
Consigli terapeutici: lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio - lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

CAMPO D'AZIONE

L'Undene polvere agisce contro afidi, dorifora della patata, larve defogliatrici, tignole ed eulia dell'uva.
L'Undene polvere si impiega su pomacee (melo e pero), vite, drupacee (pesco, susino, albicocco), patata, carciofo, tabacco, ortaggi (cipolla, porro, cetriolo, insalata, fagiolo, pisello, carota, cavolo, verza, pomodoro).

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 20-40 kg/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione e del tipo di polverizzatore impiegato.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l'Undene polvere è miscibile con Euparen Polvere, Ortho Phaltan Polvere, Morestan Polvere, Mesurol Polvere e Zolfo ventilato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo ad insetti utili.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: STI - Solfotecnica Italiana
Cotignola (RA) - Via S. Francesco

Registrazione Ministero Sanità n. 3993 dell'1-12-1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

4004

BAPAR20

Insetticida polivalente liquido

Composizione:

METILPARATHION PURO gr 16

Solventi emulsionanti q.b. a gr 100

(Contiene XILOLO)

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, N. 1255.

CLASSE I

VELENO

BASLINI

Industrie Chimiche Dr. Baslini S.p.A

Via G. Serbelloni, 12 - Tel. (02) 77.82

20122 MILANO

Stabilimento produttore:

DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione N. 4004 **del** 16/10/80 **del Ministero della Sanità**

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Evitare di respirarne i vapori.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso.

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia.

Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE

Il BAPAR 20 agisce per contatto, ingestione e asfissia. Ha un campo di azione analogo a quello degli insetticidi a base di Parathion

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

per 100 lt d'acqua

Melo e pero: gr 350-400 psilla del pero - gr 150-250 carpocapsa, afidi, tentredini, larve defogliatrici, antonomo, tingidi, tignole, cocciniglie negli stati giovanili

Vite: gr 150-250 tignole, sigaraio, tortrici, cocciniglia cotonosa.

Olivo: gr 200-300 fleotribo, tignola, cotonella, mosca

Pioppo: gr 300-400 crisomela, cimicetta, punteruolo, larve minatrici

Tabacco: gr 150-200 tripidi, afidi

Garofano (impiego solo in campo) gr 150-250 bega del garofano.

EPOCA DI APPLICAZIONE

Intervenire solo alla prima comparsa dei parassiti ripetendo il trattamento in relazione ad eventuali reinfestazioni.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

BAPAR 20 è miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

A seguito dei trattamenti il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

Attenzione: da usare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è direttamente responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

4006

BAFOS

Polvere bagnabile
insetticida polivalente

Composizione:
AZINPHOS-METIL PURO gr 25
Disperdenti, supporti e coadiuvanti q.b. a gr 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, N. 1255

CLASSE I°

VELENO

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso. In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, curamina, latte, olio e grassi.

BASLINI

Industrie Chimiche Dr. Baslini S.p.A
Via G. Serbelloni, 12 - Tel. (02) 77.82
20122 MILANO

Registrazione N. 4006 del 12-11-80 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

Stabilimento produttore:
VISPLANT - CHIMIREN S.p.A. - Renazzo di Cento (FE)

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI
BAFOS è un insetticida caratterizzato da ampio spettro d'azione contro la psilla del pero; afidi, cimici, cicaline, fillominator, verme delle mele e delle pere; antonomo del melo, fillobio del pero, cidia del pesco; tortrici e tignole della vite; bega del garofano (impiego solo in pieno campo); altica, cleono, punteruolo della bietola.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
g 100-200 per 100 lt. d'acqua (0,1-0,2%) alla prima comparsa dei parassiti, ripetendo i trattamenti in relazione ai nuovi attacchi.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA':
BAFOS è miscibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

4007

BARIN

Polvere bagnabile
diserbante selettivo del mais

Composizione:
100 gr di prodotto contengono:
ATRAZINA PURA . . . . gr 50
Disperdenti, supporti e coadiuvanti . . . q.b. a gr 100

III CLASSE
ATTENZIONE
manipolare
con prudenza

A BASLINI
Industrie Chimiche
Dr. Baslini S.p.A.
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 77.82
20122 Milano

Stabilimento produttore:
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione N. 4007 **del** 12.11.82
del Ministero della Sanità
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E INDICAZIONI
BARIN è un erbicida selettivo per la coltura di mais che distrugge le infestanti annuali mono e dicotiledoni più comuni quali il Giavone, il Farinaccio, l'Amaranto, l'Erba porcellana, il Centocchio, la Persicaria, la Borsa del Pastore, le Piantaggini.
L'azione di BARIN dura parecchi mesi, per cui un solo trattamento consente di avere effetto per tutto il ciclo vegetativo.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Kg. 3-4 per ettaro di superficie, in sufficiente quantità di acqua. Eseguire il trattamento in pre-semina o subito dopo la semina e sino alla nascita delle piantine di mais.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'
BARIN è compatibile con gli erbicidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: si consigliano prove particolari per le varietà poco note o di recente acclimatazione. Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es. bietole e tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare efficacia al trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Kg. 1

DA NON VENDERSI SFUSO

4008

BAPAR 10 G

Insetticida granulare

Composizione:

100 gr di prodotto contengono:

PARATHION PURO	gr 9,8
Coadiuvanti eccipienti	q.b. a gr 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I^a

VELENO

BASLINI

Industrie Chimiche Dr. Baslini S.p.A
Via G. Serbelloni, 12 - Tel. (02) 77.82
20122 MILANO

Stabilimento produttore:

VISPLANT - CHIMIREN S.p.A. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 4008 del 12-11-80 del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

DOSI D'IMPIEGO
Kg. 15-20 per ettaro di superficie

EPOCA DI APPLICAZIONE
Prima della semina per ottenere la disinfestazione del terreno. Alla comparsa dei parassiti con colture in atto quali frumento, orzo, avena, segala, riso, mais, sorgo, barbabietole, erba medica, trifoglio, ladino e, se coltivati a pieno campo, pomodori, patate, cipolle, agli, cavoli.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame e i pesci.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

Attenzione: da usare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è direttamente responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 5

4047

BAYLETON

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro l'oidio (mal bianco) del melo e della vite, e contro l'oidio e la ruggine dei cereali, ortaggi, piante ornamentali e da fiore

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayleton contengono:
g 10,3 di triadimefon puro;
coadiuvanti e solventi quanto basta a 100;
contiene xilolo.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non caratteristici; vomito, difficoltà di respirazione, effetto eccitante oppure sedativo.

Terapia sintomatica: lavanda gastrica.

Alcune controindicazioni: bevande alcoliche, grassi, olii e latte.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Melo: contro l'oidio: 0,025-0,03% (25-30 g in 100 lt d'acqua).

Vite: contro l'oidio: 0,025-0,03% (25-30 g in 100 lt d'acqua). In caso di impiego su varietà di uve da tavola particolarmente sensibili all'oidio elevare la dose allo 0,04% (40 g in 100 lt d'acqua).

N.B. Per melo e vite le dosi si riferiscono all'impiego di 10 hl di sospensione per ettaro.

Cereali (grano-orzo): contro mal bianco e ruggine: 1,25 kg/ha diluiti in 600-800 lt d'acqua intervenendo preventivamente alla fase di spigatura, oppure alla comparsa dei primi sintomi.

Ortaggi: contro mal bianco del melone, cetriolo, peperone e pomodoro: 0,025-0,05% (25-50 g in 100 lt d'acqua).

Piante ornamentali e da fiore: contro ruggine e mal bianco della rosa: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua); contro ruggine dei gerani, mal bianco e ruggine del crisantemo: 0,1-0,15% (100-150 g in 100 lt d'acqua).

N.B. Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio, e nei casi in cui gli intervalli tra i trattamenti siano superiori agli 8-10 giorni.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Bayleton può essere miscelato con fungicidi e insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per ortaggi, 10 giorni prima del raccolto per melo, 15 giorni prima del raccolto per vite, 30 giorni prima del raccolto per i cereali.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Visplant-Chimiren - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione Ministero Sanità n. 4047 dell'11-11-1980

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare al riparo dal gelo

g 50

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

4197

PROLIN

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO

III CLASSE

ATTENZIONE:
manipolare
con prudenza

Composizione:

Ziram puro	g 76
Bagnanti, disperdenti	q.b. a g 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Il PROLIN è un anticrittogamico acuprico per la lotta contro le malattie: la Bolla ed il Coryneum nei Peschi applicato in autunno ed a fine inverno usato alla dose di g 600-800 per 100 litri di acqua.
Previene e combatte la Ticchiolatura nei Peri e nei Meli applicato durante la vegetazione ed usato alla dose di g 200-300 per 100 litri di acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA - La poltiglia si prepara stemperando il prodotto in poca acqua indi versando lentamente nel totale quantitativo il liquido agitando per alcuni istanti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

MISCIBILITA' - il PROLIN è compatibile con i comuni prodotti insetticidi ed anticrittogamici a base di Parathion, Zolfi. Non è compatibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese e polisolfuri) ed olii minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': varietà di peri sensibili al Prolin: Cannellina, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona d'estate. Può causare fitotossicità nei giovani rametti di pesco Red-Hayen e Cardi.

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

INDUSTRIE CHIMICHE Dr. BASLINI S.p.A
20122 MILANO Via G. Serbelloni, 12 - Tel. (02) 77.82
Stabilimento produttore: DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione N. 4197 del 5.3.81 del Ministero della Sanità

4214

AVIOCAFFARO

Anticrittogamico a base di rame per impieghi aerei

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallo . . . . . . (sotto forma di ossicloruro)	g 17
Olio minerale attivato (95% UR)	g 60
Disperdenti e additivanti	c. b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto chiuso a chiave in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CAFFARO S.p.A. - MILANO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento di SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 4214 del Ministero della Sanità del 12-3-81

CARATTERISTICHE

Anticrittogamico in sospensione oleosa, specifico per trattamenti con mezzi a basso volume, particolarmente adatto per impieghi aerei.
Grazie alla sua formulazione, l'**AVIOCAFFARO** risulta efficace nella lotta contro la Peronospora della vite e l'Occhio di pavone dell'olivo.
L'**AVIOCAFFARO**, data la presenza del veicolo oleoso, è pronto per l'uso, non sedimenta, non ottura gli ugelli ed è adesivo.

DOSI E MODI DI IMPIEGO

L'**AVIOCAFFARO** si impiega senza l'aggiunta di nessun liquido disperdente, alle dosi seguenti:
- contro la Peronospora della vite kg 12-15 per ettaro;
- contro l'Occhio di pavone dell'olivo kg 12-15 per ettaro.

Le gocce del prodotto irrorato non devono essere inferiori a 100 micron. Vietato U.L.V.

COMPATIBILITA'

L'**AVIOCAFFARO** si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ

L'**AVIOCAFFARO** è fitotossico per la varietà Sangiovese

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: è vietato l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non addette ai lavori ed agli operatori non adeguatamente equipaggiati e protetti durante l'intervallo di agibilità.

Intervallo di agibilità: 48 ore.

Avvertenza: il prodotto è utilizzabile con mezzi aerei, previo consenso delle autorità locali agricole e sanitarie nel quadro delle istruzioni impartite al riguardo e solo per trattamenti aerei in vigneti e oliveti.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO Kg 25

4243

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

VIRICUIVRE MICRONISE

Fungicida a base di ossicloruro di rame. Si utilizza per i trattamenti degli alberi fruttiferi, delle patate, delle colture industriali, orticole e ornamentali

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono.
gr. 50 di rame metallico (sottoforma di ossicloruro tetraramico)
Sostanze coadiuvanti, adesivanti e disperdendenti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

COLTURE ORTICOLE: carciofo, cipolle, aglio, porro, asparago, cavolo, cavolfiore, cetriolo, cocomero, melone, zucchino, fragola, insalata, pisello, fagiolo, fagiolino, pomodoro, peperone, melanzana, sedano, carota, finocchio.

COLTURE INDUSTRIALI: patata, barbabietola da zucchero.

COLTURE ORNAMENTALI: rosa.

Contro Peronospora, Cercospora, Alternariosi: gr. 500 per hl di acqua.

FRUTTICOLTURA:

Su pero e melo dalla caduta delle foglie alla ripresa vegetativa, contro Ticchiolatura, Nectria, Moniliosi, Batteriosi, 2 o più trattamenti alla dose di kg. 1-1,5 per 100 litri di acqua.

Nel corso della vegetazione 500 gr per hl in trattamenti pre fiorali, 400 gr. per ettolitro in trattamenti post-fiorali.

Su pesco e mandorlo alla caduta delle foglie e a fine inverno contro Bolla e Gommosi kg. 1 per hl. d'acqua.

Su albicocco, ciliegio, susino alla caduta delle foglie e a fine inverno, 1 kg per hl d'acqua

IN OLIVICOLTURA:

Contro Occhio di Pavone e Lebbra dell'olivo, alla dose di gr 500 per ettolitro d'acqua.

Versare il **VIRICUIVRE MICRONISE** in una piccola quantità di acqua, mescolare accuratamente quindi aggiungere altra acqua sino ad ottenere la concentrazione voluta. Dovendo eseguire trattamenti su piante difficilmente bagnabili (olivi) aggiungere alla miscela di **VIRICUIVRE MICRONISE**, pronta per l'uso, Bagnante Adesivo Liquido 2 alla dose di gr 20/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **VIRICUIVRE MICRONISE** è miscibile con quasi tutti i prodotti della nostra gamma

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura

Su pesco, susino e varietà di melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard; cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego, dopo la piena ripresa vegetativa

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti, tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

« Chi impiega il prodotto è responsabile, degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

ANTIPARASSITARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5

Stabilimento: Ravit Paganica (AQ)

bpd

Reg. n. 4243 Ministero della Sanità del 27-3-1981
E/2

Contenuto netto Kg.

4281

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

LORZENE FLOW

Acaricida in Pasta Fluida
Per la lotta contro le forme mobili degli acari, compresi quelli resistenti ai fosforganici ed ai comuni acaricidi

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 51,8 Ciexatin puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Evitare di respirarne i vapori.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
— Dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. es.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Cefalea occipitale continua o parossistica, ronzi auricolari, iperacusia, vertigini, ranchialgia, dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra, ritenzione urinaria, insufficienza respiratoria e di circolo, interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi), dermatosi.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando, in relazione alla via di contaminazione, abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventuale somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

NORME AGRARIE - CARATTERISTICHE - DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **LORZENE FLOW** è un acaricida, efficace per il controllo delle forme mobili del ragno rosso che infestano le piante da frutto (melo, pero) e piante ornamentali.

Il **LORZENE FLOW** agisce per contatto sia contro gli acari sensibili sia contro quelli che si dimostrano resistenti ai prodotti fosforganici ed ai cloroderivati comunemente impiegati o come acaricidi specifici o come prodotti ad azione generica per la lotta contro i fitofagi.

Il **LORZENE FLOW** si impiega alle dosi di 50-70 gr. per hl. d'acqua per trattamenti a volume normale, usando la dose minore nel caso di lievi infestazioni e la dose massima quando la popolazione degli acari da combattere è molto numerosa.

In ogni caso si dovrà aver cura di bagnare completamente le piante. I trattamenti da effettuare sono normalmente due per stagione (sulle piante di melo e pero). Il primo trattamento va eseguito alla prima comparsa degli acari sulle foglie (1-2 acari per foglia); il secondo trattamento va effettuato alla distanza di 2-4 settimane dal primo a seconda della intensità dell'attacco. Solo in caso di precoce comparsa delle forme mobili o di forti infestazioni può rendersi necessario un terzo trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il **LORZENE FLOW** è compatibile con: Dithane M 45, Karathane LC, Karathane P.B., Rovral, Sofril 80, Kilval, Lannate 25, Lannate L, Metilon 20, Naftil Micronizzato, Parafene Rosso, Spintox, Zolone PB 25, Zolone Liquido 25.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto sulle rose in serra.

NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per il bestiame, i pesci e gli animali domestici. Non fare pascolare nelle zone trattate e non alimentare il bestiame ed animali domestici con prodotti trattati direttamente od accidentalmente almeno fino a 30 giorni dopo il trattamento.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 0.5

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.69
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 4281 Ministero della Sanità del 12-3-1981
12 / 1982

4347

PRESAN®

Acuprico attivato con
sali di rame

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione:

Zineb puro		g 24.0
RAME METALLO puro (sotto forma di Ossicloruro)		g 17.5
Coformulanti	q.b.	g 100.0

III CLASSE
ATTENZIONE:
manipolare
con prudenza

BASLINI
Industrie Chimiche
Dr. Baslini S.p.A.

Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione N. 4347 **del** 25.5.81
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.
In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in Centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

Il PRESAN è un anticrittogamico misto, dotato di persistenza e di potere coprente.
Il PRESAN è indicato su:

Vite: peronospora antracnosi - alla dose di gr 300-450 per 100 lt di acqua.

Pomacee: ticchiolatura septoria, ruggine, alternaria alla dose di gr 300-450 per 100 lt di acqua.

Pomodoro solo fino alla prima fioritura peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi, antracnosi alla dose di gr 350-450 per 100 lt di acqua.

Garofano: ruggine - alla dose di gr 300-450 per 100 lt di acqua.

EPOCHE D'IMPIEGO

Usare il prodotto a scopo preventivo a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Si versa il PRESAN in poca acqua e dopo aver agitato per scioglierlo perfettamente si versa la poltiglia ottenuta nella rimanente quantità di acqua, tale da raggiungere la concentrazione voluta. Si consiglia sempre di aggiungere PRUNIG alla dose di 30-40 gr per 100 lt. di poltiglia ottenuta, allo scopo di aumentare l'attività bagnante ed adesiva della miscela da irrorare.

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA E SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con Dicloran.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su alcune varietà di melo e pero cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia pertanto l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Cultivars di melo sensibili al rame: Abbondanza Belfort, Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Gravestein, Jonathan, Renetta del Canada, Rome Beauty (Morgenduft), Stayman Red, Stayman Winesap.

Cultivars di pero sensibili al rame ed allo Zineb: Abate Fétel, Buona Luigia d'Aveanches, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Passacrassana, Trionfo di Vienna, Butirra Estiva, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Giardina, Kaiser, Mora, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, William, William precoce.
Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di melo e di pero, prima dell'applicazione a pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

4398

BROMET

— FUMIGANTE IMPIEGATO COME INSETTICIDA SULLE SEGUENTI DERRATE IMMAGAZZINATE: CEREALI GREZZI, LEGUMINOSE IN GRANELLA, FRUTTA SECCA E TABACCO ESSICCATO.

— STERILIZZANTE DEL TERRENO PER IL CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI, FUNGHI, OROBANCHE, NEMATODI E INSETTI DEL TERRENO.

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE (in peso su 100 gr.):

— gr. 99,5 di bromuro di metile puro;

— q.b. a 100 gr. di impurezze ed inerti.

L'utilizzo del prodotto è riservato solo agli operatori autorizzati a norma del RD 9-1-1927 n. 147 (e successive modifiche) sull'impiego dei gas tossici.

NATURA DEL RISCHIO

— Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua;
— Evitare di respirare i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua;
— Dopo aver utilizzato il prodotto rendere innocue le confezioni provvedendo ad interrarle dopo averle schiacciate con un martello.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

— **Sintomi di intossicazione:** veleno neurotropo - provoca lesioni encefalitiche di tipo paralitico - tempo di latenza anche parecchie ore - cefalea - vertigini - sonnolenza - stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione - lesioni cutanee da contatto - disturbi della parola - iperacusia dolorosa - ambliopia - i disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.
— **Consigli terapeutici:** terapia sintomatica - analettici - antibiotici a scopo profilattico - epatoprotettori - combattere l'acidosi con fleboclisi saline - impiego di vasocostrittori.
— **Controindicazioni:** evitare sedativi a base di bromo.

MODALITA' DI IMPIEGO

— **Impiego su derrate immagazzinate:** massima dose gr. 30 per metro cubo, ambiente alla pressione atmosferica, durata da 16 a 72 ore - durata da 1 a 3 ore se in autoclave sotto vuoto. Il trattamento delle sementi non è raccomandabile se la temperatura ambiente supera i 25° C e se le sementi non sono ben secche. Areare e ventilare a fondo l'ambiente e la massa delle derrate trattate dopo la riapertura del locale di deposito, e per almeno 24 ore.

AVVERTENZA — All'esterno dei depositi contenenti derrate trattate con il BROMET debbono essere posti dei cartelli con la dicitura: « VIETATO L'INGRESSO ALLE PERSONE ESTRANEE - PERICOLO DI MORTE ».

b) **Impiego nel terreno:** per la fumigazione del terreno le dosi variano da 40 a 100 gr. per metro quadrato - tempo di attesa prima della scopertura del terreno: da un minimo di 2 ad un massimo di 4 giorni - il prodotto può essere impiegato per fumigare terreni destinati a qualsiasi coltura.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' — Il prodotto non è compatibile con altri principi attivi.

FITOTOSSICITA' — Soltanto in caso di fumigazione su terreni pesanti esiste la possibilità di fitotossicità relativamente a colture di garofani, bulbi di gladioli e vivai di agrumi.

RISCHI DI NOCIVITA' — Il prodotto è tossico per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. E' tossico anche per gli insetti utili quando questi restano imprigionati nell'ambiente trattato.

INTERVALLO RICHIESTO

a) **IMPIEGO SU DERRATE IMMAGAZZINATE — Le derrate trattate, dopo 24 ore di areazione e ventilazione, possono essere immesse al consumo.**
b) **IMPIEGO NEL TERRENO — L'intervallo da rispettare prima della messa a coltura (semina o trapianto) va fissato in relazione alla natura del terreno e delle condizioni climatiche. Comunque non deve essere inferiore a 10 giorni e dopo conveniente arieggiamento del terreno trattato.**

ATTENZIONE — Impiegare soltanto in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: S.r.l. BROMET - Via Monti d'Oro, 14 — POMEZIA (Roma).

OFFICINA DI PRODUZIONE: Via Monti d'ORO, 14 — POMEZIA (Roma).

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SANITA' N. 4398 DEL 25 MAGGIO 1981

DA NON VENDERSI SFUSO

Bombolette di acciaio contenenti Kg. 0,680 circa di prodotto (libbre 1,5).

4338

SEZIN R BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE : 100 grammi di prodotto contengono
ZINEB puro gr 13
Rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico gr 30
Disperdenti, bagnanti, coloranti, inerti q.b. a gr 100

CLASSE III
ATTENZIONE : MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto conla pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione. In caso di ingestione di Zineb può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.
Controindicati: *alcool, olii e grassi.*
CAATTERISTICHE: Il **SEZIN R. BLU** è una formulazione cupro-organica.
Il **SEZIN R. BLU** risulta idoneo per la difesa della vite, delle pomacee e dei garofani in pieno campo. dalle infezioni diperonospora, ticchiolatura, alternaria, antracnosi, septoria, ruggine.
DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO: Il **SEZIN R. BLU** si impiega alla dose di 400-500 g/hl di acqua, intervenendo ogni volta che si manifesta il pericolo di infeioni fungine. Tali dosi si intendono per i trattamenti ad alto volume.Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per
unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Nella difesa della vite i trattamenti di « chiusura » vengono raccomandati alla dose massima.
Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo-bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua e agitare fino ad ottenere una pasta cremosa, aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA - NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': Il SEZIN R Blu è miscibile con i più comuni fitofarmaci, eccetto quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese) e gli olii bianchi.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': varietà di pere sensibili allo Zineb : Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.
Intervallo che deve essere rispettato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 28 giorni.
« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. »
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

SEPRAN s.r.l.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Registrazione n. 4338 del 25-5-1981 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO Peso g 100

4422

Antracol Ramato Micro blu

FUNGICIDA CUPRO-ORGANICO

per trattamenti liquidi su vite, pomodoro solo fino alla prima fioritura, garofano in pieno campo

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Antracol Ramato Micro blu contengono:
g 10 di propineb puro;
g 20 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro);
sospensivanti, coloranti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,3-0,4% (300-400 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano, in pieno campo.
N.B. a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.

Divieti d'impiego
— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

E' vietato l'impiego con mezzi aerei.

Compatibilità: l'Antracol Ramato Micro blu è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: in caso di andamento climatico freddo e piovoso è sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.
Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Visplant-Chimiren - Renazzo di Cento (FE)
Registrazione Ministero Sanità n. 4422 del 3-8-1981

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg **2** 5

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

4428

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CEREALENE N

Erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero

Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25 Isoproturon puro
gr. 25 Neburon puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo di pre-emergenza, per il diserbo del frumento tenero.

L'associazione dei due principi attivi (Isoproturon + Neburon) fornisce il controllo delle principali infestanti dicotiledoni e monocotiledoni annuali.
Infestanti sensibili

a) **Graminacee:** Agrostis, Alopecurus, Avena ludoviciana, Avena fatua (nascite autunnali). Lolium (nascite autunnali), Poa annua e Poa trivialis.
b) **Dicotiledoni:** Adonis, Chenopodium, Matricaria, Papaver, Polygonum (nascite precoci), Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato subito dopo la semina del frumento tenero, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.

Dosi:

— contro Dicotiledoni e Graminacee annuali, compresa l'Avena (a nascita autunnale): Kg. 7,5/ha;
— contro Dicotiledoni e Graminacee annuali, esclusa l'Avena: Kg. 6/ha.

Distribuire il prodotto con almeno 500 litri di acqua per ettaro. Versare la dose di prodotto direttamente nell'irroratrice già riempita a metà: attendere qualche minuto in modo che il prodotto si bagni; mettere in azione l'agitatore che deve funzionare durante il trattamento, portare a volume.

Il terreno, al momento del trattamento, deve essere ben sistemato, livellato, privo di zolle, di infestanti e di avvallamenti.

Non usare nei terreni sabbiosi, sciolti e filtranti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non ripetere il trattamento sulle colture prima di 6 mesi.

ANTIPARASSIDARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. 4428 Ministero Sanità del 3-8-1981.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

4429

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

PRODIX

Erbicida selettivo di pre-emergenza del frumento tenero

Polvere bagnabile

COMPOSIZIONE
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 25 Isoproturon puro
gr. 25 Neburon puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini od agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 4429 Ministero Sanità del 3-8-1981.

3 / 83

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida selettivo di pre-emergenza, per il diserbo del frumento tenero.

L'associazione dei due principi attivi (Isoproturon + Neburon) fornisce il controllo delle principali infestanti dicotiledoni e monocotiledoni annuali.
Infestanti sensibili
a) **Graminacee:** Agrostis, Alopecurus, Avena ludoviciana, Avena fatua (nascite autunnali), Lolium (nascite autunnali), Poa annua e Poa trivialis.
b) **Dicotiledoni:** Adonis, Chenopodium, Matricaria, Papaver, Polygonum (nascite precoci), Ranunculus, Raphanus, Sinapis, Stellaria.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento va effettuato subito dopo la semina del frumento tenero, prima dell'emergenza della coltura e delle infestanti.

Dosi:
— contro Dicotiledoni e Graminacee annuali, compresa l'Avena (a nascita autunnale): Kg. 7,5/ha;
— contro Dicotiledoni e Graminacee annuali, esclusa l'Avena: Kg. 6/ha.

Distribuire il prodotto con almeno 500 litri di acqua per ettaro. Versare la dose di prodotto direttamente nell'irroratrice già riempita a metà; attendere qualche minuto in modo che il prodotto si bagni; mettere in azione l'agitatore che deve funzionare durante il trattamento; portare a volume.

Il terreno, al momento del trattamento, deve essere ben sistemato, livellato, privo di zolle, di infestanti e di avvallamenti.

Non usare nei terreni sabbiosi, sciolti e filtranti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non ripetere il trattamento sulle colture prima di 6 mesi.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

4450

CLASSE II

POLIBARIO-STI 42

NOCIVO

INSETTICIDA - ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE SOLUBILE

COMPOSIZIONE: (100 g. di prodotto contengono)

Polisolfuro di bario tecnico all'80%	99 gr.
(corrispondente a gr. 42 di zolfo attivo)	
Coformulanti	q.b. a 100 gr.

CARATTERISTICHE:

Insetticida, ad azione pronta e prolungata, con proprietà anticoccidica, antifissativa e sterilizzante.

Anticrittogamico contro il corineo e la bolla delle drupacee e contro la forma stromatica ibernante della ticchiolatura delle pomacee.

NATURA DEL RISCHIO:

INTOSSICAZIONE GRAVE PER INGESTIONE, PER INALAZIONE E PER CONTATTO CON LA PELLE.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;

Conservare la confezione ben chiusa;

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;

Evitare di respirarne i vapori;

Non operare contro vento;

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;

Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di 1 metro e cospargendo di calce viva);

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto orale: Nausea, vomito, coliche addominali, diarrea profusa, crampi muscolari, convulsioni, bradicardia, dispnea (la morte avviene in piena coscienza per paralisi respiratoria).

Consigli terapeutici: Lavanda gastrica con solfato di sodio o magnesio, analettici cardio-respiratori, spasmolitici, fleboclisi con aspartato di potassio (1-3 mEq: Kflebo).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

POMACEE: trattamenti invernali a gemme chiuse od appena ingrossate 7-8 Kg/hl.

DRUPACEE: trattamenti invernali a gemme chiuse od appena ingrossate 5-6 Kg/hl.

AGRUMI: trattamenti lontani dalla maturazione 2 Kg/hl.

OLIVO: trattamenti prima della fioritura 3-4 Kg/hl.

Sciogliere la giusta dose in poca acqua, agitando opportunamente fino a completa diluizione. Irrorare con normali pompe, cercando di investire uniformemente ed in maniera sufficiente tutte le parti della pianta.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto non è miscibile con oli; qualora fossero stati eseguiti trattamenti con oli l'applicazione del polisolfuro deve essere distanziata di almeno quindici giorni.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Evitare irrorazioni nei frutteti dove siano coltivati ortaggi e specialmente insalata, finocchi, spinaci che verrebbero danneggiati.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Per eliminare possibili rischi di nocività far trascorrere trenta giorni prima di far pascolare il bestiame in zone trattate od alimentarlo con prodotti che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il formulato.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI
30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.

Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 4450 del 6-10-81

Peso netto: Kg. 25

4651

SUMISCLEX®

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

Fungicida in polvere bagnabile ad azione preventiva e curativa contro la Muffa grigia della vite, della fragola, del pomodoro, della rosa, la maculatura bruna del pero, il Marciume bruno del pesco, nonchè la Sclerotinia e la Rizoctonia delle piante orticole e floreali in pieno campo.

COMPOSIZIONE

procymidone p.a. puro	g 50,0
coadiuvanti ed inerti	q.b. a g 100,0

® marchio registrato della Sumitomo Chemical Co. Ltd., Osaka, Giappone.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- Non operare contro vento;
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Shell Agricoltura

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 4651 del 5/2/1982

MODALITA' DI IMPIEGO

Muffa grigia della vite - trattamenti liquidi:
g 100-150 di SUMISCLEX ogni 100 litri di acqua.

In considerazione delle condizioni climatiche locali e delle caratteristiche varietali effettuare 3-4 trattamenti nei seguenti periodi: 1) a fine fioritura; 2) quando gli acini presentano il diametro di 3 mm (alla chiusura del grappolo); 3) 7-8 settimane prima della raccolta (invaiatura); 4) 4-3 settimane prima della raccolta. Aver cura di distribuire un'adeguata quantità di poltiglia, in modo da consentire l'uniforme distribuzione del fungicida, ed adattare la dose più elevata sulle varietà più sensibili specie quando la stagione decorre particolarmente piovosa.

Trattamento a secco: impiegare SUMISCLEX in miscela estemporanea con zolfo polverulento alle epoche indicate per i trattamenti liquidi, come segue:

a) per trattamenti generalizzati su tutta la vegetazione miscelare 0,5 kg di SUMISCLEX ogni 10 kg di zolfo;
b) per trattamenti localizzati nella zona dei grappoli miscelare 1 kg di SUMISCLEX ogni 10 kg di zolfo.

In ambedue i casi applicare le polveri quanto basta per ottenere una buona copertura.

Muffa grigia della fragola: g 80-100 di SUMISCLEX ogni 100 litri di acqua. Effettuare 3 trattamenti rispettivamente: il 1° alla apertura dei petali; il 2° quando il 10-20% dei fiori sono schiusi ed il 3° alla sfioritura. Aver cura di bagnare abbondantemente la pianta ed il terreno circostante.

Muffa grigia del pomodoro: g 80-100 di SUMISCLEX ogni 100 litri di acqua. Iniziare i trattamenti dalla fine della fioritura del primo palco florale e ripeterli ogni 15 giorni circa sino a 14 giorni prima della raccolta.

Muffa grigia della rosa in pieno campo: sulle varietà suscettibili ed in condizioni ambientali favorevoli: g 40-80 di SUMISCLEX ogni 100 litri di acqua.
Effettuare almeno tre trattamenti ad iniziare dal germogliamento avanzato sino all'inizio della fioritura cercando di bagnare bene tutta la vegetazione.

Muffa grigia della gerbera, ciclamino, geranio, crisantemo e garofano in pieno campo: g 40-80 di SUMISCLEX ogni 100 litri di acqua. Con trattamenti ripetuti durante il periodo di attacco della patia.

Marciume bruno del pesco (Monilia):

a) Monilia dei fiori e dei rami: g 150-200 di SUMISCLEX ogni 100 litri di acqua. Effettuare un primo trattamento alla comparsa dei bottoni fiorali, un secondo quando il 25% circa dei fiori sono schiusi ed un terzo in piena fioritura.
b) Monilia dei frutti: g 100-150 di SUMISCLEX ogni 100 litri di acqua. Trattamento: 4-5 e 2-3 settimane prima della raccolta.

Alternaria o maculatura bruna del pero: g 100-150 di SUMISCLEX ogni 100 litri di acqua, in trattamenti ripetuti a partire dalla fioritura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi, si consiglia comunque di fare la miscelazione poco prima dell'impiego, diluendo in poca acqua e aggiungendo poi la restante a volume voluto.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiute.

FITOTOSSICITA'

Nei trattamenti alle colture floricole e orticole specie per quelle in serra eseguire saggi preliminari perchè alcune varietà potrebbero risultare sensibili.

INTERVALLO DI CARENZA

- sulla vite: 21 giorni
- sulle colture orticole e fruttifere: 14 giorni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto:

4680

CLASSE Iᴬ

VELENO

PHORATE AMONN

Darlem® G

INSETTICIDA GRANULARE PROTETTO - Geodisinfestante sistemico per la disinfestazione del terreno da elateridi, melolontidi, scarabei, tipulidi, bibionidi, tripidi, afidi, altiche e nematodi.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
4,5 g Phorate puro
Supporto inerte quanto basta a 100 grammi

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, nr. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici — Conservare la confezione ben chiusa — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua — Evitare di respirare i vapori — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva) — In caso di malessere ricorrere al medico mostrando gli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di Intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso.
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE
Il PHORATE AMONN DARLEM G è un geodisinfestante sistemico che agisce contro i parassiti per contatto, ingestione ed asfissia. Applicato all'epoca della semina o del trapianto assicura un'ottima difesa dei vegetali dai parassiti sia delle radici e del colletto (Agrotidi, Elateridi, Grillotalpe, Maggiolini, Mosche, Punteruoli, Tipule, e Nematodi dei generi Meloidogyne e Pratylenchus) sia dai precoci attacchi di parassiti delle foglie e degli steli (Afidi, Altiche, Casside, Mosche minatrici, Ragno rosso, Tripidi).

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
Per la geodisinfestazione totale: 40-60 kg/ha di PHORATE AMONN DARLEM G. Per la geodisinfestazione localizzata, eseguita con microgranulatori oppure altra atrezzatura che assicuri una distribuzione uniforme nei solchi di semina o ai lati delle foglie, sono consigliate le seguenti dosi:

10-12 kg/ha su Barbabietola da Zucchero
18-22 kg/ha su Mais, Patata, Pomodoro, Tabacco
20-24 kg/ha su Ornamentali in pieno campo ed Orticole (Carota, Cavoli, Fagiolo, Melanzane, Peperone, Pisello, Sedano, Zucchino)
8-10 g/mq su Vivai di Ornamentali.
Nei casi in cui l'interramento del prodotto non sia assicurato dalla tecnica di distribuzione provvedervi mediante leggera lavorazione od irrigazione.
Su terreni fortemente alcalini o ad alto contenuto di sostanza organica è consigliabile aumentare di circa 1/3 le dosi suggerite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Non è comunque garantita la compatibilità con i formulati di altre ditte

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'
Per colture in serra sono sempre consigliabili saggi preliminari in funzione delle specifiche microcondizioni ambientali.

RISCHI DI NOCIVITA'
È tossico verso insetti utili, bestiame, animali domestici e pesci. Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
CHEMIA SPA - Stabilimento di S. Agostino (FE) - S.S. 225 Km 46

Registrazione N. 4680 del 25.2.1982 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto KG 1

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

4690

POLVERE
TIPO BORDOLESE

polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Rame metallo . . . . (da composti di rame e calcio)	g 25,2
Coformulanti.	q.b.a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 4690 del Ministero della Sanità del 25-2-1982

CARATTERISTICHE

La **POLVERE TIPO BORDOLESE** è una poltiglia bordolese essiccata, preparata con procedimento industriale e formulata in polvere bagnabile pronta per l'uso.

La **POLVERE TIPO BORDOLESE** pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce.

Il contenuto in rame metallo conferisce al prodotto una azione fungicida, contro le malattie crittogamiche sottospecificate.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

- Peronospora della vite: . . . . g 600- 800/hl d'acqua
  applicare secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente nel periodo di "chiusura"
- Ticchiolatura e cancri delle pomacee . . . . . g 1300-1600/hl d'acqua
  nei trattamenti "eradicanti" alla caduta delle foglie.
- Bolla, Corineo, Sclerotinia delle drupacee, Marciume bruno del mandorlo . . . . g 1300-1600/hl d'acqua
  nei trattamenti autunnali e invernali "al bruno".
- Occhio di pavone, Fumaggine, Lebbra dell'olivo g 650- 950/hl d'acqua
  nei trattamenti primaverili ed autunnali
- Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco degli agrumi . . . . g 650-950-1600/hl d'acqua
  nei diversi stadi vegetativi
- Cercosporiosi, della bietola da zucchero . . . . kg 6-8/ha
- Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora di: patata, pomodoro, peperone, melanzana, sedano, aglio, cipolla, pisello, fagiolo, cavoli, zucca, zucchino e delle colture ornamentali in pieno campo . . . . g 600- 800/hl d'acqua

Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

La **POLVERE TIPO BORDOLESE** è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili e colloidali, con i fertilizzanti fogliari. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cupro-sensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego con la piena vegetazione.

(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza ("Belfort") - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta del Canadà - Rosa Mantovana.

(**) Peri cupro-sensibili: Abate Fetel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Clairgeau - Passacrassana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.

NOCIVITA': Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 10

4701

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.e. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendole di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Se si opera con atomizzatori, indossare una maschera protettiva.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici: lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi fu contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Controindicate le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

ICI Solplant SpA — Del gruppo Imperial Chemical Industries PLC — ICI

'PIRIMOR' M.G.F.

Aficida a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti in formulazione granuli dispersibili

COMPOSIZIONE

Pirimicarb puro .	g 50
Disperdenti, bagnanti .	q.b.a g 100

CLASSE II

NOCIVO

CARATTERISTICHE: 'PIRIMOR' M.G.F. è efficace contro tutte le specie di afidi comprese quelle resistenti agli esteri fosforici. Esplica rapidamente il suo effetto con azione fumigante e translaminare riuscendo a colpire gli afidi annidati nelle foglie accartocciate. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi. Non lascia odori sgradevoli.

MODALITA' DI IMPIEGO

Campi di impiego:

Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio).
Orticoltura (bietola, carota, cavoli, broccoli, cetrioli, cipolla, fagioli, fragola, peperoni, patata, pomodori, rapa, lattuga, indivia).
Floricoltura di pieno campo e in serra.
Colture industriali (barbabietola, lino, canapa, tabacco)
Colture erbacee (frumento, orzo, avena, fava).
Essenze forestali.
Dosi g 50-75 per 100 litri di acqua.

Avvertenze

Nei trattamenti su brassicacee o contro afide lanigero, aggiungere alla miscela g 100 di bagnante 'AGRAL'
Irrorare bagnando bene tutta la vegetazione da proteggere, anche la più nascosta.
Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

'PIRIMOR' M.G.F. è compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo con quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. È tossico per gli insetti utili.

Sui cereali sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta; sulle altre colture 14 giorni prima della raccolta.

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione: ICI Plant Protection Div. Yalding, Kent (Inghilterra)
Registrazione Ministero della Sanità n° 4701 del 17-3-82
'PIRIMOR' - Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO

g 10

4749

LEBAYCID

CLASSE II

NOCIVO

INSETTICIDA

per trattamenti liquidi contro insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore

COMPOSIZIONE

g 100 di Lebaycid contengono:
g 48,5 di fenthion puro;
emulsionanti e solventi quanto basta a 100.
(contiene xilolo).

Natura del rischio: intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa 1 metro cospargendo con calce viva. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Colture: olivo, pesco, ciliegio, agrumi.

Dosi d'impiego: 0,05-0,1% (50-100 cc in 100 lt d'acqua) contro mosca delle olive, della frutta, delle ciliegie e tignola dell'olivo e degli agrumi.

Trattamenti con esche proteiche:

Mosca delle olive: si eseguono 3-4 trattamenti, distanziandoli di 20-30 giorni, iniziando alla comparsa degli adulti quando l'oliva comincia ad essere recettiva. E' necessario distribuire g 300 di Lebaycid + g 600 di Buminal per ettaro in 50-300 litri d'acqua a seconda dell'apparecchiatura usata.

Mosca degli agrumi: si eseguono in genere due trattamenti, distanziati di 20-30 giorni, iniziando alla comparsa dei primi adulti, con le stesse modalità e dosi di impiego consigliate per la mosca delle olive.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Lebaycid è miscibile oltrechè con Buminal, anche con gli antiparassitari a reazione neutra ed alcalina; quando però si tratta di polisolfuri o di poltiglia bordolese è consigliabile usare al più presto possibile la miscela. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è nocivo a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: VISPLANT-CHIMIREN - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione Ministero Sanità n. 4749 del 10-5-1982

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare al riparo dal gelo

g. 500

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

4791

LUMAKILLER

ESCA LUMACHICIDA, PRONTA ALL'USO, PER COLTURE FLORICOLE INTENSIVE IN PIENO CAMPO

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
— Metaldeide pura g 5
— Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto **chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa,** lontano **dal** fuoco **e dalle fonti di calore. Non fumare e non mangiare durante** l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, **bevande** o **corsi d'acqua. Non operare contro vento.** Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. **Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente** con acqua e sapone. In **caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli** questa confezione.

Informazioni per il medico: Avvelenamento grave per inalazione, per **ingestione e per contatto con la pelle.**

Sintomi di intossicazione: Violenti dolori addominali, diarrea, vomito blancastro (**aspetto di latte cagliato**), shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato **di sodio** (g 5 per litro di acqua). Riscaldare il paziente. Cardiotonici. Fleboclisi clorurate e **glucosate** con **noradrenalina**. Diuretici. Barbiturici. Neuroplegici. Anfetamina e derivati in caso di torpore.

Dosi e modalità di impiego: Per le coltivazioni in pieno campo: leggere e medie infestazioni kg 6-10 per Ha; forti infestazioni (40-50 individui per mq) kg 15 per Ha.
È consigliabile spargere il prodotto lungo il perimetro del campo su una striscia larga circa mt 1,50; internamente a questa striscia il prodotto si sparge più rado.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: Il prodotto si impiega da solo.

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in floricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette indicazioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. .... del ....

DA NON VENDERSI SFUSO Peso g 200

BIMEX s.p.a. - Farmochimica
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

officina di produzione bimex s.p.a. - isola vicentina (vi)

4793

LUMACHENE

ESCA LUMACHICIDA, PRONTA ALL'USO, PER COLTURE FLORICOLE INTENSIVE IN PIENO CAMPO

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
— Metaldeide pura g 5
— Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III **ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa, lontano dal fuoco e dalle fonti di calore. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa confezione.

Informazioni per il medico: Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: Violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), shock, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (g 5 per litro di acqua). Riscaldare il paziente. Cardiotonici. Fleboclisi clorurate e glucosate con noradrenalina. Diuretici. Barbiturici. Neuroplegici. Anfetamina e derivati in caso di torpore.

Caratteristiche: È un'esca lumachicida che agisce per contatto e per ingestione.

Dosi e modalità d'impiego: per le coltivazioni floricole in pieno campo: leggere e medie infestazioni kg. 6-10 per Ha; forti infestazioni (40-50 individui per mq). kg. 15 per Ha.
È consigliabile spargere il prodotto lungo il perimetro del campo su una striscia larga circa mt 1,50; internamente a questa striscia il prodotto si sparge più rado.

Compatibilità: Il prodotto si impiega da solo.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Rischi di nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione n. 4793 del 26-4-82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g 500**

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
Telefono N.: (0444) 558.169 - 558.199

officina di produzione bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

4846

ANTIGRILL

ESCA INSETTICIDA PRONTA ALL'USO

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
— MALATHION puro g 5
— Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con a pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
Informazioni per il medico: avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazione: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Caratteristiche: è un'esca insetticida granulare che agisce per contatto e per ingestione contro una vasta gamma di insetti terricoli quali: larve di lepidotteri, larve di ditteri, zanzare notturne, agrotidi, tignole, grillotalpe che danneggiano le colture floricole intensive in pieno campo o in serra.
Dosi e modalità di impiego: si impiega alla dose di 40-60 g ogni 10 m² (40-60 Kg/ha) spargendo i granuli uniformemente sul terreno.

«Da non applicare con mezzi aerei»

Compatibilità: il prodotto va usato da solo.
Rischio di nocività: il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

« SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA »

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione n. 4846 del 19/6/82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g 200**

BIMEX

B I M E X S . p . A .
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
Telefono N.: (0444) 558.169 - 558.199

officina di produzione bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

4847

TALPKILLER

(TALPICIDA LIQUIDO)

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
— Coumaclor puro g 0,1
— Coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.

Informazioni per il medico: Avvelenamento grave per ingestione.

Sintomi di intossicazione: Emoraggie cutanee e delle mucose-ematurie. Neutralizzano la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protrombina. La sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Antidoto specifico Vitamina K. - Vitamina C e P, consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

Controindicazioni: Cortisonici, sulfamidici, cloramfenicolo, fenilbutazone, aspirina.

Caratteristiche: Attivo contro le talpe che infestano le colture floricole intensive in pieno campo o in serra.

Dosi e modalità di impiego: Impastare con 50 grammi di pane o polenta, 100 grammi di lombrichi, larve e/o carne macinata. Versare sull'impasto grammi 100 di Talpkiller e completare l'impasto. Al tramonto deporre un cucchiaio di esca vicino ad ogni cumulo e coprire con una tegola.

Avvertenza: Usare guanti di gomma o P.V.C. Non toccare assolutamente con le mani.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: E' miscibile con i più comuni talpicidi.

Avvertenza! In caso di miscela con altri formulati devono essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di nocività: Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina ed i pesci. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in floricoltura nei modi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. n. 4847 del 19/6/82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO Peso g 100

BIMEX S.p.A. - Farmochimica
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogollo, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

officina di produzione bimex s.p.a. - isola vicentina (vi)

4853

AFILENE® 25

Insetticida-aficida formulato come liquido emulsionabile in acqua, per la lotta contro afidi di colture frutticole (melo, pesco, susino), colture erbacee (bietole da zucchero e da foraggio, pomodoro, fagioli, cavoli, insalate), colture floricole ed ornamentali in pieno campo.

COMPOSIZIONE

- Butocarboxim* puro .... g 23,75
- Coadiuvanti e solventi quanto basta a .... g 100

Contiene Xiloło

(r) Marchio registrato SIPCAM - Milano

* sostanza attiva originale brevettata Wacker Chemie GmBH Monaco di Baviera

CLASSE I

VELENO

SIPCAM-Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano SpA
Viale Gian Galeazzo 3 Milano
Officina di produzione.
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 4853 del 19.6.82 Ministero della Sanità

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione per ingestione o per contatto con la pelle

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirare i vapori; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle e gli occhi durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi; dopo la manipolazione od in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)

Sintomi di intossicazione:

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi é stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di Atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi é cianosi.

Controindicazioni :

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si usa alle seguenti dosi indicate in grammi per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.

Contro afidi di colture arboree frutticole (melo, pesco, susino), di colture erbacee (bietole da zucchero e da foraggio, pomodoro, fagioli, cavoli, insalate) fiori e colture ornamentali in pieno campo: 200-300 g

Irrorare sufficiente miscela in modo da coprire interamente le piante specie nel caso di trattamenti con infestazioni di afidi giá sviluppate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilitá: il prodotto é compatibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle sostanze alcaline, come polisolfuri, poltiglia bordolese e calce

Avvertenze : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispattato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicitá: su colture orticole, floricole ed ornamentali, stante il grande numero di varietá colturali aventi diverso grado di sensibilitá, é consigliabile effettuare prima un saggio su una piccola superficie e solo dopo risultati positivi passare ai trattamenti di larghe superfici

Rischi di nocività : il prodotto é tossico per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame
Evitare i trattamenti durante la fioritura.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli impieghi consentiti, ogni altro uso é pericoloso.
Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 20

4907

POLTAN

POLTIGLIA BORDOLESE BIMEX

Composizione: 100 gr di prodotto contengono:
— RAME metallico (da composti di rame e di calcio) gr 13
— Coformulanti q.b. a . . . . gr 100

CLASSE IV

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: in caso di intossicazione chiamare il medico per i **consueti** interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: Poltan è un fungicida idoneo per la difesa delle **colture floricole** intensive in pieno campo, dalle infezioni di peronospora, ticchiolatura, alternaria, antracnosi, septoria, ruggine.

Dosi e modalità di impiego: si impiega alla dose di 1-3 Kg/hl di acqua, intervenendo ogni volta che si manifesta il pericolo di infezioni fungine.
Tali dosi si intendono per i trattamenti a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate, in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere alla miscela un adesivo-bagnante. Per la preparazione della miscela si consiglia di diluire la giusta dose di prodotto in poca acqua ed agitare fino ad ottenere una pasta cremosa; aggiungere poi il resto dell'acqua continuando ad agitare, fino a raggiungere la concentrazione desiderata.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: E' miscibile con tutti i prodotti di comune impiego.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione.
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

Registrazione n. 4907 del 8/9/82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g 150**

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
Telefono N.: (0444) 558.169 - 558.199

officina di produzione bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

4987

ERBICIDA **Monsanto**

Erbicida selettivo per cipolla, aglio, porro, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo cappuccio, ravanello, bulbose da fiore in pieno campo ed in serra

COMPOSIZIONE	
Propaclor puro	gr. 65,0
Coadiuvanti ed inerti	q.b.a. gr 100,0

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

GENERALITÀ
RAMROD® erbicida Monsanto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in fase di germinazione
RAMROD® erbicida Monsanto e selettivo per le colture ortive e floreali sopra indicate e distrugge la maggior parte delle infestanti annuali provenienti da seme, quali *Amaranto, Giavone, Galinsoga, Stellaria, Poa, Portulaca, Setaria, Senecio, Veronica, Papavero, Ortica, Anagallide.*
Mediamente sensibili sono invece alcune poligonacee *(Centinodia, Persicaria, Chenopodio), Capsella, Camomilla, Cicerbita, Euforbia, Trifoglio).*
Resistenti sono *Fumaria, Convolvolo* e tutte le infestanti perenni quali *Gramigna, Cipero, Vilucchio, Stoppione.*
La persistenza di azione del RAMROD® erbicida Monsanto e di circa 6-8 settimane. Il prodotto successivamente viene degradato nel suolo senza lasciare residui tossici per le colture successive

MODALITÀ DI IMPIEGO
RAMROD® erbicida Monsanto si impiega in pre-emergenza ed in post-trapianto. Perche i trattamenti possano dare buoni risultati e necessario, se si opera su terreno asciutto, che una pioggia di 10-15 mm cada entro 8-10 giorni dal diserbo, in caso contrario si deve provvedere ad una buona irrigazione
- **Trattamenti in pre-emergenza:** intervenire subito dopo la semina od al massimo 1-2 giorni dopo.
- **Trattamenti in post-trapianto:** intervenire dopo il superamento della crisi di trapianto, ma prima della nascita delle infestanti

Le dosi di impiego variano in funzione della natura del terreno e precisamente

- **nei terreni sciolti e sabbiosi**	**kg 6/ha**
- **nei terreni di medio impasto**	**kg 7/ha**
- **nei terreni pesanti o argillosi**	**kg 8/ha**

Per allargare lo spettro di azione del prodotto nei confronti delle infestanti e per avere nel contempo un'efficacia erbicida pronta e duratura, impiegare l'associazione di kg 4 di RAMROD® con kg 8 di formulati al 75% di Clortal-dimetile.
Diluire il prodotto in 500-600 o piu litri di acqua e distribuire uniformemente la poltiglia su tutta la superficie del campo.

Preparazione nella poltiglia:
Stemperare in poca acqua, a parte, la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua agitando energicamente; durante il trattamento tenere in costante agitazione la poltiglia

AVVERTENZE
Impiegare il prodotto solo per il diserbo delle colture seminate o trapiantate in autunno-inverno ed inizio della primavera, cioe quando la temperatura e bassa, in estate o durante la stagione calda la termo-labilita del prodotto porta ad una riduzione della persistenza

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscelabile con altri erbicidi utili per allargare lo spettro d'azione (Clortal-dimetile).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto venga a contatto con le colture non indicate in etichetta.
Dopo l'impiego e prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari, lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida.

RISCHIO DI NOCIVITÀ - E tossico per i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MONSANTO ITALIANA S.p.A.
Via M. Gioia, 8 - MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N° 4987 del 25 · 10 - 82

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A.
Salerano sul Lambro (Milano)

DA NON VENDERSI SFUSO – Peso netto kg 40

® Marchio registrato MONSANTO

5002

INDREX®

Anticrittogamico
ad azione preventiva e curativa

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione:

Dodina puro	g. 50
Supporti, disperdenti, coadiuvanti	q.b. a g. 100

III CLASSE
ATTENZIONE:
manipolare
con prudenza

BASLINI

Industrie Chimiche
Dr. Baslini S.p.A.
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione N. [illegible] **del** [illegible]
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi resistenti alle terapie a causa della fitosensibilizzazione. Possibilità di colasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro) e digitale.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

CARATTERISTICHE

L'INDREX è un funghicida per il controllo della ticchiolatura del melo, del pero, della vaiolatura del ciliegio e nel controllo e prevenzione di numerose altre infestazioni fungine.
L'attività dell'INDREX viene esercitata, specie nella lotta contro la ticchiolatura del melo, nella massima parte come azione curativa.

DOSI E CAMPI DI IMPIEGO ED USI

uso dell'INDREX viene particolarmente consigliato contro
Melo contro la ticchiolatura alla dose di gr. 90-100 per ettolitro di soluzione nei trattamenti ad effetto curativo; alla dose di gr. 70-80 per ettolitro di soluzione nei trattamenti ad effetto protettivo-preventivo
Pero contro la ticchiolatura alla dose di gr 110-130 per ettolitro di soluzione nei trattamenti ad effetto curativo; alla dose di gr 65-75 per ettolitro di soluzione nei trattamenti ad effetto protettivo-preventivo
Ciliegio contro la vaiolatura alla dose di gr 80 per ettolitro di soluzione
Fragola contro le vaiolatura delle foglie alla dose di gr 100-120 per ettolitro di soluzione eseguendo i trattamenti alla fioritura fino a 10 giorni prima del raccolto.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

L'INDREX formulato come polvere bagnabile va aggiunto direttamente all'acqua sotto energica agitazione aggiungendo, a soluzione ottenuta, gr 40 del nostro bagnante PRUNIG

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

L'INDREX può essere miscelato con tranquillità con la maggior parte degli insetticidi, acaricidi, funghicidi, normalmente usati mentre è incompatibile con il Clorobenzilato, la calce, la poltiglia bordolese e con i prodotti a reazione alcalina, non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilanzifos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C. E' consigliabile comunque essere molto cauti nel miscelare il prodotto con altri anche per evitare eventuali dannose riduzioni della sua attività.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

TOSSICITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci. Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

5003

TIOCUPRIN

polvere scorrevole a base di RAME - ZOLFO

COMPOSIZIONE: **100 gr. di prodotto contengono:**

RAME PURO .... **gr. 4**
(sotto forma di Ossicloruro)

ZOLFO PURO (Esente da Selenio) .... **gr. 59,40**

Eccipienti attivi, coadiuvanti, bagnanti e coloranti q. b. a 100

FINEZZA: Residuo massimo al Setaccio UNI 0,05:5%

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

— **In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

DOSE INDICATIVA: Kg. 20-25 circa per ha.

IMPIEGO: Trattamenti a secco contro: **l'oidio della vite**, delle colture ortive (carciofo, cardo melone, anguria, cetriolo, zucca, zucchino, peperone, melanzazna, barbabietola, lattuga, pomodoro, (solo fino alla prima fioritura), pisello) ed ornementali (rosa, ortensia, begonia) in pieno campo - **mal bianco** delle drupacee e delle pomacee - azione complementare dei trattamentii liquidi contro la **peronospora della vite** e la **ticchiolatura** delle pomacee.

Il « prodotto » è una **polvere** con finezza rilevante che la rende adatta ad essere distribuita con i moderni **atomizzatori-impolveratori** o con i solforatori comuni. Ben distribuito assicura su tutto la vegetazione una **razionale** ed **uniforme difesa. In presenza di umidità**, si fissa meglio su tutte le parti della pianta.

ATTENZIONE: poichè trattasi di polvere fine conviene regolare al minimo l'erogazione delle solfatrici, aumentadola gradatamente fino al raggiungimento della nube.

« Da non impiegare con mezzi aerei ».

COMPATIBILITA': Raccomandiamo, di non usare il prodotto in miscela con calce, mancozeb, maneb, clorfenamidina, olii bianchi o gialli.
Il suo impiego deve essere distanziato di almeno 3 settimane da quello del Captano od olii minerali.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si vericassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÁ: Non si deve dare durante la fioritura su varietà di melo (Abbondanza « Belford », Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rose Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avanches, Butirra Clargeau, Passacrasana, B. C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili.
Non deve essere impiegato, dopo la fioritura, sulle seguenti varietà di melo perchè ad esse dannoso: Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Roma Beauty, Staman, Cochele Brams.

RISCHI DI NOCIVITA': Il « prodotto » è tossico per i pesci. Il contatto e l'irrogazione prolungati possono causare, in alcuni individui particolarmente sensibili, irritazione della pelle e delle mucose.

— **Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.**

— Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

IL RISPETTO DELLE PREDETTE ISTRUZIONI E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

PASQUALE **MORMINO** & FIGLIO S. p. A.
OFFICINA DI PRODUZIONE: **TERMINI IMERESE (PA)**

Registrazione n. 5003 del Ministero Sanità del 25-10-1968 24-11-1982
DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 25

5036

BASMETIL®

Insetticida a base di Metilparathion

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Metilparathion puro	gr. 18
Solventi, emulsionanti	q.b. a gr. 100

Contiene: Xilolo

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

BASLINI

Industrie Chimiche
Dr. Baslini S.p.A.
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
DIACHEM S.p.A. Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione N. 5036 **del** [illegible]
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialloroa, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nel casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone o soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il BASMETIL è un insetticida fosforganico che agisce principalmente per contatto, oltre che per ingestione ed asfissia. Possiede una rapida azione iniziale e un'ottima persistenza nel tempo, inoltre grazie al suo potere citrotopico, entra facilmente nei vegetali trattati. Viene impiegato per il controllo dei diversi parassiti quali:

Frutticolture (Melo, Pero e Drupacee)
gr 200-250/hl contro Carpocapsa, Afidi, Psilla, Tentredini, Larve defogliatrici, Antonomo, Tingidi, Tignole, Coccigniglie negli stati giovanili.

Viticoltura
gr 150-250/hl contro Tignole, Sigaraio, Tortrici, Eriofide, Oziorrinco, Cocciniglia cotonosa.

Olivicoltura
gr. 200-300/hl contro Fleotribo, Tignola, Cotonella, Mosca, Saissetia olese (Mezzograno di pepe)

Agrumicoltura
gr 250-350/hl contro Tripidi, Mosca della frutta, Saissetia olese (Mezzograno di pepe) ed altre Cocciniglie

Orticoltura
gr 200-250/hl contro Cavolaia, Afidi, Altiche, Punteruoli, Casside, Tignole, Larve defogliatrici e minatrici.

Floricoltura in pieno campo
gr 200-300/hl contro Afidi, Larve defogliatrici, Tripidi, Larve minatrici, Bega del garofano.

Pioppo
gr. 300-400/hl contro Crisomela, Stilpnozia, Cimicetta, Punteruolo, Tignole, Larve minatrici

Tabacco
gr 150-200/hl contro Tripidi, Afidi

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: il BASMETIL è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio ad eccezione della poltiglia bordolese dei polisolfuri alcalini e dei mercuri organici.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta. In caso di miscela con olii minerali tale periodo è di 30 giorni.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

5061

SULCOL®

Zolfo bagnabile colloidale neutro
per la lotta contro l'oidio della vite,
il mal bianco dei fruttiferi

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

Composizione:

Zolfo colloidale puro (esente da selenio)	gr 80
Supporti, disperdenti, coadiuvanti	q b a gr 100

IV CLASSE

BASLINI

Industrie Chimiche
Dr. Baslini S.p.A.
Via G. Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore
DIACHEM S p A Albano S Alessandro (BG)

Registrazione N. [illegible] **del** [illegible]
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

La sua estrema finezza rende il prodotto di grande efficacia contro l'oidio della vite ed il mal bianco del melo e del pesco, nonchè verso alcuni acari parassiti.
Il SULCOL ha pure azione complementare nei confronti della ticchiolatura del melo

DOSI D'IMPIEGO

Il SULCOL si applica alle dosi di gr 50-150 per 100 litri d'acqua. Le dosi più alte vanno usate nei momenti di bassa temperatura, riservando le dosi minime per i periodi più caldi.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il SULCOL è miscibile con il nostro LEVEN, con gli esteri fosforici e con gli altri prodotti di uso estivo. Non è consigliabile unirlo ad olii o ad altri prodotti contenenti olii poichè entrando in reazione con tali prodotti potrebbe causare ustioni alle parti verdi. Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano. Devono esere, inoltre, osservate le Norme Precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio

VITE: Sangiovese

Sospendere i trattamenti 5 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

5065

BANTOL®

Anticrittogamico a base di ossicloruro di rame

Tipo di formulazione: polvere bagnabile.

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono

Rame metallico (sottoforma di ossicloruro tetraramico)	g 50
Inerti e coadiuvanti	q.b a g 100

III CLASSE
ATTENZIONE
manipolare
con prudenza

BASLINI

Industria Chimiche
Dr. Baslini S.p.A.

Via G Serbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Stabilimento produttore:
DIACHEM S.p.A Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione N. [illegible] **del** [illegible]
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA D'IMPIEGO

Il BANTOL è un anticrittogamico in polvere bagnabile finemente micronizzato. La finezza delle particelle consente un'azione iniziale pronta, una copertura uniforme e completa delle parti trattate, una prolungata adesività, una notevole persistenza di azione e una maggiore resistenza al dilavamento. Viene consigliato per:

Melo e pero: contro ticchiolatura: gr. 250/hl in primavera all'ingrossamento della gemma; gr. 800-1000/hl in inverno (al bruno). Quest'ultimo impiego è valido anche per il controllo della Nectria e di tutti i cancri del ramo.

Vite: peronospora: gr. 400-500/hl in pre e post fioritura e nei trattamenti di "chiusura".

Orticoltura: carciofo, cardo, cavolo, cicoria, cucurbitacee, spinacio: gr. 250-300/hl contro peronospora.

Sedano: gr. 250-300/hl contro ticchiolatura e septoria.

Cipolla, pomodoro, patate, contro peronospora gr. 400-500/hl.

Patata, pomodoro, contro alternaria gr. 400-500 hl.

Pisello contro antracnosi gr. 400-500/hl.

Pomodoro contro septoria: batteriosi gr. 400-500/hl

Fagiolo, asparago contro ruggine gr. 400-500/hl

Olivicoltura: occhio di pavone, lebbra, fumaggine gr. 400-500/hl.

Bieticoltura: contro cercospora kg. 3,5-4/ha.

Agrumicoltura: contro allupatura, malsecco, antracnosi, marciume dei frutti, fumaggine gr. 250-400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA

Il BANTOL è compatibile con tutti i prodotti antiparassitari ad eccezione dei Polisolfuri, dei prodotti a base di Tepp e Thiram (TMTD).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA

Non si deve trattare durante la fioritura. Su varietà di melo (Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibile il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

5126

IV CLASSE

DU-DIM

POLVERE BAGNABILE

INSETTICIDA PER INGESTIONE PER LA DIFESA DI PIANTE DI MELO, PERO, FORESTALI

Registrazione Ministero Sanità n° 5126 del 29-11-1982

marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono	
— Diflubenzuron puro	g 5
— Coformulanti	q.b. a g 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il DU-DIM appartiene ad un gruppo di insetticidi di sintesi che inibiscono la deposizione della chitina negli insetti, con conseguente morte in fase di muta. Il DU-DIM è efficace sulle colture indicate in etichetta contro i microlepidotteri minatori ed i lepidotteri ricamatori del melo, la Carpocapsa, l'Orgya e la Psilia del pero.

In foresta combatte: Thaumetopoea Pityocampa (Processionaria del pino), Lymantria Dispar, Rhyacionia Buoliana, Pristiphora Abietina

MODALITA' D'IMPIEGO

Dosi per 100 litri d'acqua:

Frutticoltura (melo e pero): contro microlepidotteri minatori (Lithocolletis, Cemiostoma) g 200-300. Effettuare il trattamento durante la fase di volo degli adulti, in corrispondenza della ovideposizione.

Contro i lepidotteri ricamatori (Capua, Archips), Carpocapsa, Orgya: g 400. Trattare durante la deposizione delle uova o in prossimità della loro schiusura.

Contro la Psilla del pero: g 400. Effettuare il trattamento alla schiusura delle uova.

Piante forestali: contro Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar, Rhyacionia buoliana, Pristiphora abietina: g 250-350.

Su tutte le colture effettuare il trattamento, in linea di massima, durante la ovideposizione o quando le uova stanno per schiudere.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il DU-DIM è miscibile in via di massima con i più comuni antiparassitari fatta eccezione di quelli a reazione alcalina (Polisolfuri, poltiglia bordolese).

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 45 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO **KG. 1**

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

AMONN FITOCHIMICA S.p.A.
Via Siemens, 12 - BOLZANO

5151

FENASIP® 12EC

Fungicida organico endoterapico liquido emulsionabile per la difesa delle colture di melo, vite, pesco, cucurbitacee.

Si impiega in trattamenti liquidi contro Oidio e Ticchiolatura del Melo, Oidio delle altre colture sopraindicate.

COMPOSIZIONE

- Fenarimol puro .... g 12
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a .... g 100
- contiene Glicol etilenico

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM- Soc.It.Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale G.Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Verchim Asterias SpA
Ozzano Emilia (BO)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 5151 del 22.12.1982 Ministero della Sanita'

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali : conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua irrorato con pompe a volume normale.

MELO
Contro l'Oidio : impiegare una dose di g **35-40** ogni 7-10 giorni in funzione dell'intensità della malattia iniziando i trattamenti alla fase di orecchiette di topo.
Volendo combattere contemporaneamente anche la **Ticchiolatura**, aggiungere alla miscela preparata come sopra preferibilmente:
g **150-180** di Mancozeb 80% (MICENE MZ) nei frutteti misti od una dose ridotta di altro fungicida ad azione antiticchiolatura e compatibile in miscela, impiegando le dosi più alte fino all'allegagione e le più basse successivamente.
Iniziare tali trattamenti all'apertura delle gemme, ripetendoli ogni 7-8 giorni fino a che il frutto ha raggiunto la grossezza di una noce; passare quindi ad intervalli più allargati es. 10-14 giorni, in funzione dell'andamento stagionale.

VITE
Contro l'Oidio: impiegare il prodotto alla dose di g **10-20**, iniziando i trattamenti quando i germogli sono lunghi 10 cm, ripetendoli ogni 7-10 giorni fino all'allegagione; aumentare successivamente la dose a g **15-30** (su uve da tavola g **25-30**), mantenendo lo stesso intervallo fra i trattamenti. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi nei periodi critici.
Volendo combattere contemporaneamente anche la **Peronospora**, miscelare gli opportuni fungicidi, aumentando la dose di FENASIP 12 EC man mano che si allunga l'intervallo dei trattamenti.

PESCO
Contro l'Oidio: impiegare il prodotto alla dose di g **35-40** alla scamiciatura dei frutticini, ripetendo il trattamento 7 giorni dopo. Ripetere i trattamenti alla prima comparsa della malattia a distanza di 7 giorni uno dall'altro. Nei periodi critici, durante il primo accrescimento dei frutti nelle zone e sulle varietà più sensibili, impiegare le dosi più alte.

CUCURBITACEE (Cetriolo, Cocomero, Melone, Zucca, Zucchino)
Contro l'Oidio: impiegare il prodotto alla dose di g **20-25**, iniziando i trattamenti alla prima comparsa della malattia e ripetendoli ogni 8-12 giorni.

Usare le dosi inferiori fra quelle indicate, nel caso si facciano associazioni con altri prodotti ad azione complementare.

Preparazione della poltiglia: diluire la quantità necessaria di prodotto, direttamente nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione delle miscele alcaline come polisolfuri e calce; non essendo state comunque saggiate tutte le possibili combinazioni , si consiglia di effettuare una piccola prova di compatibilità fisica, prima di effettuare la miscela nella botte.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si raccomanda di attenersi alle dosi consigliate potendosi avere effetti sfavorevoli al verificarsi di avverse condizioni climatiche. Si rimanda all'etichetta degli altri formulati aggiunti in miscela estemporanea per eventuali specifiche controindicazioni.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per le api.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5212

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Evitare di respirarne i vapori. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. - Durante la preparazione o l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. - Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Intossicazione per inalazione, ingestione accidentale o per assorbimento attraverso la pelle.
Sintomi di intossicazione: sudorazione, sete, nausea, spossatezza, o agitazione psicomotoria, tachicardia, dispnea, notevole ipertermia. Colorazione gialla della sclere. La morte consegue ad edema celebrale o paralisi respiratoria e circolatoria.
Consigli terapeutici: Intossicazione acuta: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, all'1% ed iposolfito di sodio al 5%. Emetici e catarsici se il paziente è cosciente. **Non procedere a lavanda gastrica se si sospettano lesioni dell'esofago, molto frequenti nel caso di ingestione.** Combattere la ipertermia con bagni freddi e estese e ripetute applicazioni fredde, spugnature di alcool, clisteri d'acqua fredda. Trasfusione o fleboclisi glucosate al 5% o di soluzioni elettrolitiche isotoniche nel caso di collasso od ipotensione. Metil o propiltiouracile per ridurre il metabolismo basale. Ossigeno, respirazione artificiale.
Controindicazione: Atropina.

MEDIFEN

INSETTICIDA - FUNGICIDA IN FORMULAZIONE PASTA PER IL TRATTAMENTO INVERNALE IN FRUTTICOLTURA

C O M P O S I Z I O N E

gr. 100 di prodotto contengono:

— DNOC Sale ammonico puro	gr.	50
— Bagnanti, adesivanti e coadiuvanti	q. b. a gr.	100

CLASSE I^a

VELENO

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255

demetra ITALIA
Via Cavallotti 39
Tel. (051) 85 19 01 (0542) 76 223
40059 MEDICINA (Bologna)
CHIMICA PER L'AGRICOLTURA

Officine di produzione:
VISPLANT Chimiren s.r.l. - Via Salvi, 1 - Renazzo di Cento (FE)
TERRANALISI s.n.c. di Malaguti Dr. Enzo e C. - Via IV Novembre - Cento (FE)

Reg. N. 5212 del 10/2/83 del Ministero Sanità

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Il **MEDIFEN** è un insetticida-anticrittogamico di impiego invernale per la difesa delle piante da frutto. Il **MEDIFEN** si impiega alle seguenti dosi:
— DRUPACEE (Pesco, Susine, Ciliege ed Albicocco) Contro i parassiti svernanti sulla pianta come Afidi, Acari, Bolle, Cocciniglia, Corineo, Oidio e Monilia
gr. 400 per 100 litri di acqua
Eseguire i trattamenti circa 15 giorni dopo la completa caduta delle foglie.
— PERO Contro Afidi, Cocciniglie e per il controllo degli attacchi di Psylla fino a Primavera inoltrata
gr. 600/800 per 100 litri di acqua
Eseguire i trattamenti al risveglio vegetativo (gemme rigonfie).
— MELO Contro Afidi, Cocciniglie, Uova di Ragno Rosso, forme svernanti di Ticchiolatura e Cancro rameale
gr. 600/800 per 100 litri di acqua
Eseguire il trattamento dalla caduta delle foglie al risveglio vegetativo.
— VITE Contro il Mal dell'esca e l'escoriosi
gr. 500/1000 per 100 litri di acqua
Eseguire il trattamento dopo la potatura, prima del rigonfiamento delle gemme.
Non eseguire la scortecciatura prima del trattamento con **MEDIFEN**.
— OLIVO Contro Cocciniglie (Saissetia oleae o mezzograno di pepe ecc., fumaggine)
gr. 800/1500 per 100 litri di acqua
Eseguire il trattamento tra Gennaio e Febbraio a gemme ferme usando la dose massima nel caso che il trattamento viene effettuato entro il mese di Gennaio o su piante completamente ricoperte dalla fumaggine.

I trattamenti con **MEDIFEN** devono essere eseguiti preferibilmente in giornate molto umide, con cielo coperto e senza vento e con la temperatura non al di sotto dei 5°C, impiegando 20/30 ettolitri di acqua per ettaro e bagnando bene sia le piante che il terreno ad esse sottostante.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

Il **MEDIFEN** è miscibile con il VALOIL in modo da combattere più efficacemente le uova dei ragnetti rossi. - AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. - Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non effettuare il trattamento nel caso esistano sottocolture di ortaggi, fiori e nel caso di consociazioni di Drupacee con Agrumi.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, i pesci e il bestiame.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA, NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Confezioni:
Taglie da Kg. 1 - Kg. 5 Kg. 6 - Kg. 10 - Kg. 12

5317

Flortis®

DISERBANTE TOTALE

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza

Diserbante totale per sentieri di giardini e viali

Soc. ORVITAL
Milano - Made in Italy

COMPOSIZIONE: TCA sodium puro g 25; Simazina pura g 7,5; Atrazina pura g 5; Disperdenti coadiuvanti inerti q.b.a g 100.

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante la manipolazione e l'impiego del prodotto si dovranno indossare abiti ed occhiali protettivi ed eventualmente respiratori (o semimaschere).

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Al medico dovrà essere mostrata questa etichetta.

CARATTERISTICHE: FLORTIS DISERBANTE TOTALE è stato appositamente studiato e formulato per eliminare le erbacce da sentieri di giardini, viali, spiazzi di terra battuta. L'effetto di FLORTIS DISERBANTE TOTALE è tale da mantenere pulite per alcuni mesi le superfici trattate. Agisce per via fogliare e penetrando progressivamente nel terreno, così da raggiungere attraverso le radici tutte le parti vitali delle malerbe. Il suo effetto si nota dopo alcuni giorni dal trattamento. FLORTIS DISERBANTE TOTALE può essere impiegato su tutte le superfici non coltivate.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Per l'impiego il periodo più adatto va da aprile a giugno, anche se possono sussistere necessità di applicazione in altri periodi dell'anno specialmente in ambienti umidi. Questa confezione serve per 50-100 mq di superficie a seconda della quantità di erbacce da eliminare. Per superfici minori regolarsi in proporzione tenendo presente che 100 g di prodotto vanno sciolti in 10 litri di acqua. Dopo aver versato il prodotto in acqua mescolare a fondo con un bastone onde ottenere una omogenea distribuzione del prodotto attivo in acqua. Distribuire uniformemente la soluzione sul terreno da trattare adoperando un innaffiatoio o se possibile una pompa irroratrice. Qualora dopo l'applicazione e per alcuni giorni non si verificassero piogge è consigliabile innaffiare le aree trattate affinchè il prodotto possa penetrare attraverso il terreno attivando così la sua azione. In caso di malerbe perenni, largamente diffuse, l'effetto può risultare limitato e pertanto, come pure per ottenere effetti più rapidi, si consiglia di raddoppiare la dose e questo anche quando sussistano forti infestazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ: Data la composizione e l'uso del prodotto esso va usato da solo, evitando di miscelarlo con altri prodotti.

FITOTOSSICITÀ: Assicurarsi che durante l'applicazione la soluzione diserbante non vada a contatto con le piante utili, sia per scorrimento che per getto e ancora per causa del vento. Ricordarsi di non trattare aree di terreno occupate da radici di piante utili. Risciacquare con molta acqua i recipienti utilizzati prima di adoperarli per altri usi.

Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

"Attenzione ad impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

ORVITAL srl - Via Tortona 25, Milano - Made in Italy.

Officina di produzione: I r c a - Albano S. Alessandro (BG) - Registrazione Ministero Sanità N. 5317 del 11-4-83

DA NON VENDERSI SFUSO.

Contenuto g 100.

5380

Classe III

ATTENZIONE
manipolare con
prudenza

NEMISPOR® 70 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE PER IRRORAZIONI SU VITE, MELO, PERO, PIOPPO, POMODORO E GAROFANO

COMPOSIZIONE

Mancozeb puro	g 70
Disperdenti, coloranti e sostanze inerti q.b. a	g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. 5380 **del** 14.983

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

Fungicida di copertura per irrorazioni preventive alla parte aerea, da effettuarsi ogni qualvolta le condizioni di temperatura e umidità rendono possibile un'infezione.

Dosi d'impiego per 100 litri di acqua in trattamenti a volume normale

VITE - Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero: g 150-350.

MELO e PERO - Ticchiolatura, Septoriosi, Alternariosi, Ruggine: g 200-250.

PIOPPO - Bronzatura (Marssonina Brunnea): g 450-550.

POMODORO (solo fino alla prima fioritura) - Peronospora, Septoriosi, Alternariosi, Cladosporiosi, Antracnosi: g 200-300.

GAROFANO (in pieno campo) - Ruggine: g 150-250.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua sino ad avere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua sino ad ottenere la diluizione voluta, agitando.

DIVIETI D'IMPIEGO

- **DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
- **DA NON IMPIEGARE IN SERRA**
- **DA NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE**

Compatibilità

Il NEMISPOR 70 BLU è compatibile con gli antiparassitari normalmente usati fatta eccezione per quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese, Polisolfuri) e per i concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Natura del rischio

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il il paziente è in stato di incoscienza, la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

62

5381

ANTICRITTOGAMICO AGRICOLO

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

Principio attivo:
MANCOZEB puro . . . . gr. 80

Sostanze inerti e coadiuvanti q.b. a gr. 100

CLASSE III^a

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - **Sostanza pericolosa per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.**

NORME PRECAUZIONALI - **Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche cure generiche delle dermatiti. Nei casi gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione.

Controindicati: alcool, olii, grassi.

MODALITA' DI IMPIEGO

MELO E PERO: contro ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria, glomerella, gleodes, impiegare 150-200 gr/hl di MAZEB. Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona. Non usare il MAZEB sulle varietà di pero sensibili.

VITE: contro la peronospora, impiegare 200 gr/hl di MAZEB. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro l'escoriosi effettuare due trattamenti con la dose di 350 gr/hl di MAZEB; il primo allo stadio di gemma cotonosa - punta verde, il secondo allo stadio emissione del germoglio - uscita delle foglie.

POMODORO:
contro la peronospora, alternaria, septoria, antracnosi, cladosporiosi, impiegare 200-300 gr/hl di MAZEB. Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia ripetendoli ogni 7-10 giorni solo sino alla prima fioritura. Contro forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 gr/hl di MAZEB.

CEREALI IN CAMPO (frumento, orzo, avena) contro ruggini e septoria impiegare 2,5 Kg/Ha di MAZEB durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.

CONCIA DELLE SEMENTI: il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame.

- **Grano**: contro la Carie (Tilietia tritici), la Fusariosi (Fusarium nivale), usare gr. 150 di prodotto per quintale di seme.
- **Riso**: contro il Brusone (Piricularia Oryzae ed Helminthosporium oryzae) e contro la Fusariosi (Fusarium sp) impiegare il prodotto in ragione di 200-250 gr per quintale di seme.
- **Mais**: contro Carbone (Ustilago maydis) l'Elmintosporiosi (Helminthosporium maydis) e le contaminazioni esterne da Fusarium moniliforme e Gibberella zeae usare gr. 250-300 per q.le di seme.
- **Barbabietola da zucchero**: contro Phoma betae, la Fusariosi (Fusarium sp), il Mal vinato (Rhizoctonia solani) e la Cercosporiosi (Cercospora beticola) usare 600 gr di prodotto per quintale di seme.
- **Patata**: contro Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, impiegare 250-300 gr di prodotto per quintale di seme a seconda della dimensione dei tuberi.
- **Sementi orticole**: contro Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp, impiegare 250-600 gr di prodotto per quintale di seme a seconda del tipo di seme.
- **Girasole**: contro Fusarium sp, Pythium, impiegare 250-300 gr di prodotto per quintale di seme.

TABACCO: contro peronospora, in semenzaio trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro con 100-150 hr/hl di MAZEB; in pieno campo trattare due volte la settimana con 200 gr/hl.

PIOPPO: contro la marssonina brunnea impiegare 400-500 gr/hl. Iniziare i trattamenti al più presto per prevenire le infezioni precoci (metà Aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.

GAROFANO IN PIENO CAMPO: Ruggine (Uromyces Caryophyllinus). Iniziare i trattamenti quando vi sono condizioni favorevoli alla malattia oppure appena le piantine hanno formato le prime foglie. Impiegare da 120 a 240 gr di MAZEB per ogni 100 litri di acqua. Trattare ogni settimana cercando di bagnare accuratamente tutte le parti delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il MAZEB è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari quali il Kelthane (R), Karathane (R), zolfi bagnabili, esteri fosforici, Sevin, Azinphosmetil polvere bagnabile. Incompatibile con la poltiglia solfo-calcica e con i concimi fogliari contenenti boro.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSITA': il prodotto è fitotossico per alcune varietà di Pero sensibili (quali: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna) e sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI ALMENO 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PRODOTTO DA:
ROHM AND HAAS FRANCE S.A. - PARIGI
Stabilimento di LAUTERBOURG
Registraz. Min. Sanità N. 5381 del 4.7.83
DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO KG. 5

5384

ERBICIDA **Monsanto**

DISERBANTE IN PASTA LIQUIDA SELETTIVO PER IL MAIS

COMPOSIZIONE
Principi attivi:

Alaclor puro	gr 27,00
Atrazina pura	gr 11,70
Coformulanti e solventi	q.b. a gr 100,00

Contiene tetracloroetilene e 1-1-1 tricloroetano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

MODALITÀ DI IMPIEGO

Caratteristiche:
Il prodotto è attivo sulla maggior parte delle infestanti annuali, provenienti da seme, sia a foglia larga che a foglia stretta, comprese *Digitaria, Setaria, Giavone americano e Sorghetta da seme*, resistenti alle triazine Esso agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in via di germinazione e perciò richiede che il terreno, al momento del trattamento, sia umido oppure che una pioggia di 10-15 mm cada entro due settimane dall'applicazione

Campo e dosi di impiego:
Il diserbo si effettua su tutta la superficie del campo oppure in forma localizzata a bande larghe 20-25 cm lungo le file in questo ultimo caso la dose di impiego va rapportata alla effettiva superficie trattata
Preparare accuratamente il terreno affinché non rimangano zolle e zollette
Impiegare ASTER erbicida **MONSANTO subito dopo la semina o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti.**
In condizioni di persistente siccità e nell'impossibilità di irrigare a pioggia effettuare prima della semina un leggero interramento del prodotto - alla profondità di 2-3 cm - al fine di sopperire alla mancanza di precipitazioni In questo caso aumentare le dosi sotto raccomandate del 20% al fine di compensare la dispersione del prodotto in uno strato maggiore di terreno

ASTER erbicida MONSANTO va distribuito curando la uniforme copertura della superficie da trattare ed impiegando, in 400-600 lt di acqua per ettaro le seguenti dosi
lt/ha 6,75 per il controllo di *Digitaria, Setaria, Giavone americano* ed infestanti dicotiledoni
lt/ha 8-9 per il controllo della *Sorghetta da seme* e delle infestanti graminacee e dicotiledoni
Le dosi più elevate sono suggerite per l'impiego nei terreni pesanti

Eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenente l'erbicida

Preparazione della sospensione erbicida:
A parte stemperare in poca acqua la prestabilita quantità di prodotto mescolando con cura Versare la sospensione nella metà dell'acqua necessaria indi riempire la botte agitando

AVVERTENZE
Conservare il prodotto protetto dal gelo
Le coltivazioni di mais trattate con ASTER erbicida MONSANTO non possono essere consociate ad altre colture
Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto, tale azione viene altresì ridotta od annullata dallo spargimento del liquame di stalla
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, e di 10 mesi per altre colture (es bietola, tabacco) Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.
Si proceda ad una buona aratura prima della semina

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ
Il prodotto si usa da solo

FITOTOSSICITÀ
Si consigliano prove parcellari per le varietà poco note o di recente acclimatazione
Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico
Dopo l'impiego lavare accuratamente la pompa ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione del prodotto prima del loro riutilizzo

ATTENZIONE
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

MONSANTO ITALIANA S.p.A
Via M. Gioia 8 - MILANO

Registrazione Ministero Sanità n. 5384 M

Officina di produzione
SIAPA S.p.A
Via Vittorio Veneto 3 - S. VINCENZO DI GALLIERA (BO)

DA NON VENDERSI SFUSO Volume netto l 5

(TM) Marchio Monsanto

5387

PRAKOR

FUNGICIDA PER GAROFANI E ROSA IN PIENO CAMPO

Composizione

100 g di prodotto contengono:

— **Principio attivo:** MANCOZEB puro . g 80

— **Sostanze inerti e coadiuvanti:** q.b. a . g 100

CLASSE III^a^

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Generalità

PRAKOR è un fungicida ad ampio spettro d'azione, efficace per la difesa del garofano, della rosa in pieno campo. PRAKOR si impiega appena si verificano le condizioni favorevoli alle infezioni fungine ed i trattamenti vanno ripetuti ogni 7-14 giorni in funzione delle maggiori o minori possibilità di infezione.

DOSI PER 100 LITRI D'ACQUA

Coltura	Crittogama	g/hl
Rosa	Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine	200-250
Garofano	Ruggine, Alternaria	250-300
Pioppo	Ruggine, Phyllosticta sp., Marssonina sp.	250-300

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

PRAKOR è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari, ad esclusione della poltiglia solfocalcica, permanganato di potassio e con i concimi contenenti boro.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

20124 MILANO (ITALY) - VIA VITTOR PISANI, 26
TELEFONO (02) 62.581 / 65.87.946 - TELEX 310510

Prodotto da:
ROHM AND HAAS ITALIA S.p.A. - MILANO
Stabilimento di MOZZANICA (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 5387 del 14.9.83
DA NON VENDERSI SFUSO
Peso Netto Kg. 5

5389

Natura dei rischi di intossicazione: avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici: intossicazione acuta: lavanda gastrica, abbondante somministrazione di purganti salini (25 g. di solfato di sodio). Per la iposolubilità di questo insetticida hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari. Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina e l'efedrina.

TETRAF P.B.

Ovicida, larvicida selettivo contro uova, ninfe del ragno rosso e di tutti gli Acari in genere

Composizione riferita a g. 100 di prodotto:

— Tetradifon puro	g. 20
— Coadiuvanti	q.b. a g. 100
Contiene: Xilolo	

CLASSE III

ATTENZIONE

Manipolare con prudenza

CHEMIA S.p.A.

Prodotto nello stabilimento CHEMIA s.p.a. di S. Agostino (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Reg. n. 5389 del 4.7.83 del Ministero della Sanità.

Peso Kg. 0,250

Il TETRAF P.B. è un ovicida larvicida selettivo efficace contemporaneamente contro le larve e uova primaverili-estive degli acari.

Il TETRAF P.B. assicura quindi una prolungata azione ovalarvicida e, in virtù del suo potere penetrante, assicura la distruzione delle uova e delle larve sulle lamine fogliari opposte a quelle trattate.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il TETRAF P.B. si aggiunge, nella dose occorrente, a poca acqua, si agita con cura e si versa il tutto nella rimanente acqua sino a raggiungere la concentrazione voluta.
Il TETRAF P.B. si impiega normalmente alla dose di cc. 60 - 100 per 100 litri di acqua, ricorrendo a dosi più elevate qualora si desideri una azione più persistente o si debbano combattere forti infestazioni in atto, sulle seguenti colture: melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, mandorlo, nocciolo, vite, limone, mandarino, arancio, mandarancio, pompelmo, olivo, pomodoro, bietola, zucca, melone, cetriolo, cocomero, peperone. Rosa, garofano, gladiolo, ciclamino, ortensia, tulipano in pieno campo o in serra.
Per l'elevato effetto iniziale e per la lunga, persistente azione residua, il TETRAF P.B. si può usare in qualsiasi fase di attacco degli acari.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: il TETRAF P.B. è compatibile con tutti i prodotti tranne i clorobenzilati e quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **15 giorni**.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5390

AGER DIURON

Erbicida a base di Diuron in polvere bagnabile

DIURON puro	gr. 80
Inerti adesivanti e bagnati q.b. a	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

AVVERTENZA: L'AGER DIURON con un contatto prolungato può procurare irritazioni alle mucose ed agli occhi. Ove ciò avvenisse lavarsi abbondantemente con acqua pura.

L'AGER DIURON combatte le erbe annuali ed alcune perenni allo stadio di piantula come: Digitaria, Coda di Volpe, Portulaca, Stellaria, Senape, Chenopodio, Giavone, Amaranto, Ambrosia, Capsella, Brassica, Setaria, Urtica, Galinsoga, Papavero, Avena, Ranuncolo, Loglio, Camomilla.
E' consigliato per il diserbo selettivo della Vite, Melo, Pero, Olivo, Agrumi, Erba Medica, Menta, Asparago, piante a bulbo, Gladiolo. Agisce per assorbimento radicale ed i suoi effetti sono lenti ad apparire manifestandosi quando il prodotto è venuto a contatto con l'apparato radicale delle infestanti da eliminare.

MODALITA' D'IMPIEGO

I trattamenti devono essere effettuati su terreno ben lavorato, senza zolle, prima dello sviluppo delle infestanti. E' necessario che pioggie o irrigazioni intervengano dopo l'applicazione per favorire la penetrazione del prodotto nel terreno. Non lavorare il terreno trattato per non annullare l'effetto di erbicida. Si raccomanda di:
a) applicare esattamente le dosi riferite ad ettaro, distribuendo uniformemente il prodotto. Utile una prova in bianco con acqua
b) usare un getto non troppo polverizzato
c) tenere la miscela in agitazione per evitare la sedimentazione del prodotto

Vite, Melo, Pero, Olivo: Dosi: Kg. 3-5 per ettaro in 800-1000 lt. d'acqua nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. Se necessario, effettuare 2 trattamenti, in autunno e in primavera non superando i Kg. 5/ha per anno. Su nuovi impianti Kg. 2-3 per ettaro.

Erba Medica, Menta Piperita: Dosi: Kg. 2 per ettaro in 600-800 lt. d'acqua, prima della ripresa vegetativa della medica, prima della emergenza della menta. Non effettuare il trattamento nel primo anno d'impianto per la medica e in terreni molto sabbiosi e leggeri per entrambe le colture.

Asparago. Sui nuovi impianti. Dosi: Kg. 0,5-1 per ettaro in 600-800 lt. d'acqua rispettivamente su terreni leggeri e pesanti prima della emissione dei turioni e dello sviluppo delle infestanti.

Gladiolo in pieno campo. Dosi: Kg. 1-1½ per ettaro in 400-600 lt. d'acqua prima della emergenza della pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': dato il particolare uso il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta; evitare di contaminare acqua di irrigazione o di scolo. Lavare accuratamente il macchinario usato per la distribuzione del prodotto.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON VENDERSI SFUSO

Officina di Produzione: ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MS)

AGER CHEMICAL s.r.l.

Via Nomentana, 299 - ROMA

Registrazione n. 5330 del 4 7 83 del Ministero della Sanità

5403

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

LAIFAL CF 125[(R)]

Nanizzante per vegetazione erbacea

Liquido emulsionabile, da diluirsi in acqua, **per usi extra agricoli** (mantenimento di vegetazione a sviluppo bloccato per evitare taglio meccanico. Impiego su scarpate di strade, argini di fossi, spazi verdi spartitraffico, bordi stradali etc.).

COMPOSIZIONE

— clorflurenol * puro . . . . . g 12,1
— coadiuvanti, bagnanti, disperdenti, solventi q.b. a g 100,0

* prodotto CELAMERK, Darmstadt/FRG

(R) marchio registrato CELAMERK

LAIFAL è un marchio Shell.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Shell Agricoltura

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n 5403 del 14.7.1983

MODALITA' DI IMPIEGO

Come agisce

Il prodotto agisce sul biochimismo della pianta riducendone l'altezza per un'intera stagione vegetativa: in tal modo a seconda dell'andamento stagionale si possono evitare o ridurre il numero degli sfalci. Si ottiene anche una certa azione complementare di controllo su diverse erbe a foglia larga (dicotiledoni).

Modalità di impiego

Diluire il prodotto nel quantitativo di acqua necessaria a trattare la superficie interessata bagnando bene la vegetazione (800-1000 litri ad ettaro).

Dosi

Per ettaro LAIFAL-CF 125 . . . . . kg 15/20
oppure una miscela costituita da
LAIFAL-CF 125 . . . . kg 10/15
Idrazide maleica 30% . . . . kg. 10

Questa miscela deve essere usata in condizioni di elevata umidità e massima attività vegetativa.

Epoca

1° - all'inizio dell'autunno dopo uno sfalcio (prima quindicina di settembre) quando le erbe sono alte cm 5/10
2° - all'inizio della primavera successiva quando le erbe non sono più alte di cm 10
3° - dopo i precedenti interventi un solo trattamento autunnale è in grado di norma di mantenere la situazione sotto controllo.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

Compatibilità:

Considerato lo specifico campo di applicazione non si consigliano miscele con altri prodotti, eccetto che per quelli precisati nelle modalità di impiego.

Avvertenza: «in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici» Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non operare con vento o brezze per evitare danni alle colture vicine sensibili.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il formulato è tossico per i pesci, può essere pericoloso per il bestiame, gli animali domestici, la selvaggina e gli insetti utili.

«Attenzione: da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia lc; trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto:

5404

VERIPOL®

INSETTICIDA POLIVALENTE

Caratteristiche: insetticida ad azione per contatto e per via sistemica.

Parassiti combattuti: afidi, psilla, tortrici, larve minatrici e defogliatrici, tignole, nottue, rodilegno, eriofidi, tentredini, cleono, altica, lixus, atomaria, larve di coleotteri e ditteri fitofagi, cocciniglie, cicaline, casside.

Colture protette: vite, melo, pero, pesco, susino, arancio, mandarancio, limone, mandarino, colture ortive (patata, carciofo, fragola, bietola da costa), colture industriali di piante ornamentali e da fiore, piante forestali.

Dosi d'impiego: gr. 250-350 ogni 100 litri d'acqua.

Epoche d'impiego: alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione.

Modalità d'impiego: bagnare bene ed uniformemente le superfici vegetali da proteggere.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con Binapacryl e Diclofluanide. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per gli animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Composizione:

AZINPHOS-METILE puro		gr. 10,17
MEVINPHOS isomero-cis puro		gr. 6,60
Coformulanti	q.b. a	gr. 100,00

« contiene xilolo e cicloesanone »

I CLASSE

VELENO

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'Art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 N. 1255.

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 799.461/2
Telex VERKIM I 511046

Registrazione N.
del
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Evitare di respirarne i vapori ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle e gli occhi ● Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi ● Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone ● Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più d'un metro e cospargendo di calce viva) ● In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: *lacrimazione - miosi - scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - bradicardia - ipotensione - fibrillazioni muscolari - convulsioni - edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale, controllata od assistita, ed ossigenoterapia.* **Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.** *Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti e 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.*

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

5405

Caratteristiche: erbicida ad azione antigerminello e per assorbimento radicale.

Infestanti combattute: mono e dicotiledoni annuali quali ad esempio Giovone americano (Panicum dichotomiflorum), Digitaria (Digitaria sanguinalis), Setaria (Setaria glauca Setaria virdis), Amarantus sp., Chenopodium album, Polygonum persicaria, Poa sp., Urtica dioica, Portulaca oleracea, Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Solanum nigrum, Geranium sp., Mercurialis annua, Veronica sp., Plantago sp., Matricaria chamomilla, Euphorbia elioscopia, Fumaria officinalis, ed in parte Sorghetta (Sorghum halepense).

Colture protette: granoturco (mais).

Dosi d'impiego: dose normale d'impiego kg. 5-6/Ha. In presenza di infestazioni di Panicum dichotomiflorum e Sorghum halepense da seme kg. 6-7/Ha.

Epoche d'impiego: il prodotto si impiega in pre-emergenza della coltura.

Modalità d'impiego: distribuire il prodotto uniformemente su tutta la superficie da diserbare preventivamente ben livellata e sminuzzata. Se entro due settimane dall'applicazione non piove, occorre procedere ad una irrigazione. Le eventuali sarchiature che si rendessero necessarie dopo il trattamento debbono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno non contenente erbicida.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: è compatibile con i prodotti più comuni in uso per il mais. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: dal trattamento alla semina delle colture successive al mais occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento, 10 mesi per le altre (es. bietole, tabacco, ecc.). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi. Prima di seminare la coltura che segue il mais, arare profondamente il terreno. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MAINEX®

ERBICIDA COMPLETO PER IL MAIS

METOLACHLOR puro		gr. 27
ATRAZINA pura		gr. 19
Coformulanti	q.b. a	gr. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: liquido - pasta

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2
Telex VERKIM I 511046

Registrazione N. ...
del ...
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
SILIA S.p.A.
Via Torsapienza, 172 - ROMA
su formula e procedimento
originale della
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.

Conservare il prodotto chiuso
nel contenitore originale,
in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti ● Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sostanza nociva per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

Sintomi d'intossicazione:
Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione - dispnea - esoftalmo - trisma - spasmi muscolari.

Terapia: *sintomatica.*

VERCHIM ASTERIAS

5406

ERBAZID®

ERBICIDA SELETTIVO

IV CLASSE

Composizione:

PROPYZAMIDE puro	gr. 50
Coformulanti .	q.b. a gr. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

CARATTERISTICHE: erbicida ad azione prevalentemente per assorbimento radicale. In primavera-estate il prodotto è attivo solo in pre-emergenza delle infestanti, mentre in autunno-inverno (basse temperature, piogge frequenti) è efficace anche in post-emergenza delle malerbe e particolarmente delle graminacee.

INFESTANTI COMBATTUTE: mono e dicotiledoni annuali quali ad esempio, Alopecurus sp., Digitaria sanguinalis, Lolium sp., Poa sp., Setaria sp., Avena fatua (in pre-emergenza), Sorghum halepense (da seme) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale, anche alcune graminacee poliennali. Chenopodium album, Cuscuta sp., Papaver sp., Plantago sp., Polygonum persicaria, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Solanum nigrum, Stellaria media, Urtica sp., Veronica sp., Rumex sp (da seme). **Sono mediamente sensibili:** Amarantus sp., Capsella bursa pastoris, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapathifolium. **Restano invece resistenti:** Amarantus graecizans, Cyperus sp., Galinsoga parviflora, Matricaria chamomilla, Sonchus oleraceus.

COLTURE PROTETTE, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO:

KG. 3 -4 /Ha **per insalate:**
a) trattare in pre-emergenza delle infestanti, pre e post-semina, pre e post-trapianto con interramento
b) trattare in post-emergenza delle infestanti, solamente in autunno-inverno, con terreno umido

KG. 3 /Ha **per carciofo:** trattare in pre-emergenza delle infestanti, post-trapianto, o dopo l'ultima lavorazione

KG. 2 -2,5/Ha **per erba medica** nei trattamenti autunno-invernali, su coltura in atto

KG. 3 /Ha **per erba medica** contro la cuscuta, entro febbraio, oppure dopo il primo sfalcio (entro 3-4 giorni)

KG. 1,5-2 /Ha **per leguminose foraggere:** su colture in atto, in autunno-inverno (entro febbraio)

KG. 3 -4 /Ha **per barbabietola da zucchero contro la cuscuta:** trattare quando le piante meno sviluppate hanno raggiunto le 5-6 foglie vere ma non oltre lo stadio di 10-12 foglie vere per le più sviluppate. Usare la dose più alta quando l'infestante ha già parassitizzato la coltura. I trattamenti tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta

KG. 3 -4 /Ha **per peperone:** trattare solo su coltura trapiantata, dopo il superamento della crisi di trapianto e solo dopo la rincalzatura

KG. 3 -4 /Ha **per cipolla** contro la cuscuta: trattare dopo le 3-4 foglie vere della coltura

KG. 2,5-5 /Ha **per colture industriali di piante ornamentali arboree ed arbustive e piante forestali:** trattare nel periodo autunno-fine inverno, su piante a dimora di oltre un anno, o dopo il trapianto ad attecchimento avvenuto.

MODALITA' D'IMPIEGO: al momento dell'applicazione, è necessario che il terreno sia umido: in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il prodotto prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Applicare l'ERBAZID preferibilmente su terreno lavorato e ben sminuzzato prima della nascita delle infestanti. Poiché l'azione del prodotto è esaltata e prolungata da andamento climatico freddo e umido, nel periodo autunno-invernale è possibile controllare infestanti già sviluppate quali graminacee e Stellaria.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su bietole da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazione, ecc.). Rispettare i sottoriportati intervalli fra l'applicazione del prodotto e la successiva semina di colture sensibili.

a) **Colture moderatamente tolleranti** (mais, fragola, sorgo, patata, crucifere): due mesi.
b) **Colture mediamente sensibili** (melanzana, lino, aglio, menta, cipolle, peperone, patate, spinacio, bietola da zucchero, pomodoro): quattro mesi.
c) **Colture molto sensibili** (cereali da granella in genere - orzo, avena, frumento, segale - e graminacee foraggere): sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci. Non far pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 799.461/2 - Telex 511046

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bo)

Registrazione N.
del 14/7/83
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

5408

Caratteristiche: erbicida ad azione per assorbimento fogliare. Consente il trattamento quando l'avena selvatica è germinata tutta ed è ben visibile.

Infestanti combattute: avena selvatica, Alopecurus.

Colture protette: frumento tenero e duro a semina autunnale o primaverile.

Dosi d'impiego:
— kg. 6 /Ha in 500-600 lt. d'acqua
— kg. 7,5/Ha in 500-600 lt. d'acqua se l'infestazione di avena è molto elevata
— kg. 5 /Ha in 500-600 lt. d'acqua se l'infestazione è debole.

Epoche d'impiego: a partire dall'inizio della levata (fase del raddrizzamento) fino alla fase del secondo nodo palpabile della coltura. Il momento più opportuno per effettuare il trattamento in tale periodo coincide con la fase del primo nodo del frumento. In ogni caso trattare il frumento in fase di attiva crescita.

Modalità d'impiego: agitare la confezione prima dell'uso. Distribuire il prodotto uniformemente su tutta la superficie da diserbare.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: non miscelare il prodotto con altri erbicidi e non eseguire trattamenti antiparassitari o diserbi 8 giorni prima e dopo il trattamento con GERMIDOR. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

GERMIDOR®

ERBICIDA ANTIAVENA

III CLASSE

Composizione:

BENZOILPROP-ETILE puro		gr. 21,5
Coformulanti	q.b. a	gr. 100,0
• Contiene xilolo •		

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/62 - Telex I 511046

Registrazione N.
del 14|7|83
del Ministero della Sanità

SIPCAM S.p.A.
SALERANO SUL LAMBRO (MI)
su formula e procedimento originale della
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti ● Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta. Gravi contaminazioni possono provocare letargo, depressione generale e salivazione; se ingerito irritazione e bruciatura del cavo orale e della gola.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Togliere gli indumenti contaminati e lavare con acqua e sapone la pelle contaminata. Lasciare tranquillo il paziente. Somministrare in caso di ingestione, carbone attivato, in attesa del medico che provvederà ad una lavanda gastrica evitando l'aspirazione, o a seconda dei sintomi.

Controindicazioni: *in caso di ingestione, non provocare il vomito.*

5415

FOXENO ESCA

ESCA PRONTA ALL'USO PER IL CONTROLLO DI NOTTUE, GRILLOTALPA E GRILLI

COMPOSIZIONE

— Foxim puro . . . . gr. 1
— Attrattivi, coloranti ed eccipienti (contiene glicole etilenico) . q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti, 0,2-1 mg. per i bambini) ogni 10 minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil-solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO
L'impiego del FOXENO ESCA è consentito solo in **pre-semina** o **pre-trapianto** alla dose di:
Kg. 5-7/Ha localizzato lungo le file di semina;
Kg. 10-15/Ha su tutta la superficie da proteggere.

Insetti controllati: Agrotidi, Grillotalpa, Grilli.

Impiego nel terreno destinato a colture di: **Patata, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cavolo, Cipolla, Aglio, Rosa, Garofano, Orchidea, Tulipano, Gerbera, Dalia, Crisantemo, Anemone, Mais e Tabacco.**

"Da non applicare con mezzi aerei"

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo.

Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

"Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A.
Melilli (SR)

Officina di produzione: VISPLANT-CHIMIREN S.r.l. - Renazzo (Ferrara)

Registrazione n. 5415 del 14.7.983 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg. 0,200

5416

TRALIN

DISERBANTE DEI CEREALI

COMPOSIZIONE

— Trifluralin puro	g. 23,27
— Linuron puro . . .	. g. 11,62
— Emulsionanti e tensioattivo .	. q. b. a g. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofogei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia: per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

MODALITA' D' IMPIEGO
Il TRALIN è un diserbante selettivo dei **cereali (frumento, orzo, segale, avena)** che viene impiegato in pre-emergenza della coltura, alla dose di litri 3-4 per ettaro, con dose maggiore in previsione di altre infestazioni di malerbe ed impiegando 300-600 litri di acqua per ettaro. Il prodotto agisce impedendo sia la germinazione dei semi delle infestanti sia inibendo lo sviluppo radicale
Il TRALIN controlla le seguenti infestanti: Poa - Lolium - Agrostis - Alopecurus - Alchemilla - Anagallis - Atriplex - Capsella - Cerastium - Chenopodium - Lamium - Matricaria - Myosotis - Papavero - Polygonum Sp. - Raphanus - Sinapis - Sonchus - Stellaria - Thlaspi - Veronica - Spergula.
Sono inoltre parzialmente controllate l'Avena spp. - Galium aparine - Viola - Fumaria.
Il prodotto non deve essere interrato ed è efficace indipendentemente dal grado di umidità presente nel terreno.

ISTRUZIONI SPECIALI
Si consiglia di non impiegare il prodotto nei terreni ricchi di sostanza organica. Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, devono passare almeno 5 mesi fra l'applicazione del Trifluralin in miscela con Linuron e la seguente semina di frumento, orzo, segale, mais, sorgo e piccole graminacee foraggere, pomodoro, erba medica e trifoglio, melone, cocomero, cetriolo e zucca, insalata, tabacco, cipolla, patata, colza e cavoli, spinacio.
Non seminare bietola (da zucchero, da foraggio, da orto, ecc.) nella primavera successiva all applicazione del prodotto. La miscela non deve essere incorporata nel terreno e non deve essere applicata in terreni contenenti l'8% o più di sostanza organica, in quanto perde di efficacia.
"Da non applicare con mezzi aerei"
Compatibilità: il TRALIN deve essere impiegato da solo.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S. p. A.
Melilli (SR)

Officina di produzione: VISPLANT-CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 5416 del 14.7.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Litri 1

5417

MESTHAN - 2

INSETTICIDA FOSFORGANICO POLIVALENTE

COMPOSIZIONE

— Metilparathion puro . . . . g. 2
— Inerti . . . . q. b. a g. 100

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEI RISCHI D'INTOSSICAZIONE
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti, 0.2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il MESTHAN - 2 è un insetticida in polvere secca caratterizzato da una ottima micronizzazione che permette un controllo totale e rapido di numerosi insetti che attaccano diverse colture agricole. Trova un utile uso nelle zone povere di acqua.

Dose e settori d'impiego
Kg. 10 - 15 di MESTHAN - 2 per ogni ettaro rappresenta la quantità giusta per ricoprire uniformemente tutta la coltura da proteggere. Intervenire in presenza dei parassiti da combattere e possibilmente con le piante ricoperte di rugiada.
Per economizzare sulla spesa dei trattamenti il MESTHAN - 2 può essere convenientemente miscelato a tutti gli anticrittogamici in polvere secca.
Il MESTHAN - 2 è attivo contro:
Melo: Carpocapsa, forme mobili di Cocciniglia di S. Josè, Afide verde, A. lanigero, Tentredine, Antonomo, Uova svernanti di Afidi in genere, Cecidomia.
Pero: Psilla, Tingide, Tentredine, Cecidomia, Carpocapsa, forme mobili di Cocciniglia di S. Josè, Antonomo, Uova svernanti di Afidi in genere, Cocciniglia grigia.
Pesco, Ciliegio, Albicocco e Susino: Tentredine del susino, Tignola delle susine e albicocco, Anarsia del pesco, Tignola orientale del pesco, generazioni estive di Diaspis, Afide nero del susino e ciliegio.
Vite: Tignola e Tignoletta della vite, Tortrici, Sigaraio, Cocciniglia cotonosa, Eriofide, Pulvinaria.
Olivo: Tignola, Fleotribo, Cotonello, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Fleotripide, Mosca.
Agrumi: Cocciniglia mezzo grano di pepe, Iceria purchasi, Tripidi, Afidi e Mosca.
Pioppo: Stilpnozia, Crisomela, Cimicetta, Afidi, Punteruolo, Saperda, Tarlo - vespa.
Orticoltura - Carciofo, cipolla, aglio, porro, carota, patata, melanzana, fava, cavolo, cavolfiore, verza, crucifere: Afide nero della fava, Cavolaia e mosca del cavolo, cavolfiore, verza e crucifere in genere, Mosca del carciofo; Punteruolo del cavolo; Tripide, Mosca, Afidi, Criocera e Tignola della cipolla, aglio e porro; Mosca della carota; Dorifora della patata e melanzana; Tignola della patata.
Da non applicare con mezzi aerei
Compatibilità: Il MESTHAN - 2 è miscibile con i più comuni insetticidi ed anticrittogamici, si devono escludere i preparati a reazione alcalina, come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.a. - Melilli (SR)

Registrazione n. 5417 del 4.7.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

5418

FOLMAN

ANTICRITTOGAMICO ACUPRICO POLIVALENTE

COMPOSIZIONE

— Mancozeb puro	gr. 40
— Folpet puro	gr. 25,2
— Coadiuvanti	q. b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: L'ingestione provoca: bruciori esofagei, nausea, conati di vomito, coliche addominali, diarrea, apatia, irritazione nervosa, aritmia, cianosi, collasso cardiocircolatorio. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, fotodermatosi, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: In caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica con magnesia usta (gr 30 per litro d'acqua); il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se esistono lesioni gastroesofagee. Inoltre, digitale, purganti salini e cure sintomatiche.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Per l'irritazione della cute e delle mucose, lavaggi, pomate oftalmiche e cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: Alcool, olii, grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Viticoltura: gr. 250-300/hl acqua per trattamenti preventivi contro: Peronospora, Escoriosi, Antracnosi, Marciume nero.

Pomacee: gr. 250-300/hl acqua per prevenire attacchi di: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella.

Pomodoro solo fino alla prima fioritura: gr. 250-300/hl acqua contro Antracnosi, Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi.

Tabacco: gr. 250-300/hl acqua per trattamenti preventivi per la Peronospora

Garofano in pieno campo: gr. 250-300/hl acqua per il controllo della Ruggine.

"Da non applicare con mezzi aerei".

"Non impiegare in serra"

"Non impiegare su colture diverse da quelle indicate".

Compatibilità: Il FOLMAN è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci, eccezion fatta per quelli a reazione alcalina (Poltiglia Bordolese - Polisolfuri) e per quelli a base di Olio bianco.

Avvertenza: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con Olii minerali e Polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto è fitotossico su alcune varietà di **Pero** quali: Butirra d'Anyou, Abate Fetel, Armella, Butirra, Morettini, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Giardina, Mora, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina e Spinacarpi e su alcune varietà di **Melo** (Red Delicious - Winecap). Sui meli il prodotto non è da usarsi dopo la fioritura perchè può manifestare fitotossicità.

Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.

Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. 5418 del 4.7.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 25

5419

IDRONET - GR

DISERBANTE SELETTIVO DEL RISO
PER IL CONTROLLO DEL GIAVONE

COMPOSIZIONE

— Benthiocarb puro . . .	gr. 7
— Molinate puro	gr. 2,5
— Inerti	q. b. a gr. 100

Contiene: Glicole etilenico

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto cutaneo.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore delle colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'IDRONET - GR è un diserbante granulare per il controllo del Giavone nelle risaie. Esplica la sua azione sui germinelli e sulle plantule delle infestanti per assorbimento radicale, inoltre agisce per contatto sulle plantule fuoriuscite dal terreno. E' pure attivo nei confronti di Heteranthera spp., Heleocharis spp., Cyperus difformis ed ha azione collaterale su Alismatacee da seme.

L'applicazione dell'IDRONET - GR è consigliata dopo l'emergenza del riso direttamente in acqua su risaia ben livellata con acqua al momento del trattamento alta circa 10 cm. (nel punto più alto della risaia).

Il riso deve avere minimo una foglia e mezzo o due e il Giavone non deve aver superato lo stadio delle tre foglie. Il prodotto deve essere distribuito con il normale girello uniformemente su tutta la superficie evitando le sovrapposizioni.

La dose d'impiego varia dai 30 ai 40 Kg. per ettaro usando la dose più bassa nei terreni leggeri-sabbiosi.

Dopo il trattamento, per almeno 4 - 5 giorni, evitare di immettere acqua nuova nelle camere affinchè il prodotto possa essere fissato dai colloidi del terreno.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto può essere miscelato a insetticidi, fungicidi e concimi non alcalini impiegati nella coltura del riso.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico al riso con una sola foglia sopratutto se le pianticelle sono sommerse completamente da acqua stagnante e calda.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 5419 del 4.7.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto kg. 5

5420

MORKIT CONCIA SECCA

prodotto ad azione repellente per la protezione delle sementi di cereali ed ortaggi da danni provocati da corvi e passeracei in genere

CLASSE IV

COMPOSIZIONE

g 100 di Morkit concia secca contengono:
antrachinone puro: gr 25
inerti quanto basta a 100.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: da 300 g a 1 kg di Morkit concia secca ogni 100 kg di semente: per **cereali:** 200 g/ql; per **mais:** 600-800 g/ql; per **ortaggi:** 200-500 g/ql. **Modo d'impiego:** il Morkit concia secca deve essere miscelato alla semente prima o durante la semina.

Avvertenza: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, nè del bestiame.

Compatibilità: il Morkit concia secca può essere impiegato anche con fungicidi o insetticidi. **Avvertenza:** in questi casi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: SILIA - Società Italiana Lavorazioni Industriali Aprilia (LT)

Registrazione Ministero Sanità n. 5420 **del** 14.9.83

Conservare all'asciutto

g 100

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5421

Ridomil® Complex P

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora e l'oidio della vite.

Composizione
g 10 metalaxyl puro
g 40 propineb puro
g 1,5 triadimefon puro
coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III
ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare conro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Informazioni per il medico

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza, la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi, latte.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: CIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5421 **del** 14.9.83
® marchio registrato

Caratteristiche
RIDOMIL COMPLEX P è un fungicida specifico per la lotta combinata conro le due principali malattie della vite: peronospora ed oidio.

Dosi e modalità d'impiego
Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare la buona copertura della vegetazione (normalmente 10 hl di acqua per ha).
200 g/100 lt di acqua fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervallo di 14 giorni.
250 g/100 lt di acqua dopo l'allegagione ampliando l'intervallo fra i singoli trattamenti a 16-18 giorni.
Mantenere la cadenza di 14 giorni qualora perdurassero delle condizioni ambientali particolarmente favorevoli allo sviluppo delle malattie sopraindicate.

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Da non impiegare in serra.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici a reazione neutra di più comune impiego. « Avvertenza » In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Nocività
Il prodotto è tossico per gli insetti utili e i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

5422

TAMARON 25 P.B.

INSETTICIDA-ACARICIDA

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE

g 100 di Tamaron 25 p.b. contengono:
g 25 di methamidophos puro
bagnanti sospensivanti ed inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando.
In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua) contro afidi, larve in stadio di avanzato sviluppo di Cacoecia (Archips) podana e Capua reticulana e acari.
Drupacee: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua) contro afidi, acari, cidia e anarsia.
Viticoltura: 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) contro eulia, tignole dell'uva, cicaline e acari.
Bieticoltura: 1,5-2 kg/ha contro altica, cleono, afidi e nottue.
Fragolicoltura: 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) contro tortricidi, afidi e acari.
Pataticoltura: 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) contro afidi e dorifora.
Maiscoltura: 0,3-0,4% (300-400 g in 100 lt d'acqua) impiegando 700-800 litri d'acqua per ettaro contro la piralide.
Floricoltura in pieno campo: 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) contro tortrici, minatrici, afidi, tripidi, aleurodidi e acari.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Tamaron 25 p.b. è miscibile con i fungicidi a reazione neutra; in genere non è necessario aggiungere insetticidi o acaricidi dato il vasto campo d'azione del prodotto. Limitatamente alle pomacee il Tamaron non deve essere miscelato con altri antiparassitari. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: su peri e meli non effettuare più di un trattamento al mese e non miscelare con altri antiparassitari. Non impiegare il prodotto su varietà molto sensibili (Golden Delicious ad esempio). In floricoltura, data la molteplicità di specie e varietà coltivate, è consigliabile effettuare prove preliminari su un limitato numero di piante.
Nocività: il prodotto è tossico a insetti utili, animali domestici, bestiame e pesci.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 5422 **del** 10.10.83

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5423

Precuran® S

Diserbante di pre-emergenza per frumento e orzo

Composizione
100 g di prodotto contengono:
33 g chlortoluron puro.
17 g terbutrina pura.
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A. - Origgio (Varese)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano S/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5423 **del** 14.9.83
● marchio registrato

Caratteristiche
Agisce attraverso il terreno, per assorbimento radicale ed è dotato di una persistenza di azione sufficiente a prevenire anche le reinfestazioni tardive da parte di quelle malerbe che germinano alla fine dell'inverno.
È efficace contro infestanti sia graminacee, quali: Alopecurus, Apera, Poa, Lolium e dicotiledoni: Capsella, Cerastium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum, Raphanus, Rumex (solo se nato da seme), Stellaria.
Non controlla infestanti provenienti da organi di propagazione vegetativa quali: Convolvolo, Cirsium, Rumex, Artemisia.

Dosi ed epoche d'impiego
Kg 4-5 per ettaro, secondo la natura del terreno, riservando le dosi più alte ai terreni pesanti o meglio dotati di sostanza organica. Per la distribuzione del prodotto, si utilizza un quantitativo di acqua di 400 litri o più per ettaro.
Il trattamento si effettua solo in pre-emergenza ossia subito dopo la semina o nei primi giorni successivi o comunque ancora prima che inizi l'emergenza della coltura.
Il terreno deve essere ben lavorato, sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni d'acqua. I terreni torbosi sono esclusi dal trattamento.

Avvertenze
Evitare superdosaggi e accumuli della miscela erbicida. Nei terreni trattati non deve essere effettuata la trasemina con leguminose foraggere. Si sconsiglia di effettuare il trattamento su orzi appartenenti a varietà distiche.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità - Non è prevista la miscela con altri prodotti.

Fitotossicità - Il trattamento non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli facilmente soggetti a ristagni di acqua nel periodo invernale.
Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni di sofferenza della coltura; si tratta però di fenomeni transitori che in condizioni normali scampaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

5424

FUNGILON D + BAYLETON

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro la ticchiolatura e l'oidio del melo e della rosa in pieno campo o in serra

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Fungilon D + Bayleton contengono:
g 32 di dodina pura;
g 1,5 di triadimefon puro;
sospensivanti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua) e digitale.
Controindicazioni: tutte le sostanze che favoriscono l'assorbimento come olii, grassi, latte e bevande alcooliche.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Melo: contro ticchiolatura ed oidio: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua).
N.B. Per melo le dosi si riferiscono all'impiego di 10 hl di sospensione per ettaro.
Rosa in pieno campo o in serra: contro ticchiolatura ed oidio: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua).
N.B. Usare la dose più elevata nei casi di maggiore sensibilità varietale, in zone particolarmente soggette agli attacchi di oidio, e nei casi in cui gli intervalli tra i trattamenti siano superiori agli 8-10 giorni.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Fungilon D + Bayleton può essere miscelato con fungicidi e insetticidi a reazione neutra. Non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività. Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0 °C.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.
Nocività: il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.
Avvertenze: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 20 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nei modi e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 5424 del 14.9.83

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg. 25

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5425

TIOSIP(R)

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa della Vite.
Si impiega in trattamenti liquidi per la lotta contro l'Oidio o Mal bianco.

COMPOSIZIONE

– Fenarimol puro	g	0,5
– Zolfo puro (selenio assente)	g	72
– Coadiuvanti,Inerti:quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE IV

Registrazione n. 5425 del ....Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche :

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA'DI IMPIEGO

Il prodotto è un antioidico specifico ad azione multipla: endoterapica e protettiva.

Malattie combattute: Oidio (Uncinula necator)

Colture protette : Vite

Dosi di impiego: g 100-150 ogni 100 litri di acqua. Usare la dose più bassa durante i periodi con temperature elevate.

Epoche d'impiego: il prodotto deve essere usato a scopo essenzialmente preventivo fino dalle prime fasi vegetative. Ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni, fino a quando persiste il rischio di infezione.

Preparazione della poltiglia: stemperare la dose prescritta di prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua e mescolare energicamente. Distribuire uniformemente il prodotto su tutta la superficie vegetale da proteggere.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile in miscela con gli antiparassitari di uso primaverile-estivo, eccezione fatta per le miscele alcaline (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, Captano, DDVP, Binapacril, Diclofluanide. Inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: il prodotto può arrecare danno alla vite "Sangiovese".
Nel caso di miscela con principi attivi con i quali il prodotto è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'eventuale impiego degli olii minerali. Non effettuare i trattamenti in estate nelle ore più calde del giorno.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5426

LIMESCA 5

Esca pronta all'uso per lumache e lumacee.

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

Metaldeide acetica pura .	gr. 5
Sostanze attraenti q.b. a .	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), shock, midriasi, ipoformia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.

Consigli terapeutici: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) riscaldare il paziente, cardiotonici, fleboclisi clorurate e glucosate con noradrenalina, diuretici, barbiturici, neuroplegici, anfetamina e derivati in caso di torpore.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Il LIMESCA 5 è un'esca a base di Metaldeide acetica che agisce per ingestione.
Il LIMESCA 5 è indicato nella lotta contro tutte le specie di lumache che infestano i campi e le serre.
Si impiega preferibilmente di sera, dopo una pioggia o una buona irrigazione, spargendo sulla superficie una quantità di LIMESCA 5 di Kg. 10-15/Ha.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il LIMESCA 5 non è compatibile con altri antiparassitari.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Intervallo al consumo: osservare un intervallo di 20 giorni tra l'ultimo trattamento e il raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Biolchim

Biolchim s.r.l.
Via S. Carlo, 2130
40059 MEDICINA (BO)
Tel. (051) 850.150
Telex 222054 GZARCH I

Officina di produzione:
SARIAF S.p.A. - Via S. Silvestro, 1 - 48018 FAENZA (RA)

Reg. Ministero Sanità n. 5426 del ....

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. 0,500

5427

PREGRANIL®

Diserbante selettivo, liquido emulsionabile, per il controllo in pre-emergenza di infestanti graminacee e dicotiledoni in alcune colture di cereali a semina invernale.

COMPOSIZIONE

· Trifluralin puro	g	15
· Neburon puro	g	30
· Coadiuvanti,Solventi:quanto basta a	g	100
· contiene Xilolo ·		

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 5427 del .... Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Infestanti controllate:

Graminacee annuali: Alopecurus agrestis, Alopecurus myosuroides, Alopecurus pratensis, Apera spica-venti, Briza minor, Lolium multiflorum, Poa annua, Poa spp.

Dicotiledoni: Alchemilla arvensis, Anagallis arvensis, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Cerastium arvense, Fumaria officinalis, Juncus bufonius, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Lithospermum arvense, Matricaria chamomilla, Matricaria inodora, Myosotis arvensis, Myosurus minium, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Ranunculus spp., Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus asper, Specularia speculum, Stellaria media, Thlaspi arvense, Valerianella auricula, Veronica spp.

Infestanti non controllate: Avena fatua, A. ludoviciana e A. sterilis, Agropyron repens, Cirsium sp. e Tussilago farfara ed altre erbe infestanti perennanti.

Colture protette:

Frumento tenero invernale, Orzo a semina invernale, Segale a semina invernale.

Epoca di impiego:
Il prodotto deve essere usato dopo la semina e prima dell'emergenza della coltura trattata.

Sistema di distribuzione:
Il prodotto deve essere distribuito per irrorazione e **non deve essere incorporato nel terreno.**

Dose d'impiego: 5-6 litri per ettaro per ogni tipo di terreno.

Preparazione della poltiglia: usare il prodotto in 200-800 litri di acqua per ha; il prodotto deve essere aggiunto nella botte riempita a metà acqua ed agitato bene durante il completamento del riempimento. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare una qualsiasi attrezzatura irrorante a bassa pressione (1,5-3,0 atm) provvista di spruzzatori per erbicidi ed una pompa di capacità adeguata ad assicurare una buona agitazione durante l'irroramento.
Un'efficiente valvola di chiusura deve essere usata per impedire l'eccessiva fuoriuscita del prodotto quando l'attrezzatura parte, gira o si ferma. Gli spruzzatori devono essere accuratamente calibrati prima di iniziare le operazioni e poi controllati di frequente per essere certi che il prodotto venga distribuito uniformemente.

Preparazione del terreno: Per ottenere i migliori risultati il letto di semina deve essere ben preparato, eliminando le zolle grosse, e tutti i semi devono essere ricoperti dal terreno per assicurare una germinazione uniforme.

Avvertenze: Qualora fosse necessaria una ricoltivazione, non devono essere seminati per 5 mesi dopo l'applicazione del prodotto cereali a semina invernale o primaverile, grano, colture erbacee o colza a semina primaverile.
Non seminare barbabietola in primavera dopo l'applicazione del prodotto. Se fosse necessaria una ricoltivazione, colture quali le carote, il lino, le lenticchie, i piselli o il girasole possono essere coltivate senza nessun rischio 5 mesi dopo l'applicazione del prodotto.
Il prodotto non deve essere usato come erbicida da incorporare nel terreno. Il prodotto non deve essere usato nei terreni con contenuto di sostanza organica superiore all'8 %.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: non sono stati rilevati problemi di incompatibilità con altri prodotti antiparassitari, ma non tutte le possibili combinazioni sono state provate.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto è risultato selettivo verso le principali varietà di grano tenero invernale, orzo invernale e segale invernale indipendentemente dal tipo di terreno. Comunque, non tutte le varietà sono state sperimentate. Non ripetere il trattamento sulle colture prima di 6 mesi.
Avvertenze: evitare il congelamento del preparato. Evitare temperature estreme, conservare il prodotto in locali a temperatura oltre i 5 °C. Non conservare presso sorgenti di calore o fuoco.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti:ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventualidanni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg. 1**

5428

FENASIP (R) COMBI (già FENAZOL)

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa della vite e del melo.

Si impiega in trattamenti liquidi per la lotta contro l'Oidio o Mal bianco della vite e del melo e contro la Ticchiolatura del melo.

COMPOSIZIONE

– Fenarimol puro	g	1,8
– Zolfo puro (selenio assente)	g	50
– Coadiuvanti, Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE IV

Registrazione n. 5428 del 4/7/1983 Ministero della Sanità

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un antioidico specifico ad azione multipla: endoterapica e protettiva.

Malattie combattute: Oidio o Mal bianco della vite, Oidio e Ticchiolatura del melo.

Dosi ed epoche di impiego:

Vite da vino: impiegare a 7-14 giorni di intervallo fra i trattamenti alla dose di 100 g per ogni 100 litri di acqua fino alla sfioritura dopo di che aumentare fino a 200 g.

Vite da tavola: impiegare a 7-10 giorni d'intervallo fra i trattamenti alla dose di 100 g per ogni 100 litri di acqua fino alla sfioritura dopo di che aumentare a 200 g.

Melo: impiegare a 7-10 giorni d'intervallo fra i trattamenti alla dose di 150-200 g per ogni 100 litri di acqua. Il prodotto esercita anche una buona attività antiticchiolatura e può essere utilmente miscelato con altri fungicidi anti-ticchiolatura (es. Mancozeb, Dodina, Clorotalonil).

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile in miscela con gli antiparassitari di uso primaverile-estivo, eccezione fatta per le miscele alcaline (Polisolfuri, Poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, Captano, DDVP, Binapacril, Diclofluanide. Inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Melo:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Vite: varietà "Sangiovese".
Nel caso di miscela con principi attivi con i quali il prodotto è compatibile, fare attenzione alle eventuali controindicazioni riportate nelle etichette dei prodotti con i quali si è fatta la miscela. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'eventuale impiego degli olii minerali. Non effettuare i trattamenti in estate nelle ore più calde del giorno.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg. 1**

5429

GASTROCID®

Esca per la lotta contro gli insetti terricoli (Agrotidi, Grillotalpa, Grilli, Nottuidi) e contro le Lumache e le Limacce che infestano Pomacee, Vite, Ortaggi (Cavoli e Solanacee), Barbabietola da zucchero, Patate, Colture floreali ed ornamentali in pieno campo.

COMPOSIZIONE

– Metiocarb puro	g	4
– Coadiuvanti,Coloranti,Inerti:quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 5429 del 14/7/83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione,tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega nella lotta contro insetti del terreno, lumache e limacce che infestano le colture orticole (cavoli, solanacee), frutticole (pomacee), vite, barbabietola da zucchero, patata, colture floreali ed ornamentali in pieno campo.

Il prodotto in formulazione granulare si distribuisce tal quale a spaglio in maniera uniforme sulla superficie da trattare alla dose di 3-5 Kg/ha a seconda del grado d'infestazione. Per la lotta specifica contro le Agrotidi si consiglia di aumentare la dose a 5-7 Kg/ha. Il prodotto può anche essere applicato localizzato lungo la fila per cui la dose ad ettaro deve essere opportunamente variata in ragione della superficie effettivamente trattata.
Inoltre per evitare comunque nuove infestazioni dall'esterno è opportuno distribuire il prodotto lungo i bordi del campo per una larghezza di 1-2 metri.
Il prodotto può essere applicato sia alla semina, sia in copertura. In quest'ultimo caso è possibile anche la lotta alle Agrotidi, Grillotalpa, Grilli ed altri insetti, oltre alle lumache e limacce.

Da non impiegare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento ed evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5430

FENADIN (R)

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa del melo e del pero.

Si impiega in trattamenti liquidi contro la ticchiolatura e oidio del melo e contro la ticchiolatura del pero.

COMPOSIZIONE

- Fenarimol puro	g	4
- Dodina pura	g	36
- Coadiuvanti ed Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 5430 del 19/7/83 Ministero della Sanità

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Durante la manipolazione e l'impiego del prodotto usare guanti, maschere ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto stesso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: azione irritante sul tratto gastro intestinale con dolori addominali, dolori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:

Lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega contro le crittogame e alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua irrorati con pompe a volume normale.

Ticchiolatura ed Oidio del melo: usare una dose di **100-120 g** in trattamenti distanziati ad opportuni intervalli pre-florali e post-florali.
Ticchiolatura del pero: usare una dose di **80-100 g**

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0° C.

Attenzione: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: per la Golden Delicious può essere fitotossico a dose superiore allo 0,05%.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per le api, animali domestici, pesci e bestiame.

Avvertenze: da non impiegare durante la fioritura.
Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 21 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5431

ORTHENE(R) COMBI

Insetticida-aficida in formulazione liquida emulsionabile per la difesa di colture frutticole, orticole, floricole, ornamentali, tabacco, barbabietola da zucchero, vite e vivai di colture arboree.
Si impiega in trattamenti liquidi per la lotta contro Afidi, Aleurodidi, Mosche bianche, Tripidi, Psillidi, Tignole, Tortrici, Nottuidi, Adulti di Maggiolino o di Oziorrinco, larve di Cocciniglie, Mosche minatrici.

COMPOSIZIONE

– Acefate puro	g	20
– Permetrina pura	g	4
– Coadiuvanti, solventi: quanto basta a	g	100
· contiene Cloruro di metilene		

(R) Marchio registrato Chevron Chem. Co. USA

SIPCAM · Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano · SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 5431 del 16/7/83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

Sintomi d'intossicazione:

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

In caso di evidente iposssia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE

Il prodotto possiede un'azione pronta e persistente contro un gran numero di insetti parassiti, contro cui agisce per contatto e per ingestione..

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi indicate distribuite con pompe a volume normale contro gli insetti delle seguenti colture:

FRUTTIFERI:

MELO e PERO: Afidi, Psillidi, Tortrici, Minatori delle Pomacee, Bombice antico del Melo (Orgya antigua), Ricamatrici della frutta (Cacoecia, Capua, Eulia, Pandemis), Carpocapsa: **150-200 g.**

DRUPACEE (Pesco, Ciliegio, Albicocco, Susino): Afidi, Anarsia e Cydia del Pesco: **150-200 g**

VITE: contro Tignola, Cicaline, Nottue, Oziorrinco: **150-200 g**

AGRUMI: contro Afidi, Mosca: **150-200 g**; contro larve di Cocciniglie: **200-300 g.**

OLIVO: contro Mosca e Tignola: **150-200 g**: contro larve di Cocciniglie: **200-300 g.**

ORTAGGI: contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Nottue delle colture orticole (Cavoli, Cavolfiore, Verza, Lattuga, Spinacio, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Zucca, Zucchino, Cetriolo, Carota, Porro), Cavolaie: **150-200 g.**

COLTURE ERBACEE: contro Afide verde della **Patata**, Afidi, Mosca, Nottuidi e Mamestra della **Barbabietola da zucchero**, Afide verde del **Tabacco: 1,5-2 Kg/ha.**
Piralide e Nottue del **Mais: 2-2,5 Kg/ha.**

Adulti di Maggiolino che infestano le colture orticole, erbacee ed arboree sopraindicate e adulti di Oziorrinco della Vite, dell'Olivo e delle colture ornamentali **2-2,5 Kg/ha.**

COLTURE FLORICOLE ED ORNAMENTALI: contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Mosche minatrici delle colture floricole ed ornamentali, Bega verde del Garofano, Bega africana del garofano, Afidi, Tripidi, Aleurodidi delle colture arboree e dei vivai forestali, sia in serra sia in pieno campo: **150-200 g/hl.**
Contro larve di Cocciniglie delle colture floreali ed ornamentali, sia in serra sia in pieno campo: **200-300 g/hl.**

Iniziare i trattamenti alla prima comparsa degli insetti e ripeterli ad opportuni intervalli secondo l'intensità dello sviluppo dell'infestazione.

Preparazione della poltiglia: Diluire il prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua mescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con le più comuni poltiglie antiparassitarie di impiego primaverile-estivo, escluse quelle alcaline come Poltiglia bordolese e Polisolfuri.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: dato l'elevato numero di varietà frutticole, orticole, floricole ed ornamentali si consiglia un trattamento su piccola scala prima di passare a superfici più ampie. Comunque si consiglia in particolare di interrompere gli interventi su Pesco nei mesi estivi e di eseguire preventivamente dei saggi varietali su piccola scala nel periodo antecedente all'indurimento del nocciolo, per accertare eventuali sensibilità varietali.

Rischi di nocività: non impiegare il prodotto in fioritura, perchè è tossico per le api. Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta sulle colture indicate, ad eccezione delle pomacee ed olivo per le quali va rispettato un periodo di 30 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg. 1**

5432

ETOXIN

PER PREVENIRE IL RISCALDO DELLE MELE

COMPOSIZIONE

— Etossichina pura . . . gr. 70
— Coformulanti . . q. b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ETOXIN è un antiossidante indicato per prevenire il riscaldo molle o primavera delle mele che si manifesta durante la conservazione. Viene consigliato per le cultivar: Abbondanza e Belfort, Commercio, Granny Smith Golden Delicious, Lavina, Rome Beauty, Imperatore o Morgenduft, Stayman, Stark Delicious, Starking, Renetta del Canadà, Winesap, Winter Winesap.

Melo: ml 325 per q.le acqua per **trattamenti pre - raccolta.** Intervenire non oltre 2 giorni prima della raccolta, possibilmente verso sera. In **post - raccolta** intervenire entro otto giorni dalla raccolta, applicando l'ETOXIN su mele sfuse o in contenitori, diluendo l'ETOXIN con acqua in ragione di ml 140/q.le acqua per mele Golden Delicious e di ml 225/q.le acqua per le altre varietà di mele.

LE MELE TRATTATE IN PRE - RACCOLTA NON DEVONO ESSERE TRATTATE IN POST - RACCOLTA

Bagnare uniformemente tutta la merce da conservare lasciandola per circa 15 - 20 secondi a contatto con la soluzione pre - formata. Prima di stivare le mele trattate nelle celle frigorifere, attendere che si asciughino completamente.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: il prodotto è miscibile a tutti i benzimidazolici ed i tiofanati in commercio solo se l'impiego avviene in pieno campo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Avvertenza: la soluzione eccedente dei trattamenti, prima di essere scaricata nelle vasche, dovrà essere opportunamente trattata per la depurazione o diluita (es. 1 : 100)

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo devono trascorrere non meno di 90 giorni, di cui almeno l'ultima settimana fuori frigorifero a temperatura ambiente ed in locale arieggiato e luminoso.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.

Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. [illegible] del 4. 11. 83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. 20

5433

ETIL - PARENIL 20-E

INSETTICIDA FOSFORGANICO POLIVALENTE

Composizione:

— Parathion puro . . . . gr. 19,4
— Solventi, emulsionanti (contiene Xilolo) q.b. a gr. 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad esempio interrando in fosse profonde un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti, 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITÀ D'IMPIEGO

L'ETIL - PARENIL 20 E è un insetticida che agisce per contatto ed ingestione ed asfissia, nei confronti di diversi insetti che attaccano le colture agricole. Penetra rapidamente all'interno dei vegetali trattati (citotropismo) controllando uova, larve ed adulti. È dotato di una elevata prontezza d'azione e di una notevole persistenza. Non trasmette né odori né sapori sgradevoli alle colture trattate.

Viene impiegato alla dose di gr. 250-300 ogni 100 litri di acqua contro i seguenti parassiti:

Agrumi: cocciniglia mezzo grano di pepe, C. cotonosa, C. bianca, C. bianco rossa, C. a virgola, Iceria, Ceroplaste, Tripide, Mosca della frutta.

Drupacee: uova di Afidi, larve e crisalidi di Tentredine, Cocciniglie, Mosca delle ciliegie, Tignola orientale del pesco, Anarsia, Larve ricamatrici.

Pomacee: Antonomo, Carpocapsa, uova di Afidi, larve e crisalidi di Tentredine, Cocciniglia di S. Josè, Cecidomia, Tingide del pero, Afide lanigero, Cocciniglie.

Olivo: Fleotripide, Cotonello, Rinchite, Fleotribo, Tignola, Saissetia oleae, Cotonello, Mosca.

Pioppo: Stilpnotia, Crisomela, Crittorinco, Saperda, Afide lanigero.

Vite: Tignola, Tignoletta, Cicaline, Sigaraio, Cocciniglia cotonosa.

Riso: Coppetta, Chironomi.

Colture floreali in pieno campo: Tripidi, Tentredini, Afidi, Mosca e Bega del Garofano.

Cavoli e Cucurbitacee in genere: Afide ceroso, Cavolaia, Agrotidi.

Fagiolo, Fagiolino, Pisello: Afide nero.

Barbabietola da zucchero: Mosca, Nottue, Afide nero.

Grano e cereali minori: Afide verde, Contarinia, Criocera, Cimice.

Mais e Tabacco: Afidi.

« Da non applicare con mezzi aerei ».

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni insetticidi ed anticrittogamici, si devono escludere i preparati a reazione alcalina, come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 5433 del 14.7.1983 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 0,200

5434

BLEND

FUNGICIDA CUPRICO MISTO

Composizione:

— Mancozeb puro	gr. 32
— Rame metallo puro (da Ossicloruro tetraramico)	gr. 15
— Bagnanti, disperdenti, inerti, coloranti	q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEI RISCHI D'INTOSSICAZIONE

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento, proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione: provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione; purganti salini, cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il BLEND è un anticrittogamico finemente micronizzato a base di Mancozeb e ossicloruro di Cu dotato di ampio spettro di azione, di buona persistenza, adesività e resistenza al dilavamento. Il BLEND controlla:

Vite: contro la Peronospora, Escoriosi, Antracnosi e in parte contro il Marciume a gr. 250-350 per q.le acqua.

Pomacee: contro la Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria e Glomerella a gr. 300 per q.le acqua.

Pomodoro solo fino alla prima fioritura: contro Antracnosi, Peronospora, Alternariosi, Cladosporiosi a gr. 250-350 per q.le acqua.

« Da non applicare con mezzi aerei ».

Divieto d'impiego in serra.

Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: il BLEND è compatibi` con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità - varietà sensibili al BLEND:

Pero: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Melo: Abbondanza, Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.

Le varietà sopraelencate sono sensibili sia al Mancozeb che al Rame ossicloruro e il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Non si deve trattare durante la fioritura.

Nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 5434 del 14/7/83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 25

5435

DERVAN L

Diserbante liquido ad azione totale

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Clorato di sodio puro	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

PRECAUZIONI

Evitare di mettere il DERVAN L a contatto con materiale combustibile, tenendo inoltre conto delle seguenti norme:

- *durante l'impiego non fumare nè avvicinarsi ad una fiamma o ad una fonte di calore;*
- *utilizzare materiale metallico o in materia plastica, evitando di ricorrere a recipienti di legno;*
- *ripulire accuratamente con semplice acqua gli attrezzi che sono serviti all'esecuzione del trattamento.*

Avvertenza: *il DERVAN L deve essere conservato negli imballi originali, in luogo asciutto e lontano da acidi e prodotti infiammabili.*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella PO (Rovigo)

Registrazione n. 5435 del Ministero della Sanità del 14/7/83

CARATTERISTICHE

Il DERVAN L agisce contro tutte le erbe infestanti che crescono lungo i viali, i margini stradali, le sedi ferroviarie e tranviarie, nelle aree industriali e civili (cortili, cimiteri, campi sportivi).
Il DERVAN L esplica un'azione erbicida pronta ed energica per via fogliare e radicale: le piante irrorate avvizziscono ed ingialliscono, finendo con l'essicare in brevissimo tempo. Anche le radici più profonde sono attaccate ed il diserbo risulta così completo e duraturo.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Il DERVAN L si impiega alla dose di 2-4 kg/100 mq in 100 litri di acqua, secondo la natura e la vigoria delle erbe da distruggere; le dosi più alte sono necessarie per eliminare infestanti perenni con radici molto profonde (es. gramigna).
Il DERVAN L si impiega diluito in acqua irrorando la soluzione sul terreno da diserbare mediante l'uso di qualsiasi pompa irroratrice o ricorrendo semplicemente ad un comune innaffiatoio, avendo cura di impiegare non meno di 0,5 - 1 litro di poltiglia per mq (50-100 hl/ha); meglio se il trattamento viene fatto seguire da un abbondante irrigazione. Le stagioni più propizie per il diserbo con il DERVAN L sono la primavera e l'autunno.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il DERVAN L va sempre usato da solo.

FITOTOSSICITÀ

Il DERVAN L è fitotossico, quindi va distribuito solo sulle piante da distruggere. Evitare il contatto con colture di qualsiasi genere anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Attenzione: da impiegare in assenza di colture agricole esclusivamente per gli scopi sopra indicati; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 10

5436

SIMAZINA CAFFARO

Diserbante in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

Simazina puro	g 50
Coformulanti	q.b. a g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5436 del 14.7.1983

CARATTERISTICHE

La SIMAZINA CAFFARO è un diserbante che agisce per assorbimento radicale contro molte infestanti annuali quali Coda di Volpe, Giavoni, Digitaria, Camomilla, Ortica, Veronica, Papavero, Rafano, Geranium, Stellaria, Porcellana, Erigeron, Persicaria, Borsa del Pastore.
Il prodotto possiede una selettività prevalentemente di tipo stratigrafico, in quanto si fissa nei primi strati di terreno normalmente non interessati dalle radici delle piante coltivate e la sua azione è persistente.
Perchè tale azione si esplichi al meglio è consigliabile evitare le lavorazioni profonde mentre sono utili quelle superficiali specialmente se al trattamento segue un periodo di siccità. Poichè il prodotto agisce per assorbimento radicale, l'azione è più rapida se al trattamento segue una pioggia o una irrigazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

La SIMAZINA CAFFARO si impiega in sospensioni acquose stemperando la dose stabilita in poca acqua e portando a volume desiderato.
La SIMAZINA CAFFARO va distribuita con pompe irroratrici curando l'uniforme spargimento con 600-1000 litri di acqua per ettaro.

— Melo, pero, pesco, vigneti, agrumeti, oliveti	kg 5-7 /ha
— Asparago e carciofo	kg 4-5 /ha
— Rose, vivai di piante legnose e di vite americana	kg 2-4 /ha
— Diserbo totale di aree non coltivate	kg 10-20/ha
— Diserbo di fossi e canali	kg 10 /ha
— Disebo degli argini di risaie	kg 2-3 /ha

N.B. Nei terreni ricchi di sostanza organica impiegare le dosi più alte.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

La SIMAZINA CAFFARO è miscibile con la maggior parte degli erbicidi.
Si consiglia la miscela con Dissecante Caffaro nei trattamenti su infestanti già sviluppate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.
Da impiegare solo su colture specializzate.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO kg 10

5437

NOTARET®

FUNGICIDA A VASTO SPETTRO D'AZIONE

IV CLASSE

Caratteristiche: anticrittogamico ad azione preventiva.

Malattie combattute: Peronospora, Botrytis, Vaiolatura, Alternariosi, Antracnosi, Septoriosi, Ticchiolatura, Bolla, Cancri dei rami, Coryneo, Moniliosi, Cladosporiosi, Mal dell'esca

COLTURE PROTETTE E DOSI D'IMPIEGO: ogni 100 litri d'acqua:

— **gr. 200-300 per olivo**
— **gr. 200-300 per vite**
— **gr. 200-250 per pomacee**
— **gr. 200-250 per drupacee**
— **gr. 200-300 per agrumi**
— **gr. 200-250/q.le di seme per concia cereali**
— **gr. 200-300 per leguminose da granella**
— **gr. 200-300 per colture ortive** (patata, pomodoro, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucca, zucchino, lattuga, carota, sedano, fagiolo, cipolla, spinacio, fragola
— **gr. 150-250 per colture industriali di piante ornamentali e da fiore**
— **gr. 250-350 per piante forestali** (pioppo)
— **gr. 700-1000 per disinfezione bulbi, tuberi e barbatelle**

Epoche d'impiego: usare il prodotto a scopo preventivo, secondo il calendario d'incubazione delle malattie. Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 GIORNI prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Modalità d'impiego: distribuire il prodotto uniformemente su tutte le superfici vegetali da proteggere onde assicurare una perfetta copertura delle stesse da parte del formulato.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e con gli olii minerali. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: per le pomacee attenersi scrupolosamente alle dosi consigliate: concentrazioni superiori possono provocare rugginosità sulle varietà Golden ed altre a buccia rossa; inoltre dopo la fioritura può manifestare fitotossicità. La miscela può produrre fitotossicità anche sulla varietà di pero Butirra d'Anjou sensibile al Folpet. Deve essere impiegato a distanza di almeno tre settimane dall'applicazione di olii minerali. Sulle colture da fiore più delicate, eseguire saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera coltivazione.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per i pesci e gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto: 40 GIORNI prima del raccolto delle uve da vino

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Composizione:

CLOROTALONIL puro		gr. 30
FOLPET puro		gr. 45
Coformulanti	q.b.a	gr. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79 94 61 - 79.94.62
Telex 511046

Registrazione N.
del
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
SIPCAM S.p.A.
Salerano sul Lambro (MI)
su formula e procedimento
originale della
VERCHIM ASTERIAS S.p.A

Conservare il prodotto
chiuso
nel contenitore originale.
in luogo asciutto e fresco.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi d'intossicazione: *Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea - eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie - possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.*

Terapia: *lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.*

VERCHIM ASTERIAS

5438

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

SUMICIDIN 5

Insetticida con efficacia biologica elevata anche contro forme resistenti ai comuni insetticidi fosforganici e carbammati, sotto forma di concentrato emulsionabile, ad azione rapida di contatto ed ingestione a dosi ridotte e con effetto prolungato, associando all'azione diretta un effetto repellente sugli insetti.

COMPOSIZIONE

— fenvalerate, puro . . . g 5
— coadiuvanti (emulsionanti e solventi) q.b. a g 100

CONTIENE XILOLO

SUMICIDIN è un marchio registrato della Sumitomo Chemical Co., Osaka (Giappone)

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Evitare di respirarne i vapori;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrandole in fosse profonde più di 1 metro e cospargendo con calce viva);
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione e per contatto.

Sintomi di intossicazione:
Nervosismo, ansietà, tremori e convulsioni. Depressione respiratoria e delle funzioni cardiovascolari e renali.

Consigli terapeutici:
Se ingerito provocare il vomito o provvedere con debita cautela a lavanda gastrica. Impiegare sedativi del sistema nervoso centrale quali barbiturici a rapida azione, a piccole dosi oppure benzodiazepan per via endovenosa. Sostenere opportunamente la respirazione, controllando ed aiutando le funzioni cardiovascolari e renali.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero in centro di rianimazione per attuare la terapia suddetta.

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5438 del 14.7.1983

MODALITA' DI IMPIEGO

Il modo specifico di azione per contatto ed ingestione prevede che le irrorazioni siano effettuate con cura per bagnare bene le parti vegetative della coltura infestata.

Dosi di applicazione

Colture	Parassiti combattuti	Dosi di impiego cc per 100 litri d'acqua di soluzione
Arancio	Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) Ceroplaste (Ceroplastes rusci) Aonidiella	50
Melo	Carpocapsa (Carpocapsa pomonella)	100
	Ricamatrici (Pandemis, Capua Archips, Eulia)	100 (volo adulti) 200 (dose curativa)
	Litocollete (Lithocolletis sp.)	200-400 (al momento del massimo volo)
	Cemiostoma (Leucoptera sp.)	200-400
Pero	Psilla (Psylla piri)	200 trattamenti alla fine inverno 300-400 trattamenti inizio attacco
Pesco	Tignola orientale (Cydia molesta) Mosca della frutta (Ceratitis capitata) Tripidi (Thrips spp.)	100
	Afide verde (Myzus persicae)	50

Nota - Applicazioni all'inizio dell'infestazione quando le foglie non sono accartocciate

Pioppo	Criptorrinco, Superda	300
Vite	Tignole (Lobesia botrana, Clysia ambiguella)	50 (dose all'inizio attacco)

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Diluire la quantità precisata occorrente di SUMICIDIN 5 in poca acqua, e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

IL SUMICIDIN 5 è compatibile con i normali antiparassitari usati per impieghi contro altri parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, le api e gli altri insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti
— 60 giorni, prima della raccolta degli aranci
— 30 giorni, prima della raccolta delle altre colture indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

«DA NON VENDERSI SFUSO» Contenuto:

5439

ACSIUS

Insetticida liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE:

Permetrina pura	gr. 25
Solventi ed emulsionanti	q.b. a gr. 100

CLASSE TOSSICOLOGICA: III.

ATTENZIONE: manipolare con prudenza
Sostanza pericolosa per ingestione,
per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

— conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione di elevate quantità di permetrina può causare tremore.

Trattamenti terapeutici: indurre il vomito. Trattamenti sintomatici.

MODALITA' D'IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)

L'ACSIUS esplica la sua azione prevalentemente per contatto e in minor misura per ingestione, è particolarmente attivo sui lepidotteri e la Psilla del pero.

Frutticoltura: (melo, pero, pesche, ciliegie, prugne) contro la Psilla del pero, Afidi del melo, le Ricamatrici della frutta e i Microlepidotteri minatori, gr. 40.

Viticoltura: contro le Tignole dell'uva gr. 40.

Colture ortive: (Solanacee, brassicacee, cucurbitacee, lattuga, porri, carote, spinaci, funghi) contro la Cavolaia e le Nottue del cavolo, i Trialeurodidi gr. 40.

Agrumi: contro i Dialeurodidi gr. 40.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: è incompatibile con poltiglie solfocalciche.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 5 giorni.

INTERVALLO: osservare un intervallo di 5 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta per le pere, 2 giorni per gli ortaggi, 10 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

S.C.A.M. srl MODENA
Officina di Produzione: SCAM - MODENA
Reg. Min. Sanità N. 5439 del 14.7.1983

DA NON VENDERSI SFUSO.

Peso Netto Kg. 20

SCAM MODENA
CONCIMI BIOCHIMICI
CONCIMI FOGLIARI
ANTIPARASSITARI
Stabilimento e uffici: S. MARIA DI MUGNANO - Tel. 30.91.31

5440

Fonofos Dyfonate®
5 G Stauffer

I CLASSE

VELENO

Insetticida granulare per la lotta contro gli insetti del terreno parassiti delle colture agrarie.

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
— Fonofos puro . . . . g 4,75
— Coformulanti . . . . q.b. a g 100

Stauffer ® Marchio depositato
Stauffer Chemical Company
Westport - Connecticut - U.S.A.

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato, munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1966, n° 1235.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— evitare di respirarne i vapori;
— non operare controvento;
— evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
— durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti di gomma, maschere ed occhiali protettivi;
— dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
— rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più o meno un metro, cospargendo con calce viva);
— in caso di contaminazione degli indumenti togliersi immediatamente quelli molto contaminati, lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente;
— lavare accuratamente i guanti dopo l'impiego, specialmente all'interno;
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti - 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con acqua e sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:

Morfina, teofillina, aminofillina, latte, olio e grassi.

STAUFFER CHEMICAL ITALIA S.p.A.
Sede legale:
Via Visconti di Modrone, 18 - 20122 Milano
Sede amministrativa:
20078 San Colombano al Lambro (Milano)
telefono 0371 / 89418 - 9
Codice Fiscale: 00830810156

Officina di produzione:
SIAPA
S.Vincenzo di Galliera (BO)

Reg. Ministero Sanità n. 5440 del 14.9.83

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il DYFONATE 5 G è un insetticida fosforganico efficace contro numerosi insetti che vivono nel terreno, parassiti delle colture agrarie, quali: elateridi (*Agriotes spp.*), grilli (*Gryllus spp.*), grillotalpa (*Grillotalpa grillotalpa*), larve di maggiolino (*Melolontha melolontha*), tipule (*Tipula spp.*), agrotidi (*Agrotis spp.*), oziorrinco (*Othiorrhynchus spp.*), bacherozzo (*Pentodon punctatus*), zabbro gobbo (*Zabrus tenebryoides*).
Il DYFONATE 5 G non si accumula nel terreno in quanto viene rapidamente trasformato in metaboliti non tossici.
Infatti la sua persistenza di azione, pur essendo largamente sufficiente per un efficace controllo dei parassiti, è limitata nel tempo.
Non lascia però residui dannosi nel terreno e nell'ambiente.
Inoltre non trasmette odori o sapori alle colture trattate.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

Il DYFONATE 5 G si impiega nella disinfestazione del terreno prima o all'atto della semina o del trapianto delle seguenti colture: mais, sorgo, frumento, patata, tabacco, pomodoro, barbabietola da zucchero, bietola da orto e da foraggio, erba medica, asparago, cipolla, aglio, porro, carota, cavolo e cavolfiore, sedano, finocchio, prezzemolo, carciofo, lattuga, invidia, cicoria, fagiolo, pisello, arachide, rapa, rapanello, menta e tappeti erbosi.
Le dosi di impiego sono le seguenti:

- 60-80 Kg/ha a seconda degli insetti da combattere e per i trattamenti su tutta la superficie, dopo la distribuzione da eseguirsi in maniera uniforme il prodotto deve essere incorporato al terreno con un'erpicatura o una zappatura.
- 7-15 Kg/ha per i trattamenti localizzati nel solco di semina con l'impiego di appositi microgranulari montati sulle seminatrici. Nel caso di forti infestazioni tali dosi possono essere anche raddoppiate.

Avvertenze: Nei terreni destinati a coltivazioni di carote effettuare i trattamenti 3 mesi prima della semina di tale coltura. Per cipolla, cavolo e rapanello, il prodotto deve essere impiegato solo se tali colture sono destinate alla produzione del seme.

Non effettuare il trattamento localizzato su tabacco, cavolo, rapanello e barbabietola da zucchero.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non vi è interesse pratico per l'utilizzo in miscela con altri prodotti. Tuttavia è sconsigliabile l'eventuale miscela con prodotti aventi reazione alcalina.

«**Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta».

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per il bestiame, gli animali domestici, la selvaggina, i volatili in genere, i pesci e gli insetti utili.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

«ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso».

«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato».
«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto 10 kg

5441

Caratteristiche e modalità d'impiego

Il BETANAL® KOMBI è un erbicida per le barbabietole che risulta formato da una miscela di due principi attivi: il Fenmedifam ed un suo analogo, il Desmedifam.
La presenza di quest'ultimo principio attivo permette di allargare lo spettro d'azione erbicida del prodotto ed in particolare nei confronti di quelle infestanti notoriamente resistenti al solo Fenmedifan (Amaranthus spp., Polygonum spp., Solanum nigrum). In generale comunque il BETANAL® KOMBI risulta maggiormente aggressivo nei confronti di tutte le infestanti, rispetto al prodotto contenente il solo Fenmedifam; è quindi indicato in presenza delle infestanti con predominanza di Amaranthus o quando le erbe presenti siano ad uno stadio di sviluppo a causa del quale il Fenmedifam da solo darebbe parziali risultati.

Dose d'impiego: 4-6 l/ha da distribuire in 250-300 l. di acqua/ha.

Evitare di effettuare il trattamento in giornate molto calde (25° e più) e quando la bietola sia sofferente per danni causati da insetti o gelate. Applicare il prodotto quando la bietola ha superato lo stadio cotiledonare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità. Il prodotto è miscibile con altri erbicidi che ne completino l'efficacia come TRAMAT, PYRAMIN, FERVIN e con olio bianco.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO L. 1

BETANAL® KOMBI

Erbicida di post-emergenza per la bietola da zucchero, da orto e da foraggio

Composizione su g. 100:

— **Fenmedifam puro**	g. 10,6
— **Desmedifam puro**	g. 5,3
— **Sostanze solventi, emulsionanti e coadiuvanti**	q.b. a 100

« Contiene Isoforone »

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

® Marchio registrato della Schering AG-Berlino/Bergkamen

SCHERING SpA

Divisione Agricoltura

20131 MILANO - Via Mancinelli, 7/11

Officina di NOVA MILANESE

Registrazione N. 5441 del 13/9/83 del Ministero della Sanità

Natura del rischio d'intossicazione

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatti con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Indossare occhiali, maschera e guanti durante la diluizione del prodotto in acqua.

Informazioni per il medico

Il prodotto contiene anche isoforone, che ha azione narcotica, irritante per le mucose con possibilità di danno cumulativo epatorenale.

Controindicazioni: oppiacei, sedativi e comunque farmaci depressivi del SNC

5442

Caratteristiche e modalità d'impiego

Il BETANAL® N è un erbicida per le barbabietole che risulta formato da una miscela di due principi attivi: il Fenmedifam ed un suo analogo, il Desmedifam.
La presenza di quest'ultimo principio attivo permette di allargare lo spettro d'azione erbicida del prodotto ed in particolare nei confronti di quelle infestanti notoriamente resistenti al solo Fenmedifam (Amaranthus spp., Polygonum spp. Solanum nigrum). In generale comunque il BETANAL® N risulta maggiormente aggressivo nei confronti di tutte le infestanti rispetto al prodotto contenente il solo Fenmedifan; è quindi indicato in presenza delle infestanti sopra specificate o quando le erbe presenti siano ad uno stadio di sviluppo a causa del quale il Fenmedifam da solo darebbe parziali risultati.

Dose d'impiego: 4-6 l/ha da distribuire in 250-300 l. di acqua/ha.

Evitare di effettuare il trattamento in giornate molto calde (25° e più) e quando la bietola sia sofferente per danni causati da insetti o gelate. Applicare il prodotto quando la bietola ha superato lo stadio cotiledonare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità. Il prodotto è miscibile con altri erbicidi che ne completino l'efficacia come TRAMAT, PYRAMIN, FERVIN e con olio bianco.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO L. 1

BETANAL® N

Erbicida di post-emergenza per la bietola da zucchero, da orto e da foraggio

Composizione su g. 100:

— **Fenmedifam puro**	g. 12,8
— **Desmedifam puro**	g. 3,2
— **Sostanze solventi, emulsionanti e coadiuvanti**	q.b. a 100

« Contiene Isoforone »

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

® Marchio registrato della Schering AG-Berlino/Bergkamen

SCHERING SpA

Divisione Agricoltura

20131 MILANO - Via Mancinelli, 7/11

Officina di NOVA MILANESE

Registrazione N. 5442 del 13/7/83 del Ministero della Sanità

Natura del rischio d'intossicazione

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contat con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Indossare occhiali, maschera e guanti durante la diluizione del prodotto in acqua.

Informazioni per il medico

Il prodotto contiene anche isoforone, che ha azione narcotica, irritante per le mucose con possibilità di danno cumulativo epatorenale.

Controindicazioni: oppiacei, sedativi e comunque farmaci depressivi del SNC

5443

MOLINAM[(R)] SG

Diserbante granulare per il diserbo del riso contro le varie specie di Giavone.
Il prodotto è efficace anche nei confronti dei Giavoni tardivi, date la persistenza di azione.

COMPOSIZIONE		
— Molinate puro	g	5
— Bentiocarb puro	g	2,6
— Inerti : quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 5443 del 14.9.83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanze pericolose per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (Inibitore della colinesterasi)

Sintomi d'intossicazione:

Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al Centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:

Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza del riso che abbia iniziato l'emissione della 2a foglia e presenta il suo migliore momento d'azione quando il Giavone si trova allo stadio compreso tra una e due foglie vere.
Il prodotto va distribuito accuratamente su tutta la superficie con apparecchiature adatte a distribuire formulati granulari (girello) alla dose di 40—60 Kg/ha secondo il tipo di terreno, evitando le sovrapposizioni o strisce di terreno non trattato.
Nei terreni leggeri sabbiosi impiegare le dosi più basse e nei terreni compatti le dosi più alte.
Si consiglia per 4-5 giorni dopo il trattamento di non immettere nuova acqua nelle camere affinchè il prodotto possa svolgere tutta la sua azione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto di colture sensibili vicine. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5445

AUXENE L

FITOREGOLATORE A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO IN FORMULAZIONE LIQUIDA

Composizione su 100 grammi:

Acido Gibberellico puro gr. 1,80
Coformulanti q. b. a gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

SCOPI, MODALITA', DOSI E EPOCHE DI IMPIEGO:

L'Auxene L si usa sulle colture di **Pere, Carciofi** e **Fragole** per gli scopi e le modalità qui di seguito indicate:
PERO: per favorire l'allegagione e stimolare lo sviluppo dei frutti, proteggere i fiori dalle gelate tardive, sulle seguenti varietà: Passa Crassana, Abate Fethel, Coscia, S. Maria, William, Conference, Dr. Guyot, Kaiser, alle dosi e nelle epoche di seguito indicate:
50 - 100 cc. in 100 litri di acqua all'inizio della fioritura impiegando 10 - 15 q.li di acqua per ettaro.
In caso di gelate in fioritura trattare entro 48 ore dalla gelata usando 100 - 150 cc. di Auxene L per 100 litri di acqua.
CARCIOFO: per anticipare la produzione dei capolini e ottenere un prodotto di qualità migliore con gambi più lunghi e capolini compatti e affusolati, sulle seguenti varietà: Cestellamare, Carciofo di ogni mese, Carciofo Molese, Masedu usando 50 - 100 cc. in 100 litri di acqua al momento della formazione del capolino centrale e bagnando bene tutte le piante. Il trattamento si può ripetere dopo la prima raccolta.
FRAGOLE in serra: per anticipare e aumentare il raccolto delle seguenti varietà coltivate in serra: Gorella, Pocahontas, Red Gauentlet, Gambridge Favourite, intervenire con 50 - 100 cc. di Auxene L in 100 litri di acqua, 30 giorni prima della fioritura usando 300 - 400 litri di acqua per ettaro.
Non è consigliabile impiegare l'Auxene L su colture di fragole in pieno campo, perchè l'eventuale caduta della temperatura può causare l'aborto dei fiori.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto va impiegato da solo.
ATTENZIONE: "Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso„.
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato„.
"Il rispetto delle predette istruzioni è essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali„.

TERRANALISI s. n. c.
CENTO (Fe) - Via Donizetti n. 2/a - Tel. 90.62.07
Officina di produzione: RENAZZO (Fe) - Via IV Novembre

DA NON VENDERSI SFUSO **CONTENUTO cc. 250**

Registrazione del Ministero della Sanità N. 5445 del 14.9.83

5446

MICAL PS

ANTICRITTOGAMICO IN POLVERE SECCA PER IMPIEGO SU COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO

Composizione: Gr. 100 di prodotto contengono:

— Folpet puro .		gr. 6
— Rame Metallo		gr. 10
(sotto forma di ossicloruro tetraramico)		
— Zolfo puro (esente da selenio) .	.	gr. 40
— Coformulanti	q.b. a	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *sintomi di intossicazione. Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.*
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
TERAPIA: *lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.*

MODALITA' D'IMPIEGO: il MICAL PS è un anticrittogamico con azione contro la Botritis cinerea (Muffa grigia), la peronospora, alternaria, ruggine e oidium che colpiscono le colture ornamentali e da fiore.
Il MICAL PS si impiega alla dose di 20-30 Kg. per ha.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il MICAL PS non è miscibile con antiparassitari alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), olii minerali, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Evitare di trattare nelle ore più calde potendo causare effetti fitotossici su piante sensibili.

NOCIVITA': è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di prod.: **EUROZOLFI S.p.A.** - 14ª Strada - Zona Ind. - 95030 CATANIA

Registrazione n. 5446 del 3.10.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

5447

SOFOL PS

FUNGICIDA IN POLVERE SECCA

Composizione: Gr. 100 di prodotto contengono:

— Folpet puro		gr. 10
— Zolfo puro (esente da selenio) .		gr. 50
— Coformulanti	q.b. a	gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.*
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi e aritmia.
TERAPIA: *lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.*

MODALITA' D'IMPIEGO: il SOFOL PS è un fungicida combinato con azione contro la Botrytis cinerea (Muffa grigia), Oidium, Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi che danneggiano le colture ornamentali e da fiore in pieno campo.
Il SOFOL PS si impiega alla dose di 25-30 Kg./ha.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': il SOFOL PS non è miscibile con anticrittogamici alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri), olii minerali, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluanide.

FITOTOSSICITA': non trattare a temperature superiori ai 28°C. A temperature elevate abbassare le dosi d'impiego.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA': è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di prod.: **EUROZOLFI S.p.A.** - 14ª Strada - Zona Ind. - 95030 CATANIA

Registrazione n. 5447 del 3.10.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

5448

FONOFOS VERCHIM ASTERIAS
TERFOS®

INSETTICIDA PER IL TERRENO

Composizione:
FONOFOS puro . . . gr. 4,5
Coformulanti q.b. a gr. 100,0

I CLASSE

VELENO

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del formulato, il suo impiego è consentito esclusivamente dal personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3.8.1968 N. 1255

Tipo di formulazione: granulare

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua • Evitare di respirarne i vapori • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle e gli occhi • Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi • Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone • Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva) • In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: *lacrimazione - miosi - scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - bradicardia - ipotensione - fibrillazioni muscolari - convulsioni - edema polmonare*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale, controllata od assistita, ed ossigenoterapia. **Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.** *Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti e 0,2 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.*
Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Caratteristiche: insetticida ad azione per contatto e per ingestione

Parassiti combattuti: insetti terricoli quali ad esempio: Elateridi, Maggiolino, Zabro gobbo, Agrotidi (Nottue), Grillotalpa, Grilli, Oziorrinco, Tipule, Mosche e Miriapodi terricoli.

COLTURE PROTETTE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
- **Applicazione localizzata nel solco di semina del mais:** kg. 6-8/Ha con trattamento localizzato lungo le file con microgranulatori applicati sulla seminatrice.
- **Applicazione generalizzata a pieno campo:** kg. 60-80/Ha su terreni destinati alle colture di carota, patata, tabacco; su cipolla, cavolo e ravanello impiegare il prodotto solo su colture destinate alla produzione del seme. Per l'applicazione a pieno campo, distribuire meccanicamente od a mano il prodotto nel modo più uniforme possibile su tutta la superficie. Dopo lo spargimento, è necessario incorporare l'insetticida nello strato superficiale del terreno mediante erpicatura o fresatura.

Epoche d'impiego: al momento della semina, nelle applicazioni localizzate con microgranulatori. Prima della semina o del trapianto nei trattamenti a pieno campo. Nei terreni destinati alla coltura della carota, eseguire la disinfestazione 3 mesi prima della semina

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: non è consigliabile il trattamento localizzato su tabacco, cavolo, ravanello.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg. 10**

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA (Bologna) - Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione n. del del Ministero della Sanità

5449

DORITAN

INSETTICIDA IN POLVERE BAGNABILE

Composizione: g 100 di prodotto contengono:
— CARBARYL puro (esente da B-naftolo) . g 47,5
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
Informazioni per il medico: avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consgli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Caratteristiche: il **DORITAN** è un insetticida che si impiega in pieno campo o in serra contro **Afidi** del ciclamino, delle azalee, del crisantemo, della dalia, del garofano, del geranio, del giacinto, del tulipano, del gladiolo e dell'iris, della pianta di vetro (impatiens), del pisello odoroso, della rosa, della viola del pensiero, dell'asparago ornamentale, dell'edera variegata; **Tripidi** del ciclamino, del gladiolo e dell'iris, dell'ortensia, della poinsettia, della begonia, delle felci; **Mosca bianca** del narciso, delle azalee, del geranio, della rosa, della primual, del colens, delle felci; **Cocciniglie** dell'oleandro, della poinsettia, della rosa, del colens, del croton, delle felci, dell'edera variegata, del ficus, del filodendro, della palma e delle piante grasse (euforbia, aloe, echinocactus, semprevivum, sanseveria); **Cimici** del crisantemo, dell'ortensia, della salvia splendens; **Criocera** del giglio, della viola del pensiero, dell'asparago ornamentare; **Forbicine** della dalia; **Bega verde** del garofano; **Bruchi** del giacinto; **Nottue** del gladiolo e dell'iris; **Tentredini** della rosa; **Dorifore** della salvia splendens e della viola del pensiero; **Altiche** e **Lepidotteri minatori** delle foglie della violaciocca.
Dosi e modalità d'impiego: il **DORITAN** si impiega alla dose di 180-200 g/hl d'acqua. Le dosi indicate si riferiscono ai trattamenti a volume normale. Quando si effettuano i trattamenti con pompe a volume ridotto, le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale. Per aumentare l'efficacia dei trattamenti aggiungere un adesivo bagnante. Sciogliere la giusta dose del prodotto in poca acqua ed aggiungere la rimanente quantità fino ad ottenere la concentrazione prevista.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: il **DORITAN** è compatibile con la generalità dei fitofarmaci di più comune impiego ad eccezione di quelli a reazione alcalina.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere riservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intosscazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischio di nocività: l'impiego del **DORITAN** è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci ed insetti utili. Non trattare durante la fioritura.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità 5449 del 28.12.83

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g 100**

B I M E X S . p . A .
38033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogollo, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

5450

III CLASSE

Attenzione: manipolare con prudenza

SHELLESTONE

Ormone contro la cascola non parassitaria della frutta (mele e pere).
Shellestone evita la caduta dei frutti non ancora maturi e ne migliora la qualità.

COMPOSIZIONE IN PESO

N.A.A., puro . . .	. . g 1,18
coadiuvanti, diluenti . .	q.b. a g 100

SHELLESTONE è un marchio Shell

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare altre colture, alimenti e bevande, o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Shell Agricoltura

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. .... **del** ....

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire 75 grammi di Shellestone in 100 litri d'acqua.

Non superare mai questa dose in alcun caso. L'effetto del trattamento dura circa 3 settimane. Irrorare la chioma delle piante con particolare riguardo ai piccioli dei frutti, preferibilmente 1-2 settimane prima del previsto inizio della raccolta, oppure alla caduta dei primi frutti.

Shellestone è specifico per peri e meli: operare su piccola scala prima di estendere le applicazioni.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

Il prodotto non va miscelato con altri formulati.

Intervallo di sicurezza

Sospendere il trattamento 5 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da usarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto:

5451

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

ROTIOFEN 50

INSETTICIDA LIQUIDO EMULSIONABILE

Registrazione Ministero Sanità n. 5451 **del** 14.9.83

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono

— Fenitrothion puro	g. 47.5
— Coformulanti *	q.b. a g. 100

* Contiene XILOLO

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE

Il ROTIOFEN 50 è un insetticida a largo spettro di azione che agisce per contatto e per ingestione.

E' dotato di potere citotropico (penetrazione nei tessuti vegetali senza essere traslocato con la linfa) ed è, quindi, in grado di colpire anche le forme che scavano gallerie nelle foglie, nei frutti, negli steli e nel legno.

Il ROTIOFEN 50 è indicato anche per la disinfestazione dei magazzini vuoti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Cereali (Grano, Mais, Orzo) contro: Afidi, Cimici, Lema, Ditteri cecidomidi, Piralide 100-200 g hl di acqua. Nel riso contro Chironomidi, Coppette, Hydrellia, Tipule: Kg Ha 1-1,5

Barbabietola contro: Altica, Cassida, Mosca, Cleono, Lixus, Afidi, Nottue che rodono le foglie: Kg Ha 1-2
Colture erbacee da granella, da foraggio ed ortive (Patata, Tabacco, Pomodoro, Cipolla, Cavolo, Cucurbitacee, Asparago, Carciofo, Leguminose: contro: Afidi, Altiche, Aleurodidi, Tripidi, Cimici, Dorifora, Mosche, Punteruolo, Tignole, Fitonomo, Criocera, Depressaria, Cavolaia Nottue che rodono le foglie, larve di lepidotteri in genere: 120-180 g hl d'acqua.

Fiori in pieno campo: contro Afidi, Tripidi, Aleurodidi, Cicaline, Bega del garofano, Mosche dei bulbi, Cetonie, Tentredini: 100-150 g hl

Pomacee, Drupacee, Olivo, Agrumi, Nocciolo, Piante arboree da legno ed ornamentali in pieno campo: contro Anarsia, Baco delle mele e delle pere, Mosca delle olive, della frutta e delle ciliege, Tingidi, Cocciniglie (forme mobili), Psille, Microlepidotteri, Tortricidi ricamatrici, Crisomela, Rodilegno, Larve di Lepidotteri, insetti già riportati per le colture precedenti: 150-200 g hl

Vite contro: Tignole, Cicaline, Sigaraio, Oziorrinco: 120-180 g hl

Magazzini rurali: eseguire solo trattamenti murali, in assenza di derrate alimentari impiegando Kg 1,5 di prodotto per hl di acqua e distribuendo 1 lt per ogni 10-15 mq di superficie.

Il ROTIOFEN 50 può essere versato direttamente nel serbatoio dell'irroratrice, avendo cura di mantenere l'acqua in agitazione. Si consiglia di iniziare i trattamenti al primo manifestarsi delle infestazioni.

L'aggiunta di 50 g hl del bagnante adesivo IROL aumenta l'efficacia del trattamento.

IL ROTIOFEN 50 può essere applicato anche a basso volume, purché venga distribuita un'adeguata dose di prodotto per ettaro

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. Si può miscelare con i Polisolfuri e con la Poltiglia Bordolese Industriale SIAPA, aumentando del 20% la dose, purchè la miscela venga utilizzata immediatamente. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali previst per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

CONTENUTO **LT. 10**

5452

SANDOZOLFO

Zolfo bagnabile colloidale all'87% di zolfo

Specifico contro gli oidi

Composizione

gr. 87 di zolfo puro (esente da selenio)
disperdenti e coadiuvanti quanto basta a gr. 100.

CLASSE IV

Norme precauzionali

- *Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;*
- *non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;*
- *dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.*

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità di impiego

Campi di impiego	Dosi di impiego in litri 100 di acqua
• Viticoltura	0,08 – 0,1% = gr. 80 – 100 Abbinare il SANDOZOLFO a tutti gli interventi antiperonosporici.
• Frutticoltura (pomacee)	0,08 – 0,1% = gr. 80 – 100 Nella lotta contro la Ticchiolatura unire gr. 150-200 di SANDOZOLFO agli specifici prodotti consigliati contro detta malattia: MILTOX, SANDOZIR, TIOTOX "50", Z 72, ottenendo così una poltiglia mista particolarmente attiva.
• Orticoltura (fragola)	0,08 – 0,1% = gr. 80–100
• Colture ornamentali e floreali in pieno campo	0,08 – 0,1% = gr. 80 –100 Eseguire il numero di trattamenti ritenuti necessari secondo le colture e le necessità ambientali.

In tutti i campi di applicazione, in caso di forti infezioni, elevare la dose di SANDOZOLFO di gr. 50 per ettolitro di acqua, mentre si devono sospendere i trattamenti durante le ore di grande calore e di forte insolazione e non irrorare colture che soffrono di siccità.

Preparazione della poltiglia

Versare il SANDOZOLFO direttamente nel volume di acqua stabilito, rimescolando.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità

Il SANDOZOLFO può essere usato da solo o in miscela con anticrittogamici, insetticidi e acaricidi di produzione Sandoz e, in genere, con tutti gli antiparassitari normalmente consigliati per le colture sulle quali viene utilizzato lo stesso SANDOZOLFO.
Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.
AVVERTENZA: Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
Per la preparazione delle poltiglie miste versare il SANDOZOLFO nella poltiglia antiparassitaria prescelta e già pronta all'uso, agitando bene.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.

PERE: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SANDOZ - S.p.A. MILANO

Divisione Agrochimica

Officina di produzione: PALAZZOLO MILANESE

Registrazione n. 5452 del 14.9.83 del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO **Contenuto netto kg. 30**

5453

DELTAMAN

Fungicida organico

Composizione:

MANEB puro	gr. 80
Adesivi bagnanti e sospensivanti q.b. a	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa, non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua, non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
— Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dall'umidità e dal calore
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervosa, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Modalità di impiego: Deltaman è un anticrittogamico per la lotta contro le malattie crittogame del garofano, della rosa, del pomodoro fino alla prima fioritura.
Diluire la dose in poca acqua fino ad ottenere una densa crema poi versare nel polverizzatore e aggiungere il resto dell'acqua, può essere utilizzato in qualsiasi tipo di polverizzatore.

Dosi per 100 litri di acqua:

TABACCO contro la peronospora gr. 100/200
(fino alla prima fioritura) POMODORO contro la peronospora, alternariosi, Septoria e ticchiolatura gr. 200/250
GAROFANO e ROSA in pieno campo contro Septoriosi e ruggine gr. 300/350
PIOPPO contro Marsonina gr. 300

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO DI IMPIEGO

— Divieto di impiego in serra
— Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari in polvere bagnabile. Non effettuare tuttavia i trattamenti misti durante la fioritura. Non è compatibile con il permanganato di potassio. Sono da evitare miscele con poltiglia bordolese, calce e polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Tossicità: il prodotto è tossico per i pesci.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DELTA s.r.l.
Via Aurelio Saffi, 15 - Milano

Officina di produzione: VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 25

5454

«PIRETRIX 10»

insetticida concentrato emulsionabile

Composizione:

Estratto di piretro puro . .	gr. 2,5
Piperonil butossido puro . .	gr. 16
Emulsionante e solvente, q.b. a	gr. 100

NORME PRECAUZIONALI:
- conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- non contaminare bevande o corsi d'acqua;
- dopo la manipolazione e in caso di intossicazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: «in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso».

Caratteristiche: Il «PIRETRIX 10» è un insetticida concentrato emulsionabile da diluire in acqua al 2-4% efficace contro afidi ed acari, tortricidi, tripidi, tentredini, bega della rosa e garofano nelle colture intensive in pieno campo e serra.

Dosi e modalità d'impiego: diluire il prodotto in ragione di 2-4 litri per 100 litri d'acqua agitando convenientemente.
Con l'emulsione ottenuta irrorare a nebulizzazione nell'aria, usando una pompa a mano o a motore.

CLASSE TOSSICOLOGICA: IV

Il prodotto va usato soltanto diluito nel modo indicato.

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

Il prodotto è tossico per gli insetti utili.
Intervallo di sicurezza: gg. 2.
«Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato».
«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

Officina di produzione: Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (BG).

Registrazione Ministero Sanità n. 5454 del 14.9.83

Peso netto: gr. 500. **«DA NON VENDERSI SFUSO»**

L. B. I.
LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
20028 SAN VITTORE OLONA (MI) - VIA TITO SPERI, 3/5
TEL. 0331/518.550

5455

ALASIP(R) COMBI

Diserbante in pasta liquida selettivo per il mais, distrugge anche le infestanti resistenti.

Caratteristiche: il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali, provenienti da seme, sia a foglia larga che a foglia stretta, comprese Digitaria, Setarie e Giavone americano resistenti alle triazine. Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in via di germinazione.

COMPOSIZIONE

— Alaclor puro	g	27
— Atrazina pura	g	8
— Coadiuvanti, Inerti: quanto basta a	g	100

- contiene Tetracloroetilene -

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM — Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano
Viale Gian Galeazzo,3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 5455 del 14.9.83 Ministero della Sanità.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega su terreno ben affinato subito dopo la semina, o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti, alle seguenti dosi medie, valide per terreni da leggeri a medi:

a) **quando non esistono infestanti resistenti alle Triazine ma per prevenirne la comparsa, lt 6/ha**

b) quando sono presenti Setarie, Digitarie e biotipi di giavoni resistenti, **lt 6/ha;**

c) quando è presente giavone americano **lt 7/ha**

d) quando è presente la Sorghetta e si debbono combattere i semi di questa infestante, **lt 8,5/ha**

Aumentare le dosi indicate di 1 l/ha in caso di trattamenti su terreni pesanti. .
Il prodotto ha un'efficacia parziale e spesso insufficiente nei terreni organici e torbosi.
Il prodotto si può distribuire alle seguenti epoche di impiego:

- pre-semina, con o senza leggera incorporazione
- pre-emergenza, da subito dopo o qualche giorno dopo la semina.
- post-emergenza, ma con infestanti graminacee resistenti all'Atrazina e con mais di altezza inferiore a 10 cm. (Mais 1 o 2 foglie).

Eventuali lievi fenomeni di ustioni osservabili solo in trattamenti di post-emergenze sono comunque senza conseguenza per lo sviluppo ed il raccolto della coltura.
Per un impiego ottimale del prodotto tenere inoltre presente i seguenti punti:

- diluire il prodotto in 4-5 o più Hl di acqua e distribuire la poltiglia uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici a mano o meccaniche;
- perchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 8-10 mm. cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad un'irrigazione a pioggia superficiale;
- le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenenti le sostanze attive erbicide.

Preparazione della poltiglia: versare il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

Avvertenze: le coltivazioni di mais trattate con il prodotto non possono essere consociate ad altre colture.
Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Si consigliano prove parcellari per varietà poco note o di recente acclimatazione.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di 10 mesi per altre colture (es. bietole, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Kg. 1**

5456

ACETIN - F

DISERBANTE DI POST - EMERGENZA DEI CEREALI

COMPOSIZIONE

— Clortoluron puro .	gr. 30
— Mecoprop (CMPP) puro . . (sotto forma di sale dimetilamminico)	gr. 30
— Coformulanti .	q. b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici: Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: E' sconsigliata la digitale.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ACETIN-F è un diserbante selettivo di post-emergenza del **frumento, segale e orzo.** Agisce per contatto ed assorbimento radicale contro: Avene selvatiche, Apera spica venti, Coda di volpe, Lolium, Poa, Veronica, Veccia, Senape, Ranuncolo, Rafano, Papavero, Lamio, Geranio, Aparine, Canapa selvatica, Fiordaliso, Fior di grano, Cerastio, Borsa del pastore, Camomilla. Si impiega dall'inizio a metà dell'accestimento alla dose di Kg 4-5 per ettaro e Kg. 6-7 per ettaro nei terreni mediamente argillosi e con infestazioni di Avene selvatiche ma che non abbiano superato il primo culmo di accestimento.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto si impiega da solo.

Fitotossicità: Il prodotto non si impiega con temperature sotto gli 8-10 °C e sopra i 21 °C. Da non impiegare su cereali traseminati e leguminose. Non impiegare su varietà di grano tenero Demar 4 e varietà di grano duro Kid.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A.
Melilli (SR)

Officina di produzione : VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg. 1

5457

SKUL 50 PB

FUNGICIDA POLIVALENTE

COMPOSIZIONE

— Vinclozolin puro	gr. 50
— Coformulanti	q. b. a gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Lo SKUL 50 PB è un anticrittogamico di contatto, particolarmente efficace nei confronti della Muffa grigia e della Sclerotinia. Non interferisce sulla fermentazione dei mosti e nel caso delle uve da tavola non imbratta i grappoli.

Vite: gr. 150-200/hl (Kg. 1,5-2/Ha) contro Botrite effettuando, in condizioni favorevoli all'attacco del fungo, quattro interventi (fine fioritura - prechiusura del grappolo - invaiatura e venti-venticinque giorni prima della raccolta). Curare in modo particolare la bagnatura dei grappoli.

Drupacee (Susino - Pesco - Ciliegio - Mandorlo - Albicocco): gr. 150-200 hl contro Monilia laxa e fructigena intervenendo all'inizio e durante la fioritura e cinque e tre settimane dall'inizio della raccolta.

Fragola: gr. 150-200/hl contro la Botrite intervenendo in pre-fioritura, piena fioritura, fine fioritura e venti giorni circa prima dell'inizio della raccolta.

Insalate (Radicchio - Indivia - Lattuga): gr. 150-200 hl (Kg. 1,5-2/Ha) contro Botrite e Sclerotinia, per almeno cinque volte, iniziando gli interventi dopo il trapianto.

Floricoltura (Geranio - Rosa - Ciclamino - Gerbera): gr. 150-200 hl contro la Botrite solo trattamenti preventivi.

Liliacee - Iridacee (Aglio - Cipolla - Gladiolo - Tulipano) per il controllo di Botrite e Marciume bianco

— gr. 800 per quintale di bulbilli eseguendo la concia a secco prima della semina.
— Kg. 1,5 per ettaro in post-trapianto o dopo la semina eseguendo almeno quattro interventi quando la coltura ha 5-6 foglie, all'ingrossamento dei bulbi, quaranta e venti giorni prima della raccolta.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. ... del ... del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg. 1

5458

CLASSE I

VELENO

metathion E

INSETTICIDA POLIVALENTE

AZINPHOS METILE PURO g 18,4 - EMULSIONANTI, BAGNANTI, SOLVENTI: QUANTO BASTA A g 100

Contiene xilolo e cloruro di metilene.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 23 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici**
- **conservare la confezione ben chiusa**
- **non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto**
- **non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua**
- **non operare contro vento**
- **evitare il contatto con la pelle e gli occhi**
- **durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi**
- **dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone**
- **rendere inutilizzabile dopo l'uso con i mezzi più idonei (bruciandole od interrandole, ad esempio) le confezioni che contenevano il prodotto**
- **in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: *lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso. *In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.*
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

MODALITA' DI IMPIEGO

Il METATHION E è caratterizzato da un ampio spettro d'azione e da una lunga persistenza. Intervenire alla prima comparsa dei parassiti ripetendo il trattamento in relazione ai nuovi attacchi.

Il METATHION E si impiega alla dose di g 120-250 per 100 litri d'acqua, sulle seguendi colture contro i parassiti indicati.

- Agrumi: tignola, cocciniglia, fetola, adulti della mosca.
- Barbabietola: cleono, punteruolo, altica (contro afidi, lixus elevare la dose a 300-350 g per 100 litri di acqua).
- Pero: psilla, carpocapsa.
- Melo: carpocapsa, antonomo, minatori (contro la lithocolletis elevare la dose a 300-350 g per 100 litri d'acqua).
- Pesco: cidia, anarsia.
- Floricoltura: minatrici delle foglie, tentredini, afidi, bega del garofano.
- Patata: dorifora, tognole, afidi.
- Tabacco: tripide, aleurode, altica.
- Vite: tignola, tortricidi.

Ove le condizioni del trattamento lo consigliano è senz'altro utile l'aggiunta di BAGNANTE ADESIVO S.

Diluire in poca acqua il METATHION E necessario per il trattamento, agitare e poi versare nel serbatoio aggiungendo il resto dell'acqua fino a raggiungere la concentrazione voluta.

Da non applicare con mezzi aerei

Miscibile con i più noti antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, esclusi quelli a reazione alcalina (quali polisolfuri, poltiglia bordolese, ad esempio). In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Dovranno essere, inoltre, rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Sospendere i trattamenti durante la fioritura per non colpire insetti utili e prendere le dovute precauzioni per non recare danno agli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIVAM FITOCHIMICA

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO - S.p.A.

VIA SCARLATTI 30 • 20124 MILANO • TEL. 270.451 • Telex 320379 SIVAM I

Officina di produzione: Diachem s.p.a. - Albino S. Alessandro (BG)

Registrazione n.3458 del Ministero della Sanità del 3.10.83

PESO: kg 10

5459

®COSMIC

Fungicida ad azione sistematica e di contatto per il controllo delle malattie fungine del frumento.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Carbendazim puro	g.	3,8
Maneb puro	g.	40
Tridemorph puro	g.	9,4
Coformulanti q.b. a	g.	100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft

6700 Ludwigshafen/Rhein

(Germania Federale)

Reg. Min. San. N.° 5459 **del** [illegible]

® = Marchio registrato BASF

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conato di di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il COSMIC è un fungicida che presenta associati tre principi attivi ad ampio spettro di azione.
— Carbendazim e Tridemorf dotati di azione sistematica ed attività preventiva e curativa.
— Maneb ad azione di contatto ed attività preventiva.
Il COSMIC esplica un totale controllo delle malattie fungine dovute a diversi patogeni, che colpiscono il frumento nelle diverse fasi del suo ciclo vegetativo. Tali malattie vengono comunemente denominate: mal del piede e malattie dell'apparato aereo (foglie e spighe) che comprendono: fusariosi, septoriosi, nerume, oidio e ruggini.

DOSI D'IMPIEGO

4 kg per ettaro distribuiti con 400-600 litri di acqua.
Epoche d'intervento: Sono consigliati gli interventi nelle seguenti epoche:
— dall'accestimento a fine levata della coltura, per il controllo del mal del piede e delle infezioni precoci di Oidio, Septoria e Ruggine;
— dalla spigatura a fine fioritura per il controllo delle malattie delle foglie e della spiga (septoriosi, fusariosi, oidio e ruggini).

MODALITA' D'IMPIEGO

Stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio della irroratrice quasi completamente riempito.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il COSMIC è miscibile con U 46 COMBI-FLUID, CYCOCEL e con gli insetticidi di comune impiego, nonché con i fertilizzanti fogliari BASFOLIAR e FETRILON COMBI. I prodotti ad azione insetticida dovranno essere aggiunti alla poltiglia di irrorazione poco prima dell'applicazione.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture vicine.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

1 kg.

5460

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

RHODAX S

**Fungicida sistemico e di contatto per la lotta
contro Peronospora ed Escoriosi della vite**

Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono.
Gr. 44 di Fosetyl alluminio puro
Gr. 26 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni

Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ANTIPARASSIDARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. 5 ... **del Ministero della Sanità del** ...

3/82

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.

L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.

Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.

La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche, unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la Peronospora della vite con interventi distanziati a cadenza fissa.

Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi, ed un'azione frenante sullo sviluppo dell'Oidio.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Peronospora:

Dose: gr. 300-350/hl.

Il primo trattamento contro la Peronospora va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni, fino alla fase di allegagione compresa.

Dall'allegagione alla raccolta continuare la lotta con prodotti della «LINEA R6» contenenti rame.

Escoriosi:

Dose gr. 300/hl.

Effettuare due trattamenti: il primo nella fase di «gemma mossa» (fase D del Baggiolini) ed il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolto

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5461

VITAVAX® 38/38

FUNGICIDA PER LA CONCIA DELLE SEMENTI

CLASSE III

ATTENZIONE!
Manipolare
con prudenza

Composizione: gr 100 di prodotto contengono:

— Carbossina	gr 37,5 di p.a. puro
— Captano	gr 37,5 di p.a. puro
— Bagnanti, disperdenti	q.b. a 100

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone.
- Evitare di respirare i vapori.

AVVERTENZA: durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare guanti ed occhiali protettivi dato le proprietà irritanti del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr 30 per litro di acqua) e digitale.

Caratteristiche: Il Vitavax 38/38 è un fungicida sistemico in polvere bagnabile impiegato nella concia delle sementi e dei bulbi per le seguenti colture: Frumento, Orzo, Segale, Avena, Sorgo, Riso, Mais, Cotone, Barbabietola da zucchero, Erba Medica, Trifoglio ed altre foraggere, Pomodoro, Piante da fiore ed ornamentali.
Il prodotto unisce all'azione sistemica dovuta alla carbossina, che penetra all'interno di essi, quella per contatto dovuta al captano.
Il prodotto è efficace contro: *Rhyzoctonia solani, Cercosporella herpotricoides, Tilletia spp., Ustilago spp., Phoma betae, Fusarium gramineum, Fusarium spp., Helminthosporium spp., Pythium spp., Alternaria spp., Septoria spp.*

REGISTRAZIONE N. .... DEL .... DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

® **Marchio Registrato Soc. UNIROYAL INC. - New York (USA)**

Dosi e modalità d'impiego:

Per 100 Kg di seme si impiegano le seguenti dosi:

— Frumento, Orzo, Segale, Avena	200 gr
— Sorgo	200-250 gr
— Riso	200-250 gr
— Mais	200-250 gr
— Cotone	300-350 gr
— Barbabietola da zucchero	500-700 gr
— Erba Medica, Trifoglio ed altre foraggere	200-300 gr
— Pomodoro	200-300 gr
— Semi di Piante da fiore ed ornamentali	250-350 gr

Per 100 Kg di bulbi si impiegano da 500 a 750 gr di Vitavax 38/38.
Il trattamento può essere effettuato a secco mescolando direttamente la polvere con il seme da conciare nel modo più uniforme, oppure con il sistema «slurry». In questo secondo caso al prodotto si aggiunge la quantità di acqua richiesta per ottenere una pasta che verrà meccanicamente spruzzata sul seme. Per i bulbi il trattamento viene fatto a secco oppure per immersione, per 1 ora, degli stessi in una soluzione allo 0,5% del prodotto.

Compatibilità: Il Vitavax 38/38 è compatibile con la generalità degli insetticidi e fungicidi impiegati nella concia delle sementi.

Avvertenza: In casi di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: È tossico per i pesci.

«**Attenzione:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso»
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato»
Il seme trattato deve essere impiegato esclusivamente per la semina, non deve essere perciò riutilizzato per l'alimentazione dell'uomo, degli animali domestici, del bestiame e della selvaggina.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

UNIROYAL

UNIROYAL CHIMICA S.p.A.
Via delle Industrie, 40
04013 LATINA SCALO

Officina di produzione: SARIAF S.p.A. - Via S. Silvestro, 1 - FAENZA

DA NON VENDERSI SFUSO **PESO NETTO KG 0,1**

5462

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ANTICASCOLA FC

Prodotto per prevenire la cascola non parassitaria delle Mele e Pere

Composizione: g. 100 di prodotto contengono:

— NAA puro	g. 1
— Coformulanti	q.b. a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE

Manipolare con prudenza

CHEMIA S.p.A.

Prodotto nello stabilimento CHEMIA s.p.a. di S. Agostino (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Registrazione n. 5462 del 14.9.83 del Ministero della Sanità

Peso Kg. 1

MODALITA' D'IMPIEGO

Ai primi sintomi della cascola intervenire trattando le colture alle seguenti dosi per 100 litri di acqua (impiegare acqua priva di calcio o meglio acqua piovana):

con temperatura tra 15 e 20 °C	g. 100
con temperatura tra 20 e 25 °C	g. 90-100
con temperatura tra 25 e 30 °C	g. 80- 90

Effettuare due trattamenti distanziati di 10-15 giorni irrorando le colture di melo e di pero verso sera.

Stemperare il prodotto in poca acqua e diluirlo poi nel totale quantitativo di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: **7 giorni.**

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5463

SIVAMIL P.B.

ANTICRITTOGAMICO SISTEMICO, AD AZIONE CURATIVA E PREVENTIVA

BENOMYL PURO g 50 · BAGNANTI, DISPERDENTI, INERTI QUANTO BASTA A g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

- **conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici**
- **non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua**
- **dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

DA NON VENDERSI SFUSO

MODALITA' DI IMPIEGO

Il SIVAMIL P.B. è un anticrittogamico sistemico ad azione preventiva e curativa contro malattie fungine di alcuni fruttiferi, vite, frumento e colture, floreali-ornamentali in pieno campo.

Il SIVAMIL P.B. si usa alle seguenti dosi, valide per 100 litri di acqua (salvo diversa indicazione), in trattamenti a volume normale (con volumi ridotti aumentarle adeguatamente):

- Vite (oidio e muffa grigia o botrytis): 60 g. Contro la botrytis iniziare i trattamenti, o subito prima, o subito dopo la fioritura e ripeterli per 5-6 volte fino alla avanzata maturazione (non ha effetti nocivi sulla fermentazione). Contro l'oidio iniziare dalla fase di gemma mossa e continuare per tutta la stagione seguendo il normale calendario antioidico.
- Melo e pero (ticchiolatura e oidio): 50-60 g. in trattamenti ad intervalli fissi (di 7 giorni o più, a seconda della fase di sviluppo e andamento stagionale) a partire dalla fase di mazzetti fiorali. Contro il gloeosporium, un unico trattamento, alla dose di 60-100 g. a 15-20 giorni dalla raccolta. Nelle località dove si è rilevata la presenza di ceppi di Venturia resistenti ai benzimidazolici se ne sconsiglia l'impiego.

  Pesche, susine, albicocche (monilia e sclerotinia): 60 g. in trattamenti prima, durante e dopo la fioritura. Contro oidio, sempre 60 g. trattamenti a seconda dell'andamento stagionale.

  Frumento (oidio, ruggine, fusariosi): 500-600 g per ettaro, in miscela a 2-2,5 kg. per ettaro di FUNGIMAN 88 o FUNGI MZ, per trattamento da effettuarsi in fase di spigatura-fioritura. In caso di attacchi precoci effettuare un primo trattamento in fase di levata, anche eventualmente abbinato all'intervento con diserbante ormonico in pieno campo.

  Colture floreali (oidio delle rose e piante ornamentali): 60-80 g ripetendo i trattamenti ogni 7-12 giorni.

  Contro le fialoforosi, rizoctonia, fusariosi, verticillosi del garofano effettuare trattamenti preventivi al terreno alla dose di 0,5-1 g in 10 litri di acqua per metro quadrato, ripetendo le applicazioni ogni 15 giorni circa, con attacco in atto fare il primo trattamento alla dose di 4 g in 10 litri di acqua per metro quadrato.

  Contro i marciumi da fusariosi, botrytis, penicillium, sclerotinia dei bulbi di tulipani, gladioli, gigli e fresie, immergere i bulbi stessi per 15-20 minuti in una soluzione realizzata con 200 g per 100 litri di acqua.

Il SIVAMIL P.B., nella dose opportuna, deve essere stemperato a parte e poi versato nel quantitativo d'acqua necessario, mescolando con cura.

Il SIVAMIL P.B., nei trattamenti fogliari, è in genere usato in miscela con i concimi fogliari CF-1 o FOLIARMICRO o FITO FEED e con gli integratori fogliari specifici per microcarenze, nonché con il BAGNANTE ADESIVO S.

Avvertenza: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei

Il SIVAMIL P.B. è miscibile con la maggior parte degli antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, ad esclusione di quelli a reazione alcalina quali polisolfuri, poltiglia bordolese. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Si consiglia di tenere lontani, durante il trattamento, gli animali domestici ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta. Per il frumento tale intervallo di sicurezza è di 60 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO - S.p.A.

VIA SCARLATTI 30 • 20124 MILANO • TEL. 270.451 • Telex 320379 SIVAM I

Officina di produzione: Diachem s.p.a. - Albino S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 5463 del Ministero della Sanità del 20.10.83

PESO: kg 5

5464

2,4 DISERBIN "P„

Diserbante ormonico selettivo

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

2,4 - D puro . . . . . (da Estere Isopropilico)	g 35,63
Coformulanti q. b. a Contiene xilolo	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Dopo l'uso lavare con acqua calda e soda le attrezzature usate per il trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza pericolosa per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: *astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.*

Controindicazioni: *è sconsigliabile la digitale.*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

CAFFARO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento di CHEMIA S.p.A. - S. AGOSTINO (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Registrazione n. del Ministero della Sanità del

CARATTERISTICHE

Il **2,4 DISERBIN «P»** è un diserbante ormonico selettivo a base di esteri pesanti del 2,4 D efficace nella lotta contro le erbe che infestano i cereali.

Il **2,4 DISERBIN «P»** per la sua selettività distrugge le erbe infestanti più dannose comprese le radici e gli organi sotterranei senza danneggiare i cereali.

Il **2,4 DISERBIN «P»** è caratterizzato da capacità di penetrazione e da bassa volatilità. Il suo assorbimento da parte delle foglie è immediato, sicchè la sua efficacia rimane tale anche sulle piante bagnate dalla rugiada o da una pioggia sopraggiunta subito dopo il trattamento.

DOSI E MODO D'IMPIEGO

Per la preparazione dell'emulsione si versa il prodotto in un recipiente contenente acqua, indi si mescola e si aggiunge altro liquido fino a volume desiderato. La quantità di emulsione sufficiente per irrorare uniformemente un ettaro di superficie da diserbare varia a seconda del tipo di pompa usato. Importante è invece curare che venga distribuito per ettaro il quantitativo di erbicida indicato.
Le dosi normali di impiego variano da un minimo di kg 0,450 ad un massimo di kg 1,300 per ettaro a seconda della specie e della diffusione delle malerbe, della temperatura media dell'aria e della natura del terreno (nei terreni leggeri si consigliano le dosi inferiori). L'epoca più indicata per eseguire il trattamento sul grano è quella che intercorre tra la fine dell'accestimento (emissione della quarta-quinta fogliolina sul culmo principale) e l'inizio della fase di botticella (rigonfiamento della spiga sulla guaina fogliare).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il **2,4 DISERBIN «P»** è miscibile con tutti gli altri prodotti impiegati in agricoltura.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

N.B. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi, ecc., anche sotto forma di vapori portati dal vento.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il **2,4 DISERBIN «P»** è nocivo per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO kg 5

5465

SIMAQUAT

Disseccante-Diserbante ad azione immediata e residua per frutteti, vigneti, agrumeti e oliveti

COMPOSIZIONE (riferita a g 100)

Paraquat puro	g 19,95
Simazina puro	g 38
Coformulanti	q.b.a g 100

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968 numero 1255.

CLASSE I — **VELENO**

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare fate guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Attenzione: *i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata). L'introduzione nell'organismo* ***anche di poche gocce*** *del prodotto può essere fatale:* ***non attendere la comparsa dei sintomi*** *per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata l'emodialisi. Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocate il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.*

Intossicazione per ingestione e per inalazione
I primi sintomi sono: epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato-renali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare ***grave****, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat nel sangue.*

Intossicazione per contatto
Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili ulcerazioni (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.
Unghie: macchie bianche con fessure trasversali e caduta.
Terapia sintomatica da praticarsi esclusivamente da medico.
Per ogni caso, ulteriori informazioni sulla tossicologia del paraquat e sulla terapia possono essere richieste ***direttamente alla*** *società per il tramite di questo presidio sanitario.*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

CAFFARO

Prodotto su formula originale e sotto il controllo della CAFFARO S.p.A. nello stabilimento di
CHEMIA S.p.A. - S. AGOSTINO (FE) - S.S. 255 - Km. 46
Registrazione n. del Ministero della Sanità del

CARATTERISTICHE
Il SIMAQUAT è un disseccante-diserbante indicato per il diserbo dei frutteti (Pomacee, Drupacee), vigneti, agrumeti, oliveti, asparagiaie, canali e corsi d'acqua in genere, argini delle risaie e diserbo totale.
Il SIMAQUAT deve essere distribuito su terreno morbido, in quanto esplica una pronta azione disseccante sulla parte aerea delle infestanti presenti ed impedisce, per assorbimento radicale, la nascita di nuove malerbe annuali per un periodo di circa 6 - 8 mesi; tale azione residua non si esplica nei confronti delle infestanti perennanti.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Frutteti, vigneti, agrumeti, oliveti: kg 4-5/ha in 800-1000 litri di acqua. Le epoche più idonee per eseguire il trattamento sono la primavera e l'autunno con infestanti che non abbiano superato circa i 15-20 cm. Curare di non bagnare con il liquido diserbante tralci o rami degli alberi dove si esegue il trattamento, se ciò dovesse accadere si provocherebbe il disseccamento della porzione colpita dallo spruzzo senza conseguenze ulteriori.
Asparagiaia: kg 3/ha in 500-600 litri di acqua, il trattamento va eseguito in primavera prima che emergano i turioni o dopo la fine della raccolta.
Sponde, canali e argini risaie: kg 6-8/ha in 400 - 500 litri di acqua.
Diserbo totale di aree incolte: kg 10-30/ha in 800-1000 litri di acqua in relazione allo sviluppo delle infestanti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Il SIMAQUAT non deve essere miscelato con altri antiparassitari, si consiglia solo la miscela con Bagnante Caffaro (50 g/hl) per accentuare l'azione immediata per contatto del prodotto.
Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È vietato l'impiego diretto sui foraggi.
Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive occorre un intervallo di almeno 7 mesi per il frumento ed almeno 12 mesi per altre colture (es.: bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi. Da impiegare solo su colture specializzate.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 1

5466

® malertox GR amminico

DISERBANTE SELETTIVO DEI CEREALI

®Marchio registrato SIVAM

MCPA PURO g 52 - COFORMULANTI QUANTO BASTA A g 100

CLASSE III

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici**
- **conservare la confezione ben chiusa**
- **non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto**
- **non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua**
- **non operare contro vento**
- **evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti**
- **dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: *astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti di contatto, senso di costrizione toracica, cefalee, vertigini, convulsioni, coma.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *abbondante lavaggio gastrico, ossigeno-terapia, sedativi, diuretici di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi.*

Controindicazioni: *è sconsigliata la digitale.*

MODALITA' DI IMPIEGO

Il MELARTOX GR AMMINICO trova essenzialmente applicazione nei seguenti trattamenti:

- Diserbo di frumento, orzo, avena: 0,7-2 kg/ha, ricorrendo alle dosi minori sui cereali minori e con malerbe poco sviluppate; l'epoca di intervento è dalla fine dell'accestimento all'inizio dello stadio di botticella.
- Diserbo del riso: 0,7-1,7 kg/ha, intervenendo nel periodo tra la differenziazione della 5ª foglia sul culmo principale e l'inizio dello stadio di botticella (durante il trattamento togliere l'acqua sino a scoprire la porzione superiore delle infestanti, senza tuttavia mettere in asciutto la risaia che deve rimanere coperta da qualche centimetro d'acqua: ridare acqua dopo 24-30 ore).

Il MALERTOX GR AMMINICO deve essere impiegato preferibilmente in giornate calde e non piovose, con temperature non inferiori ai 12 °C: nel caso di temperature superiori ai 18 °C le dosi andranno diminuite del 10-20%.

Il MALERTOX GR AMMINICO in entrambi questi trattamenti si usa comunemente in miscele con il concime fogliare CF-1 alla dose di 4-6 kg/ha.

Da non applicare con mezzi aerei

Nel caso del diserbo del riso il MALERTOX GR AMMINICO può essere impiegato anche in miscela con altri diserbanti, mentre nel caso diserbo di frumento, orzo o avena è impiegato normalmente da solo, salvo la miscela con CF-1; in caso di miscela deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto può danneggiare colture sensibili, quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi e floreali in genere: evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO - S.p.A.

VIA SCARLATTI 30 • 20124 MILANO • TEL. 270.451 • Telex 320379 SIVAM I

Officina di produzione: Diachem s.p.a. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 5466 del Ministero della Sanità del 3.10.83

PESO: kg 5

5467

LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.r.l.
20028 SAN VITTORE OLONA (MI) - VIA TITO SPERI 3/5
Tel. 0331/518.550 - Telex: 340522 Labio I

CLASSE TOSSICOLOGICA: III

"METADENE"

— esca microgranulare a base di metaldeide —

Composizione:

Metaldeide acetica pura	gr. 5
Eccipienti ed attrattivi, q.b. a	gr. 100

«ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA»

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave e in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte cagliato), choc, midriasi, ipotermia, convulsioni, obnubilazione del sensorio.

Consigli terapeutici: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua), riscaldare il paziente, cardiotonici, fleboclisi clorurate o glucosate con noradrenalina, diuretici, barbiturici, neuroplegici, anfetamina e derivati in caso di torpore

Caratteristiche: il «METADENE» è un efficace mezzo di lotta contro le lumache grandi e piccole, limacce e chiocciole che infestano gli orti.

Dosi e modalità d'impiego: Orti: gr. 250-400 per 100 mq.
Eseguire il trattamento preferibilmente la sera o subito dopo una pioggia, distribuendo il «METADENE» a piccoli mucchietti od a file

«DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI»

Per le sue caratteristiche il «METADENE» va distribuito da solo
Non spargere il «METADENE» sulle foglie di tabacco.
Il prodotto è nocivo per insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA: GIORNI 20.

«Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso»
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato»
«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

Officina di produzione: Agrozoofarma S.r.l. Via Lavariano, 15 - Mortegliano (UD)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5467 del 14.9.83

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Peso netto Kg 1

5468

SALVO®

(Fumigante microgranulare)

Disinfestante completo del terreno per la lotta contro nematodi, funghi, erbe infestanti ed insetti terricoli.
Da impiegarsi in assenza di colture.

COMPOSIZIONE:	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Dazomet puro	g 98
— Coformulanti q.b. a	g 100

Stauffer — ® Marchio depositato
Stauffer Chemical Company
Westport - Connecticut - U.S.A.

III CLASSE

Attenzione: MANIPOLARE con PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

STAUFFER CHEMICAL ITALIA S.p.A.
Sede legale:
Via Visconti di Modrone, 18 - 20122 Milano
Sede amministrativa:
20078 San Colombano al Lambro (Milano)
telefono 0371 / 89418 - 9
Codice Fiscale: 00830810156

Officina di produzione:
SIAPA S.p.A.
40015 San Vincenzo di Galliera (Bologna)

Reg. Ministero Sanità n° 5468 del 14.9.83

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il SALVO è un fumigante in formulazione microgranulare che trova impiego nella disinfestazione del terreno laddove vengono ripetute coltivazioni intensive a ciclo molto ravvicinato.
Il SALVO, una volta incorporato al terreno, si trasforma in composti gassosi che si diffondono facilmente nel terreno e sono i veri responsabili dell'intensa azione biocida verso i parassiti animali e vegetali presenti.
Il SALVO è di facile e pratico impiego in quanto può essere distribuito semplicemente a mano oppure con gli spandi-microgranuli esistenti in commercio.
La migliore azione disinfestante è sempre e comunque legata ad una regolare ed uniforme distribuzione del SALVO sulla superficie da risanare.

CAMPI DI IMPIEGO

Il SALVO trova impiego nel controllo di:

a) **nematodi parassiti delle piante**, quali:
- **nematodi delle radici** che vivono in forma libera nel terreno (**Pratylenchus spp., Paratylenchus spp., Rotylenchus spp.**);
- **nematodi galligeni delle radici (Meloidogyne spp.)**;
- riduzione considerevole dei **nematodi a cisti (Heterodera spp.)** e anguillule degli steli **(Ditylenchus dipsaci)**;

b) **funghi parassiti del terreno**
che causano marciumi, avvizzimenti, morie, imbrunimenti, quali:
Alternaria tenuis: alternaria
Aphanomyces spp.: peronospora della lattuga e delle composite
Bremia lactucae: peronospora dell'insalata e di altre composite
Botrytis cinerea: putrefazione grigiastra del colletto dell'insalate
Botrytis allii: marciume della cipolla, aglio e porro
Colletotrichum atramentarium: seccume degli steli e delle radici delle patate
Didymella lycopersici: marciume nero del frutto del pomodoro
Fusarium oxysporum: avvizzimento del fagiolo, del garofano e altre colture
Peronospora nicotianae: peronospora del tabacco e delle solanacee in genere
Peronospora tabacina: peronospora del tabacco
Plasmodiophora brassicae: ernia del cavolo
Phialophora cinerescens: avvizzimento del garofano
Phytophthora cactorum: necrosi del colletto e degli stoloni della fragola e di altre specie
Phytophthora capsici: marciume del pomodoro e del peperone
Phytophthora cinnamomi: marciume del castagno
Phytophthora citricola: marciume delle piantine di agrume nei semenzai
Phytophthora fragrarie: marciume del colletto e delle radici della fragola
Phytophthora infestans: peronospora delle solanacee
Phytophthora nicotianae e P. parasitica: marciume del garofano e delle solanacee
Phytium debaryanum: marciume dei semenzai e delle giovani piante in genere e del tabacco
Thielaviopsis basicola: marciume nero delle piantine di tabacco in semenzaio
Phoma apicola, P. lingam: moria del sedano e delle crucifere
Rhizoctonia solani: rizoctonia della patate e del pomodoro
Rhizoctonia fragrarie: rizoctonia della fragola
Rhizoctonia violacea: rizoctonia della carota
Sclerotinia rolfsii: marciume dei seminati di numerose specie
Sclerotinia cepivorum: marciume dei bulbi delle liliacee
Sclerotinia sclerotiorum: marciume molle di numerose piante in via di sviluppo.
Verticillium albo-atrum: tracheo-verticillosi o tracheomicosi, parassiti di pomodoro, melanzana, cetriolo e fragola
Verticillium dahliae: agenti degli avvizzimenti di numerose specie;

c) **erbe infestanti**
- che si propagano per seme quando si trovano allo stadio cotiledonare o allo stadio di plantula, quali:
Atriplex patula: atriplice maggiore; **Capsella bursa-pastoris**: borsa del pastore; **Galinsoga parviflora**: galinsoga; **Poa annua**: fienarola annua; **Polygonum spp.**: coreggiola, falso convolvolo, ecc.; **Spergula arvensis**: renaiola; **Stellaria media**: stellaria; **Urtica dioica**: ortica.
- che si propagano per radici e rizomi, quali:
Agropyrum repens: gramigna; **Cirsium arvense**: stoppione; **Cynodon dactylon**: gramigna, **Equisetum arvense**: coda di cavallo; **Aegopodium podagraria**: podagraria
fino alla profondità di incorporamento del prodotto;
- che si propagano per bulbi e rizomi fino alla profondità di incorporamento del prodotto nel terreno;

d) **insetti che vivono nel terreno**, quali:
larve di elateridi, larve di maggiolino, agrotidi ed altri insetti, nei diversi stadi di sviluppo, che si trovano nel terreno.

Per tali caratteristiche il campo di applicazione del SALVO è molto ampio per cui il suo impiego viene raccomandato nella disinfestazione del terreno destinato a tutte le colture ortive in pieno campo, quelle floricole e ornamentali, semenzai, aiuole, cassoni, nelle colture in serra e sotto tunnels; in viticoltura e frutticoltura e per la disinfestazione dei terricciati.

DOSI D'IMPIEGO

Le dosi d'impiego del SALVO variano in relazione alla natura del terreno, al grado di infestazione ed alla profondità di incorporamento del prodotto nel terreno. Mediamente esse sono:
a) in pieno campo e in serra: 40-70 grammi/metro quadrato
b) terricciati e composte: 200-250 grammi/metro cubo.
Le dosi minime e le massime indicate sono generalmente valide per una profondità di incorporamento di 20 cm.
Per ottenere un'azione di risanamento in strati di terreno più profondi è necessario aumentare le dosi sopra indicate di 15-20 grammi/metro quadrato e per ogni 10 cm di maggiore profondità.
Operando alle diverse profondità si ottengono azioni di controllo pure diverse che interessano agenti patogeni specifici:
- profondità di 20 cm.: marciumi radicali superficiali, morie, attacchi del colletto, nematodi, insetti terricoli e semi di erbe infestanti;
- profondità di 30 cm.: marciumi radicali non superficiali, marciumi degli steli, malattie dell'apparato tracheale o avvizzimenti dovuti a **Fusarium spp., Verticillium spp.** (limitazione dell'attacco non eliminazione totale), **Phoma** del sedano, larve di maggiolino e di elateridi.
- profondità di 5 - 8 cm per ottenere una discreta azione diserbante, seppure limitata agli strati superficiali del terreno; in tal caso sono sufficienti 20 grammi/metro quadrato di SALVO incorporati uniformemente su tutta la superficie.

Le lavorazioni al terreno eseguite successivamente al trattamento (fresature, zappature), dovranno essere piuttosto superficiali e comunque non superiori alla profondità di incorporamento per evitare che siano portati in superficie parassiti o semi d'infestanti presenti negli strati non raggiunti dal trattamento con SALVO.

MODALITA' E RACCOMANDAZIONI PER L'IMPIEGO

- **Stabilita la quantità di SALVO che si vuole impiegare per unità di superficie o di volume, distribuire il prodotto in modo regolare ed uniforme sulla superficie da trattare.**

Al momento del trattamento il terreno deve essere ben sminuzzato, livellato, sufficientemente umido, ma non freddo, e privo di residui grossolani della coltura precedente. L'umidità ottimale per la migliore riuscita del trattamento disinfestante si ha allorché il terreno è in tempera (ossia al 50% della sua capacità di ritenzione di acqua).
Sul terreno eccessivamente secco infatti la decomposizione del SALVO è molto lenta; inoltre la sua azione è praticamente nulla sui semi delle erbe infestanti in fase di quiescenza.
Per favorire l'attività erbicida sarà quindi utile 4-7 giorni prima del trattamento, qualora l'appezzamento da trattare si presenti eccessivamente asciutto o polveroso, irrigare abbondantemente allo scopo di facilitare il rigonfiamento e la germinazione dei semi.
La temperatura del terreno misurata a 10 cm. di profondità dovrebbe essere almeno di 10°C. Con temperature del terreno inferiori l'impiego del SALVO è sconsigliabile.
L'eliminazione dei residui delle radici rimaste nel terreno, anche mediante la decomposizione delle medesime, è estremamente utile allorché si debbano trattare terreni infestati da nematodi galligeni delle radici. La loro decomposizione infatti consente che i nematodi, liberatisi nel frattempo dalle galle, possano essere esposti il più possibile all'azione dei fumi attivi gassosi del SALVO.
Occorre evitare l'impiego del letame in prossimità del trattamento, il letame maturo dovrà essere distribuito ed interrato almeno 30-40 giorni prima dell'impiego del SALVO.
È bene evitare pure, da due settimane prima del trattamento e per tutto il periodo durante il quale il SALVO rimane nel terreno trattato, di distribuire concimi organici, fertilizzanti azotati a base di ammoniaca, oppure torba.

- **Subito dopo la distribuzione si effettua l'incorporamento del SALVO alla profondità prestabilita, in relazione al tipo di coltura e di terreno;**

per questa operazione impiegare frese, zappatrici rotative o motocoltivatori che assicurano un regolare interramento del prodotto.
Se dopo questa operazione il terreno si presenta molto soffice ed irregolare si consiglia di livellare o rullare la superficie trattata.

- **Subito dopo l'incorporamento irrigare abbondantemente per aspersione (10-15 litri circa per metro quadrato) e ciò allo scopo di rendere più rapida la trasformazione dei granuli del SALVO nella forma gassosa e di aumentarne l'efficacia.**

L'intervento irriguo, sempre necessario, è particolarmente richiesto quando si opera su terreni sciolti e quando la temperatura del terreno supera i 18°C. In questi casi è anzi opportuno ripetere l'operazione 2 o 3 giorni dopo il trattamento, oppure, subito dopo la prima irrigazione, ricoprire il terreno con fogli di polietilene o materiale plastico affine onde evitare una dispersione troppo rapida dei metaboliti gassosi nell'atmosfera.
Se, a distanza di alcuni giorni dal trattamento, sono visibili dei granuli indecomposti di SALVO sul terreno, è segno che o la temperatura del terreno era troppo bassa o, più verosimilmente, che in esso non c'era umidità sufficiente a trasformare i granuli in gas. Si impone in tal caso il ricorso ad una ripetuta abbondante irrigazione.

- **Dopo 15-20 giorni dal trattamento (qualche giorno in più se la temperatura del terreno si è mantenuta piuttosto bassa), effettuare una fresatura allo scopo di arieggiare il terreno e di favorire la fuoriuscita dei vapori del SALVO.**

La fresatura del terreno dovrà essere piuttosto superficiale e comunque di profondità non superiore a quella raggiunta durante la fase d'incorporamento del SALVO nel terreno.

- **Trascorsi altri 10-15 giorni da questa operazione, eseguire il cosiddetto «test del crescione» allo scopo di accertarsi della completa scomparsa dei prodotti di trasformazione gassosa del SALVO dal terreno.**

Solo se il «test del crescione» avrà dimostrato l'assenza totale di vapori attivi si potrà iniziare la nuova coltura.
Nell'esecuzione di questo test è inoltre da tener presente che se cadono abbondanti piogge, sopratutto nei terreni sciolti, i vapori di SALVO possono essere trasportati in uno strato di terreno più profondo di quello trattato; in tal caso per eseguire il test del crescione sarà indispensabile prelevare campioni di terreno anche al di sotto dello strato trattato.

a) PIENO CAMPO, AIUOLE, CASSONI.

Su ampie superfici e in pieno campo il SALVO può essere distribuito con normali spandiconcimi, escludendo quelli a distribuzione centrifuga, oppure con apparecchiature combinate in grado di effettuare simultaneamente il lavoro di spargimento dei granuli e quello di incorporamento del prodotto.
Su piccole e medie superfici la distribuzione può essere fatta semplicemente a mano, oppure con l'impiego di attrezzature spandi-micro-granuli appositamente costruite per impieghi del genere. Gli spandi-micro-granuli hanno in genere il pregio di distribuire il prodotto in modo uniforme e alla dose, per unità di superficie, prefissata, indipendentemente dalla velocità di avanzamento della macchina.
Nell'uno e nell'altro caso condizione indispensabile per ottenere risultati duraturi è quella di effettuare una distribuzione il più possibile uniforme.
Nelle applicazioni di pieno campo, in considerazione del modo di agire del SALVO, si consiglia di usare una fascia di rispetto verso le radici degli alberi, cespugli, arbusti o siepi di almeno 50 cm.

b) SERRE E TUNNELS

I trattamenti in serra non si differenziano sostanzialmente da quelli in pieno campo; avendone la possibilità è comunque preferibile operare con una temperatura del terreno attorno ai 25°C, che è la più indicata ai fini del meccanismo di azione del SALVO.
Se la disinfestazione interessa solo una parte della serra, si deve isolare la parte da trattare sia dentro che fuori terra, interrando dei fogli di polietilene sino a 25 cm. di profondità e più, e chiudendo ermeticamente tutte le fessure per evitare che i vapori del SALVO possano giungere a contatto con le colture adiacenti, le quali subirebbero senz'altro danni più o meno ingenti.
Parecchie piante ornamentali (**Ficus spp., Asparagus plumosus**) sono estremamente sensibili ai vapori gassosi del SALVO. Si avrà perciò cura di mantenere l'isolamento fino alla scomparsa completa dei gas formatisi.

c) TERRICCIATI

Stendere il terriccio su un supporto impermeabile — può bastare anche un foglio di plastica —, in strati di 20-25 cm. di altezza. Spargere la dose stabilita di SALVO (250 g./mc. o appena 200 g./mc. nei terreni sciolti) ed incorporare omogeneamente il prodotto al terreno con un motocoltivatore.
Sovrapporre al primo un secondo strato di terreno della stessa altezza del precedente e distribuire ed incorporare il prodotto secondo le stesse modalità. Procedere successivamente con la medesima tecnica fino a quando il cumulo ha raggiunto l'altezza massima di 1 metro. Ricoprire poi il cumulo, reso sufficientemente umido con adeguate bagnature, con stuoie o materiale plastico per trattenere i vapori del SALVO.
Due settimane dopo il trattamento togliere la copertura e rimuovere completamente il terricciato; se la temperatura del cumulo non è scesa al disotto dei 10-15°C il terricciato può essere pronto per l'uso dopo 2-3 settimane. Se la temperatura è stata inferiore ai 10°C è necessario prolungare l'attesa di 1 o 2 settimane.

TEST DEL CRESCIONE

Il «test del crescione» serve per accertare la scomparsa completa dei metaboliti gassosi del terreno trattato con SALVO prima di procedere alla semina o al trapianto di nuove colture.
Si riempie per metà un vaso di vetro con terreno non pressato e prelevato in vari punti e a diverse profondità, anche al di sotto dello strato trattato.
Dopo il prelievo del terreno, da eseguirsi introducendo il più rapidamente possibile i campioni nel contenitore, si chiude il vaso per impedire la perdita degli eventuali vapori di SALVO.
Come termine di confronto si consiglia di riempire anche un vaso con terreno che non ha subito alcun trattamento.
Si introduce poi in entrambi un batuffolo di cotone inumidito al quale sono stati fatti aderire dei semi di crescione (**Lepidium sativum**) o, in mancanza di questi, di insalata, facendo in modo che il batuffolo rimanga sollevato dal terreno.
I vasi chiusi ermeticamente con coperchi provvisti di guarnizioni di gomma vengono quindi posti in un ambiente luminoso ad una temperatura di 20-22°C.
A questa temperatura il crescione dovrebbe germinare nel volgere di 1-2 giorni. Se la germinazione è assente o lo sviluppo stentato è segno che sono presenti ancora vapori di SALVO.
Occorrerà allora arieggiare nuovamente con una fresatura il terreno trattato e ripetere il «test del crescione» dopo una settimana. La messa a coltura del terreno sarà possibile solo quando tra il vaso contenente terreno trattato e quello contenente terreno non trattato non si osserverà alcuna differenza nella velocità di germinazione del crescione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA'

Il SALVO si impiega da solo.

FITOTOSSICITA'

I vapori di SALVO sono fitotossici verso tutte le specie coltivate. Il prodotto è però privo di azione residua ed il rispetto del necessario periodo di attesa prima della messa a dimora delle colture nel terreno esclude ogni azione tossica sulle piante.

«ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato».
«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

DA NON VENDERSI SFUSO. **CONTENUTO NETTO Kg. 5**

5469

CARATTERISTICHE: erbicida ad azione antigerminello, per contatto e per assorbimento radicale.

Infestanti combattute: Giavone (Panicum, Echinochloa spp.).

Colture protette: riso.

Dosi d'impiego: terreni sciolti kg. 6/Ha. Terreni medio impasto kg. 7/Ha. Terreni pesanti kg. 8/Ha.

Epoche d'impiego: pre-semina della coltura: sia su terreno asciutto sia in acqua. **Post-emergenza della coltura:** a partire da quando il riso ha 1,5-2 foglie vere e prima che il giavone abbia 3 foglie.

Modalità d'impiego:

- **Pre-semina:** livellare e sminuzzare accuratamente il terreno, distribuire il prodotto uniformemente su tutta la superficie da proteggere. Subito dopo il trattamento interrare leggermente il prodotto; procedere successivamente alla normale inondazione della risaia e poi alla semina del riso. Dove è possibile, inondare la risaia immediatamente dopo il trattamento; non è necessario incorporare il prodotto: in questo caso attendere per 3 giorni prima di seminare.
- **Pre-semina in acqua:** distribuire uniformemente il prodotto nell'acqua, mantenere questa ferma per 3 giorni, far defluire l'acqua, ove possibile, rimettere acqua nelle camere e seminare.
- **Post-emergenza:** eseguire il trattamento **quando il riso ha almeno 1,5-2 foglie** e la maggior parte delle piantine emerge dall'acqua: mantenere perciò il livello dell'acqua a 10 cm circa evitando però che il terreno emerga. Durante i 3 giorni successivi al trattamento mantenere l'acqua ferma od in leggero movimento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: non eseguire il trattamento se la temperatura supera i 28-30°C o se si prevedono nel periodo del trattamento forti sbalzi termici. Non usare il prodotto prima che il riso abbia almeno 1,5-2 foglie. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 60 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

MOLINUR®

ERBICIDA SELETTIVO PER LA RISAIA

Composizione:

BENTHIOCARB puro		gr. 20
MOLINATE puro		gr. 40
Coformulanti	q.b. a	gr. 100

• Contiene xilolo •

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79 94 61/2 - Telex I 511046

Registrazione N. 5469
del 14.3.83
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (BO)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi)

Sintomi d'intossicazione: *nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio; lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente ai bambini. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero in Centro di rianimazione.

Controindicazioni: *le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.*

5470

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata).
L'introduzione nell'organismo **anche di poche gocce** del prodotto può essere fatale: **non attendere la comparsa dei sintomi** per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata l'emodialisi. Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee), e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione e per inalazione.
I primi sintomi sono: epitassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola.
Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epatorenali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare **grave**, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat nel sangue.

Intossicazione per contatto.
Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-14 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.
Unghie: macchie bianche con lesioni traversali e caduta.
Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del Paraquat e sulla terapia possono essere direttamente richieste alla società produttrice di questo presidio sanitario.

Kg 1

PARAQUAT

ERBICIDA-DISSECCANTE TOTALE

I CLASSE

VELENO

Composizione:

PARAQUAT puro . . . . . (sotto forma di dicloruro)	g. 17,86
Bagnanti e diluenti .	q.b. a g. 100

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'Art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 n. 1255.

Tipo di formulazione: liquido solubile

AGRICO s.r.l.

Viale Masini, 20 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bo)

Registrazione del Ministero della Sanità
n. 5470 del 14.9.83

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: azione disseccante per contatto. Assorbimento per via fogliare; non ha effetto radicale in quanto viene rapidamente inattivato a contatto con il terreno.
Campi d'impiego: diserbo totale e parziale. Diserbo controllato e non coltura in vigneti, frutteti, agrumeti e colture arboree in genere. Preparazione e conservazione di piazzole dell'uliveto. Diserbo interfilare ed interparcellare delle colture ortive, industriali, ornamentali e floreali. Diserbo asparagiaie. Diserbo patate. Diserbo primaverile erba medica. Semina senza aratura (sod seeding). Diserbo canali, bacini, scoline, sponde canali o corsi d'acqua. Miglioramento pascoli. Diserbo vivai. Diserbi pretrapianto, presemina e preemergenza. Lotta contro la cuscuta. Diserbo giavone nelle risaie. Diserbo di superfici limitate contro infestanti di roseti, giardini, tappeti erbosi, orti. Contro malerbe su strade, autostrade, marciapiedi, lastricati, selciati ed inoltre su viali di prati e di giardini. Diserbo totale di luoghi incolti ed aree industriali.

E' vietato l'impiego diretto sui foraggi.

Infestanti combattute: erbe annuali mono e dicotiledoni, comprese le graminacee.

Dosi d'impiego: frutteti, vigneti, colture arboree in genere; olivo; colture ortive, industriali, ornamentali e floreali; asparagiaie, alle dosi di kg. 2-4 per ettaro. Vivai: diserbo presemina, pretrapianto, preemergenza; contro la cuscuta, alle dosi di kg. 3-5 per ettaro. Semina senza aratura, alle dosi di kg. 4-5 per ettaro. Diserbo sponde canali e miglioramento pascoli, alle dosi di kg. 5-10 per ettaro. Incolti, alle dosi di kg. 3-6 per ettaro. In particolare nel caso di barbabietola, alle dosi di kg. 2,5-3,5 per ettaro, erba medica, kg. 2,5-3 e mais kg. 3 per ettaro.
Impiegare le dosi più elevate nelle prime applicazioni e in caso di forte infestazione.

Epoche d'applicazione: in presenza delle infestanti, in qualsiasi periodo dell'anno.
Per frutteti, vigneti, olivo e colture arboree in genere, diserbo totale o parziale in presenza della coltura (tronchi lignificati), una o due volte nel corso dell'annata.
Per colture ortive, industriali, ornamentali e floreali, diserbo presemina e pretrapianto in caso di assenza della coltura; diserbo interfilare e interparcellare nel caso di presenza della coltura. **Medicai**, trattamenti prima della ripresa vegetativa, in assenza di brina con qualsiasi temperatura ambiente; contro la **cuscuta**, trattando l'area infestata compreso una zona di circa 1 metro intorno, con sfalcio preventivo. **Per vivai**, in presemina o pretrapianto. **Sponde canali**, uno o più trattamenti con intervalli di 1 mese. In particolare, per **barbabietola**, trattare presemina o preemergenza; per **mais**, in presemina o preemergenza; in postemergenza trattare quando la coltura raggiunge i 40-50 cm. usando particolari accorgimenti per non investire la coltura (ad es. coni di protezione).

Metodi d'impiego: le dosi indicate vanno disciolte in 300-800 litri di acqua e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti che vanno comunque accuratamente e abbondantemente bagnate, evitando peraltro lo sgocciolamento. Non impiegare acqua torbida per la preparazione della miscela onde évitare l'inattivazione del prodotto. E' necessaria l'aggiunta di g. 600-800 di bagnante agricolo ogni 100 litri di soluzione, affinché il prodotto possa esplicare tutta la sua attività; fa eccezione il trattamento a quella parte della vegetazione dei canali che può restare sommersa.
Il trattamento va eseguito con attrezzatura dotata di getto uniforme e non atomizzata; nel caso di trattamenti interfilari in presenza della coltura, è indispensabile evitare che il prodotto giunga a contatto con la coltura.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: evitare la miscela con insetticidi o fungicidi. In caso di miscele con altri erbicidi, controllare la effettiva compatibilità dei formulati. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: impiegare il prodotto soltanto sulle colture indicate ed evitare che vengano colpite le colture limitrofe e comunque sensibili. Evitare d'impiegare il prodotto in presenza di piante arboree non ancora bene lignificate. Divieto d'impiego sui foraggi.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERI SFUSO

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

5471

GIBOR®

Fitoregolatore

Composizione: Acido Gibberellico gr. 90 puro **polvere solubile in alcool**

IV CLASSE

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto in luogo inacessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche: *In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

Caratteristiche e Modalità d'impiego: il fitoregolatore GIBOR è un ormone di origine vegetale dalle seguenti caratteristiche: favorisce l'allegagione - contrasta i danni delle gelate - accresce lo sviluppo e la vigoria delle piante - annulla l'alternanza della produzione - anticipa la fioritura e la maturazione - aumenta le dimensioni ed il colore dei fiori - accelera il ricaccio delle piante foraggere - favorisce la germinazione delle sementi - allunga e solidifica le fibre delle piante tessili - sopprime il nanismo - corregge gli effetti delle virosi.

Campi d'impiego: pero, vite, agrumi, patata, carciofo, fragola e colture da fiore.

Dosi ed epoche d'impiego: ogni 100 litri d'acqua:

— **Pero:** gr. 1-2 per favorire l'allegagione, trattare quando il 20-30% dei fiori è aperto. È particolarmente indicato per le varietà Coscia, Passacrassana, Butirra Giffard, Decana, Trionfo di Vienna. Per contrastare i danni delle gelate, trattare subito dopo l'avvento del freddo e non oltre le 48 ore.

— **Vite:** gr. 1-3 per prevenire l'acinellatura e allungare il rachide trattare i bottoni fiorali 10 giorni prima della fioritura oppure 10 giorni dopo.

— **Agrumi:** gr. 2-3. Per migliorare la qualità della buccia e il peso medio dei frutti; trattare i frutti immaturi.

— **Patata:** gr. 1. Trattare i tuberi, prima della messa a dimora, per stimolare la cacciata dei germogli.

— **Carciofo:** gr. 1-3. Per anticipare le prime produzioni trattare al momento della formazione del capolino; per anticipare la raccolta delle produzioni trattare 20-25 giorni prima del raccolto.

— **Fragola:** gr. 1-3. Per anticipare la fioritura e la produzione e migliorare la pezzatura dei frutti. Trattare 4-6 settimane prima della fioritura a dosi proporzionate alla vigoria delle piante e alla cultivar.

— **Fiori in pieno campo (Anemoni, Fiordalisi, Ortensie):** gr 1-2. Per favorire l'anticipo della fioritura ed aumentare la dimensione dei fiori, intervenire alla comparsa dei primi boccioli.

Modalità d'impiego: poiche il prodotto non è solubile in acqua, riempire il flacone di alcool anche denaturato, agitare bene fino a che la polvere non si sia bene sciolta, versare poi la soluzione ottenuta nel quantitativo d'acqua richiesto e rimescolare. La soluzione alcolica è stabile per più giorni, quella acquosa soltanto per 24 ore e pertanto va usata subito dopo la preparazione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il GIBOR va usato da solo

Fitotossicità: essendo l'azione dell'acido gibberellico influenzata da vari fattori non tutti noti, gli effetti su di una specie vegetale in determinate condizioni fisiologiche e pedoclimatiche possono non verificarsi su una altra specie in ambiente e in condizioni fisiologiche diverse. Inoltre, a seconda del momento e della dose impiegata, l'acido gibberellico può produrre addirittura effetti opposti a quelli desiderati. Il suo uso pertanto va messo a punto zona per zona, con prove preliminari su piccole superfici.

SOSPENDERE 20 GIORNI PRIMA
DEL RACCOLTO DEGLI AGRUMI

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Dott. ANTONIO BORACCHINI & C. snc
Prodotti Chimici per l'Agricoltura

Via Martiri di Pizzocalvo, 63 - 40068 S. LAZZARO di SAVENA (Bologna) - Telefono 051/468594
Stabilimento produttore: BAM di A. BENAZZI - Via Canalazzo 67 - S. PATRIZIO (Ravenna)

Registrazione N. ...5471... **del** ...14.9.83 **del Ministero della Sanità**

PESO NETTO: GRAMMI 1

5472

STICEREAL 2,4 D - Pso

Diserbante selettivo per i cereali

COMPOSIZIONE: 100 gr. di prodotto contengono:

2,4 D puro (da sale sodico)	47 gr.
Coformulanti	q.b. a 100 gr.

CARATTERISTICHE

Lo STICEREAL 2,4 D-Pso è un diserbante ormonico, in polvere solubile, indicato per il diserbo selettivo dei cereali (grano, orzo, avena, segale, riso) e per il trattamento localizzato contro il romice dei prati. Agisce per assorbimento fogliare, non essendo volatile conferisce ai trattamenti sicurezza anche quando il diserbo viene eseguito vicino alle colture sensibili, è perciò consigliato per il diserbo vicino ad alberi da frutto, vite, ortaggi e colture floreali in genere.

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE: Astenie di grado notevole, aritmie, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO: Abbondante lavaggio gastrico, ossigeno terapie, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

CONTROINDICAZIONI: è sconsigliata la digitale.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lo STICEREAL 2,4 D-Pso distrugge le seguenti malerbe che infestano il grano ed i cereali minori: Artemisia, Ranuncolo, Veccia, Capsella, Cardo, Borsa del pastore, Papavero, Camomilla, Soffione, Equiseto, Senape, Convolvolo, Fiordaliso, Romice, Celidonia, Stellaria, Veronica, Ederella, Rapanello ed Erba morella.

E' impiegato alle seguenti dosi per ettaro:

— Per grano, orzo, avena e segale: 1-2,2 Kg.; intervenendo quando il cereale ha completato l'accestimento (comparsa della sesta foglia sul cumulo principale) sino all'inizio della fase di botticella.
— Per il riso: 1,5-2,5 Kg.; intervenendo ad accestimento completato e fino a qualche giorno prima della levata degli steli.

Adottare le dosi inferiori per le infestanti più sensibili (Veccia, Papavero, Convolvulo) ed in risaia con acqua a basso livello; le dosi superiori contro le infestanti più resistenti (Ranuncolo, Romice, Cardo) e in risaia con acqua a pieno livello (sui 10 cm.).

L'opportuna dose di prodotto va sciolta in un quantitativo d'acqua sufficiente per irrorare uniformemente la superficie da diserbare. Operare con tempo buono ed a temperature non inferiori a 15-18 °C.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con la generalità dei diserbanti esclusi gli oli minerali.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non essendo volatile può essere impiegato anche in vicinanza di colture sensibili. Evitare comunque di colpire direttamente tali colture col diserbante, non operare in presenza di vento ed evitare fenomeni di deriva.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.

Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione: Montalcino - Fraz. Torrenieri (SI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5472 **del** 14.9.83

Peso netto: 1 Kg.

5473

MODALITÀ DI IMPIEGO

Istruzioni per l'uso

160-200 grammi ogni 100 litri di acqua contro:

- le uova estive e le forme mobili del Ragno rosso (**M. ulmi**), anche se appartenenti a ceppi resistenti ai normali acaricidi, sui fruttiferi (pero, melo, pesco, susino, albicocco, ciliegio) e sulla vite. Per colture in serra o con clima freddo impiegare la dose di 250 grammi ogni 100 litri di acqua. Effettuare il trattamento all'inizio dell'infestazione ed eventualmente ripeterlo dopo 3 settimane.
- La Psilla del pero, gli Afidi (**A. pomi, Myzus persicae**), le neanidi delle Cocciniglie di arancio, limone, mandarino e le Cicaline.
- il Ragno rosso (T. **urticae**) su arancio, limone e mandarino, su fragola, melanzana, fagiolo, zucchine, su colture floreali di pieno campo, su pero, melo, pesco, susino, albicocco, ciliegio e sulla vite.

Il MITAC 20 CE può essere impiegato sia a volume normale che a basso volume purché si rispetti la quantità di prodotto per ettaro.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il MITAC 20 CE è miscibile con i più comuni antiparassitari in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ

Il MITAC 20 CE può causare leggere ustioni su peperone e pomodoro; pertanto su queste colture si consiglia di usare il prodotto con precauzione.

RISCHI DI NOCIVITÀ

È nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per le mele e per le pere; 14 giorni per le altre colture.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg 1

MITAC® 20 CE

Acaricida-insetticida liquido emulsionabile, a lunga persistenza. Agisce per contatto, asfissia e penetrazione nei tessuti vegetali.

Mitac ® è un marchio registrato della The Boots Company Ltd., Nottingham, Regno Unito

Composizione

Amitraz puro	g 20,6
Coformulanti	q.b. a g 100

Contiene Xilolo

Classe III

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

The Boots Company Ltd., Nottingham, Regno Unito

Officina di produzione The Boots Company Ltd Nottingham, Regno Unito

Ufficio di rappresentanza
c/o Dr Groppi Luigi
Via Boccaccio 2, Milano

Registrazione del Ministero della Sanità
n 5473 del 3.10.83

NATURA DEL RISCHIO

Sostanze pericolose per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

NORME PRECAUZIONALI

- *conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.*
  Conservare la confezione ben chiusa;
- *Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.*
  Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- *Non operare contro vento.*
  Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
  Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo

Sintomi di intossicazione

Irritazione della pelle e delle mucose
Vomito, cefalea, depressione del sistema nervoso centrale
Possibile alterazione dei valori glicemici

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Togliere gli indumenti contaminati e lavare la pelle abbondantemente con acqua e sapone. Allontanare il paziente dall'ambiente contaminato. In caso di ingestione praticare lavanda gastrica con acqua

In caso di depressione respiratoria ossigenoterapia e respirazione artificiale

Tenere il paziente in osservazione per 24 ore

5474

UNDENE 10 SG

INSETTICIDA

per la lotta contro afidi, larve defogliatrici (ad es. tentredine della rosa) e cocciniglie delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Undene 10 SG contengono:
g 10 di propoxur puro;
coadiuvanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi.
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego:

0,25-0,4% (250-400 g in 100 lt d'acqua) contro gli afidi.
0,5-0,6% (500-600 g in 100 lt d'acqua) contro larve defogliatrici e cocciniglie.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: l'Undene 10 SG può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in floricoltura in pieno campo o in serra: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 5474 **del**

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 500

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5475

BAYCOR BIETOLA

FUNGICIDA SPECIFICO

per la lotta contro la cercospora della barbabietola da zucchero

CLASSE I

VELENO

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor Bietola contengono
g 12,5 di Bitertanolo puro
g 10 di Fentin acetato puro
coformulanti quanto basta a 100.

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto, schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Si raccomanda l'uso di maschere durante l'impiego del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: cefalea occipitale continua o parossistica - ronzii auricolari - iperacusia - vertigini - rachialgia - dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra - ritenzione urinaria - insufficienza respiratoria e di circolo - interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi) - dermatosi.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando — in relazione alla via di contaminazione — abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale - terapia sintomatica.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Barbabietola da zucchero: contro la cercospora: 1,5-2,5 kg/ha in 600-800 lt d'acqua, eseguendo 2-4 trattamenti iniziando alla comparsa dei primi sintomi e distanziandoli a intervalli non superiori a 3-4 settimane a seconda delle condizioni climatiche più o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Baycor Bietola può essere miscelato con insetticidi formulati come polveri bagnabili. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 45 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 5475 **del** 10.10.83

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5476

Negran® S

Diserbante di pre-emergenza per frumento e orzo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
chlortoluron puro g 30
neburon puro g 20
coformulanti q.b. a g 100

CLASSE IV

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: CIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5476 **del** 14.9.83
® marchio depositato

Caratteristiche
Agisce attraverso il terreno, per assorbimento radicale ed è dotato di una persistenza di azione sufficiente a prevenire anche le reinfestazioni tardive da parte di quelle malerbe che germinano alla fine dell'inverno.
È efficace contro infestanti sia graminacee, quali: Alopecurus, Apera, Poa, Lolium e dicotiledoni: Capsella, Cerastium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum, Raphanus, Rumex (solo se nato da seme), Stellaria.
Non controlla infestanti provenienti da organi di propagazione vegetativa quali: Convolvolus, Cirsium, Rumex, Artemisia.

Dosi ed epoche d'impiego
Kg 4-5 per ettaro, secondo la natura del terreno, riservando le dosi più alte ai terreni pesanti o meglio dotati di sostanza organica. Per la distribuzione del prodotto, si utilizza un quantitativo di acqua di 400 litri o più per ettaro.
Il trattamento si effettua solo in pre-emergenza ossia subito dopo la semina o nei primi giorni successivi o comunque ancora prima che inizi l'emergenza della coltura. Il terreno deve essere ben lavorato, sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni d'acqua. I terreni torbosi sono esclusi dal trattamento. Non ripetere il trattamento sulle colture prima di 6 mesi.

Avvertenze
Evitare superdosaggi e accumuli della miscela erbicida. Nei terreni trattati non deve essere effettuata la trasemina con leguminose foraggere. Si sconsiglia di effettuare trattamenti su orzi appartenenti a varietà distiche.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Non è prevista la miscela con altri prodotti.

Fitotossicità
Il trattamento non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli facilmente soggetti a ristagni di acqua nel periodo invernale.
Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni di sofferenza della coltura; si tratta però di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

5477

MICENE® F

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa del melo, del pero, della vite, delle colture floricole ed ornamentali in pieno campo.

Si impiega in trattamenti liquidi contro Ticchiolatura ed Oidio del melo, Ticchiolatura del pero, Peronospora ed Oidio della vite, Oidii, Septorie, Antracnosi, Ruggini, Ticchiolature di colture floricole ed ornamentali.

COMPOSIZIONE

— Fenarimol puro	g	3
— Mancozeb puro	g	60
— Coadiuvanti, Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
VERCHIM ASTERIAS SpA
Ozzano Emilia (BO)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 5477 del 3/10/83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirarne i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Prescrizioni particolari :
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.)

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente é cosciente. Se il paziente é in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubezione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua, irrorati con pompe a volume normale.

POMACEE: contro Ticchiolatura e Oidio del melo, Ticchiolatura del pero : **g 120-150**

VITE: contro Peronospora e Oidio : **g 120-180**

COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI in pieno campo: contro Oidii, Septorie, Antracnosi, Ruggini, Ticchiolature : **g 120-200.**

Intervenire alla prima comparsa della malattia ripetendo i trattamenti secondo necessita'ad opportuni intervalli.

Preparazione della poltiglia: stemperare accuratamente in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Da non impiegare in serre

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità: il prodotto non é compatibile in miscela con sostanze alcaline, come polisolfuri, poltiglia bordolese, calce.
E'miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su alcune cultivar di pero (Butirra Precoce Morettini, Conference, Curato, Principessa di Gonzaga, Zucchermanna, Butirra Clairgeau, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona, Spadoncina, Scipiona, Coscia, Mora, Giardina, Spinacarpi, Armella, S. Maria, Decana del Comizio, Abate Fetel), il prodotto può dar luogo a manifestazioni fitotossiche e pertanto, se ne sconsiglia l'uso.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per le api.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5478

Igraneb® S

Diserbante di pre-emergenza per frumento e orzo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
neburon puro g 29
terbutrina pura g 21
coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Agisce attraverso il terreno, per assorbimento radicale ed è dotato di una persistenza di azione sufficiente a prevenire anche le reinfestazioni tardive da parte di quelle malerbe che germinano alla fine dell'inverno.
È efficace contro infestanti annue da seme quali: Alopecurus, Apera, Phalaris, Capsella, Cerastium, Fumaria, Matricaria, Papaver, Polygonum, Raphanus, Sinapis, Rumex (nato da seme), Stellaria, Veronica, Viola.
Non controlla infestanti provenienti da organi di propagazione vegetativa quali: Convolvolus, Cirsium, Rumex, Artemisia.

Dosi ed epoche d'impiego
Kg 4-5 per ettaro secondo la natura del terreno, riservando le dosi più alte ai terreni più pesanti o meglio dotati di sostanza organica. Per la distribuzione del prodotto si utilizza una quantità di acqua di 400 litri o più per ettaro.
Il trattamento si effettua solo in pre-emergenza ossia subito dopo la semina o nei primi giorni successivi e comunque ancora prima che inizi l'emergenza della coltura. Il terreno deve essere ben lavorato, sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni d'acqua. I terreni torbosi sono esclusi dal trattamento.

Avvertenze
Evitare superdosaggi e accumuli della miscela erbicida.
Nei terreni trattati non deve essere effettuata la trasemina con leguminose foraggere. Si sconsiglia di effettuare il trattamento su orzi appartenenti a varietà distiche.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Non è prevista la miscela con altri prodotti.

Fitotossicità
Il trattamento non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli facilmente soggetti a ristagni d'acqua nel periodo invernale.
Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni di sofferenza della coltura; si tratta però di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: CIFA, Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5478 **del** 14.9.83

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

5479

Igraneb®

Diserbante di pre-emergenza per frumento e orzo.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
neburon puro g 30
terbutrina pura g 20
coformulanti q.b. a g 100

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche
Agisce attraverso il terreno, per assorbimento radicale ed è dotato di una persistenza di azione sufficiente a prevenire anche le reinfestazioni tardive da parte di quelle malerbe che germinano alla fine dell'inverno.
È efficace contro infestanti annue da seme quali: Alopecurus, Apera, Phalaris, Capsella, Cerastium, Fumaria, Matricaria, Papaver, Polygonum, Raphanus, Sinapis, Rumex (nato da seme), Stellaria, Veronica, Viola.
Non controlla infestanti provenienti da organi di propagazione vegetativa quali: Convolvolus, Cirsium, Rumex, Artemisia.

Dosi ed epoche d'impiego
Kg 4-5 per ettaro secondo la natura del terreno, riservando le dosi più alte ai terreni più pesanti o meglio dotati di sostanza organica. Per la distribuzione del prodotto si utilizza una quantità di acqua di 400 litri o più per ettaro.
Il trattamento si effettua solo in pre-emergenza ossia subito dopo la semina o nei primi giorni successivi e comunque ancora prima che inizi l'emergenza della coltura. Il terreno deve essere ben lavorato, sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni d'acqua. I terreni torbosi sono esclusi dal trattamento.

Avvertenze
Evitare superdosaggi e accumuli della miscela erbicida.
Nei terreni trattati non deve essere effettuata la trasemina con leguminose foraggere. Si sconsiglia di effettuare il trattamento su orzi appartenenti a varietà distiche.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Non è prevista la miscela con altri prodotti.

Fitotossicità
Il trattamento non è consigliabile nei terreni molto sabbiosi, ghiaiosi ed in quelli facilmente soggetti a ristagni d'acqua nel periodo invernale.
Dopo l'applicazione del prodotto possono manifestarsi fenomeni di sofferenza della coltura; si tratta però di fenomeni transitori che in condizioni normali scompaiono in breve tempo e non hanno alcuna conseguenza sulla produzione.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano s/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5479 **del** 14.9.83

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg

5480

POLVOSOL CUPRO MZ

ANTICRITTOGAMICO POLIVALENTE PER TRATTAMENTI POLVERULENTI

MANCOZEB PURO g 6 - RAME METALLICO g 6 (SOTTO FORMA DI CLORURO TETRARAMICO) - ZOLFO VENTILATO PURO, (ESENTE DA SELENIO) g 30 - COLORANTI, INERTI QUANTO BASTA A g 100

CLASSE III

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici**
- **conservare la confezione ben chiusa**
- **non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto**
- **non contaminare alimenti, bevande o corsi di acqua**
- **non operare contro vento**
- **evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti**
- **dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- **una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto**
- **conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore**
- **in caso di malessere ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta**
- **Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite ecc.).*

Terapia: *In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.*

DA NON VENDERSI SFUSO

MODALITA' DI IMPIEGO

Il POLVOSOL CUPRO MZ trova specifica applicazione nella lotta contro oidio e peronospora della vite alla dose di 30-50 kg/ha. Si esegue un primo trattamento quando i tralci misurano 5-10 cm di lunghezza, un secondo trattamento prima della fioritura ed altri 3-4 da luglio in avanti.

Il POLVOSOL CUPRO MZ può essere usato anche nelle seguenti colture alle dosi indicate:

- pomodoro (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi, oidio alla dose di 20-25 kg/ha
- pomacee: ticchiolatura, oidio alla dose di 30-50 kg/ha.

Il POLVOSOL CUPRO MZ si impiega di preferenza al mattino quando le piante sono coperte da rugiada. Impolverare quanto basta a coprire uniformemente la superficie fogliare.

Divieto di impiego

- Non impiegare in serra
- Non impiegare su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

Miscibile con insetticidi ed anticrittogamici per trattamenti polverulenti. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Compatibilità: non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.

Avvertenza: deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Non trattare durante la fioritura.

Il prodotto può essere fitotossico per le seguenti varietà di pero: Abate Fetel, Armella, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clargeau, Butirra Giffard, Butirra precoce Morettini, Conference, Contessa di Parigi, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Kaiser Alexander, Mora, Olivier de Serres, Passa Crassana, Principessa di Gorzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, William, Zeccherman-na; per le seguenti varietà di melo: Abbondanza, Belford, Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Gravenstain, Jonathan, King Davis, Imperatore, Morgenduft, Renetta del Canadà, Rome Beauty, Rosa Mantovana, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Winesap; per le varietà di vite Sangiovese. Sulle varietà suddette si sconsiglia l'impiego durante il periodo vegetativo.

In estate non trattare nelle ore più calde.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO - S.p.A.

VIA SCARLATTI 30 • 20124 MILANO • TEL. 270.451 • Telex 320379 SIVAM I

Officina di produzione: Diachem s. p. a. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 5480 del Ministero della Sanità del 10.10.83 PESO: Kg 10

5481

BAZIN 80

Fungicida polvere bagnabile

Composizione:

Zineb puro	gr. 80
Sostanze inerti e coadiuvanti	q b a gr. 100

III CLASSE
ATTENZIONE
manipolare
con prudenza

BASLINI

Industrie Chimiche
Dr. Baslini S.p.A.

Via G. Sorbelloni, 12
Telefono (02) 7782
20122 Milano

Officina di produzione:
VISPLANT-CHIMIREN S.p.A. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 5481 del 3.10.83
del Ministero della Sanità

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

DIVIETO D'IMPIEGO

— divieto d'impiego in serra
— divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
— conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
— in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta
— durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapie: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfo-deidrogenasi. In tale evenienza ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

BAZIN 80 combatte le seguenti malattie

Vite: Peronospora ed Antracnosi - alla dose di gr. 250-300 per 100 lt di acqua.
Pero e Melo: Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria - alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.
Pomodoro (solo fino alla prima fioritura) Peronospora, Alternariosi, Septoriosi, Cladosporiosi, Antracnosi - gr. 300-400 per 100 lt. di acqua.
Garofano in pieno campo: Ruggine - alla dose di gr. 200-300 per 100 lt. di acqua.
Pioppo: Ticchiolatura - alla dose di gr. 250-300 per 100 lt. di acqua.
Tabacco: Peronospora tabacina - alla dose di gr. 250-300 per 100 lt di acqua, in semenzaio - alla dose di gr. 250 per 100 lt di acqua, in pieno campo.
Il BAZIN 80 si versa nel totale quantitativo di liquido rimescolando energicamente per alcuni minuti fino a formazione di una poltiglia omogenea. Irrorare bene le piante affinchè il prodotto possa distribuirsi uniformemente su tutte le superfici da proteggere.
Si consiglia di aggiungere gr. 100 di PRUNIG ogni 100 lt. di miscela.

Da non applicare con mezzi aerei.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.

COMPATIBILITA'

Lo BAZIN 80 è compatibile con i prodotti con cui normalmente viene consigliata l'unione (bagnante - Parathion - Ossicloruro) e con i più noti similari della concorrenza.
Non miscelare con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Si sconsiglia l'impiego di prodotto sulle varietà di Pero sensibili allo BAZIN 80 quali ad esempio: Abate Fétel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana Del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'Estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 25

5482

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

BORDOVIT

Polvere tipo Bordolese per la lotta contro la Peronospora e contro l'Occhio di pavone
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 20 Rame metallico (sottoforma di solfato basico di rame).
Coformulanti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali. domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il BORDOVIT è un fungicida rameico dotato di lunga persistenza di azione e resistenza al dilavamento, per:
— Vite, Pomodoro, Patate, Cipolla: contro Peronospora.
— Olivo: contro Occhio di pavone.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Kg. 1/hl. d'acqua ad intervalli di 8-12 giorni.
Sciogliere la dose in poca acqua, versare nell'irroratrice, e portare a volume agitando.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.08
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 5482 **Ministero della Sanità del** 3.10.83

12 / 1982

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con Sofril 80, Benlate, Karathane LC, Kelthane MF, Metilon 20, Zolone Liquido 25, Zolone PB 25, Lannate 25, Naftil.

Per quanto riguarda la miscela con Karathane PB oppure con Parafene Rosso, onde ottenere la migliore compatibilità, è necessaria l'aggiunta del Bagnante Adesivo Etaldyn seguendo queste modalità:
— stemperare in acqua il prodotto indi versare nell'irroratrice già riempita a metà;
— aggiungere Etaldyn a gr. 50/hl;
— aggiungere il Karathane PB oppure il Parafene Rosso e portare a volume agitando.

Per miscele con esteri fosforici (Parafene, Metilon, Zolone) aumentare la loro dose del 20% ed irrorare le miscele appena pronte.

AVVERTENZA:

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare durante la fioritura.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso del trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5484

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ERISAN

Fungicida organico
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 40 di Mancozeb puro
Gr. 25 di Captan puro
Sostanze inerti q.b. a 100

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca: bruciori esofagei, nausea, conati di vomito, coliche addominali, diarrea, apatia, irritazione nervosa, aritmia, cianosi, collasso cardiocircolatorio.*

Il contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale (dermatite, fotodermatosi, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia. *In caso di ingestione provocare il vomito; lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua); il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se esistono lesioni gastroesofagee. Inoltre, digitale, purganti salini, cure sintomatiche.*

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*

APPLICAZIONI

L'**ERISAN** e un fungicida organico raccomandato per la lotta contro la **ticchiolature** delle pomacee.

Dosi d'impiego: gr. 200-300/hl

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA

DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è miscibile con prodotti della nostra gamma ad eccezione degli olii e degli zolfi. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, etc.). La sua applicazione deve rispettare un intervallo di 3 settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITA'

Varietà di pere sensibili al prodotto Abate Fetel, Armellà, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna, Butirra d'Anyou, Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi, Trionfo di Vienna.

Il prodotto inoltre può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo: (Stark delicious, Winesap, Stayman, Renetta del Canadà) per le quali si sconsiglia

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 83.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 5484 **Ministero della Sanità del** 3.10.82

12 / 1982

Contenuto netto kg.

5485

TOXENE L

Insetticida liquido solubile

COMPOSIZIONE:

— TRICLORFON puro gr. 39,6

— Solvente ed adesivanti q.b. a gr. 100

Contiene: Glicoletilenico.

CLASSE TOSSICOLOGICA: III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
- conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg. per bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa dei fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)

IL TOXENE L è un insetticida che agisce per ingestione, viene impiegato su:

Drupacee: contro la mosca delle ciliegie e della frutta gr. 150-250.

Olivo: contro la mosca delle olive (nei trattamenti in prossimità del raccolto 15-20 gg. prima): gr. 300-350 contro tignola dell'olivo gr. 250.

Barbabietola: contro la mosca della bietola, contro le nottue gr. 200-300.

Vite: contro la tignola dell'uva, l'eulia gr. 200-250.

Radici e tuberi da alimentazione: contro la mosca del sedano e dorifora della patata gr. 200-300.

Cereali: riso - contro coppetta, idrocampo, chironomidi ed altri insetti della risaia Kg. 1-1,2 Ha. Occorre mantenere il livello dell'acqua per 2-3 gg. a 4-6 cm. dopo il trattamento.
Colture forestali: contro l'ozziorinco del pioppo e la processionaria del pino gr. 350-500.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: il TOXENE L è incompatibile con le poltiglie solfocalciche e bordolesi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compita.

RISCHI DI NOCIVITA': è tossico per gli animali domestici, insetti utili e bestiame. Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 10 giorni. Non preparare la soluzione in prossimità di corsi d'acqua.

INTERVALLO: osservare un intervallo di 10 gg. tra l'ultimo trattamento e la raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

S.C.A.M. srl MODENA
Officina di Produzione: SCAM - MODENA
Reg. Min. Sanità N. 5485 del 3.10.83

DA NON VENDERSI SFUSO.

Peso Netto Kg. 25

5486

ATRAFLO

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FORMULAZIONE FLOWABLE: Erbicida specifico per il diserbo del mais e del sorgo.

COMPOSIZIONE
100 Grammi di prodotto contengono:
Atrazina pura gr. 42,75
Bagnanti, disperdenti, coadiuvanti e solventi quanto basta a 100 grammi.
Contiene «Glicole etilenico»

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
— Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
L'ATRAFLO è un erbicida specifico per il diserbo del mais e del sorgo.
Agisce per contatto e per assorbimento radicale contro le più dannose malerbe annuali monocotiledoni e dicotiledoni, quali: giavone, borsa pastore, erba morella, amaranto, farinello, poa, persicaria, mercorella, stellaria.
Le malerbe ed apparato radicale rizomatoso ed in genere quelle perenni (Vilucchio, Gramigne, Sorgo selvatico) nonché le Setarie, la Digitaria ed il Giavone americano sono resistenti all'ATRAFLO.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Kg. 4 - 6/Ha in 600-1000 litri di acqua. Effettuare il trattamento preferibilmente in pre-emergenza, subito dopo la semina. Qualora cause impreviste (stagione avversa, altri impegni di lavoro) fanno ritardare l'intervento in pre-emergenza, il diserbo si può fare anche alla nascita del mais e del sorgo oppure in post-emergenza.
Una buona sistemazione del terreno ed un suo buon tenore in acqua facilitano l'azione diserbante del prodotto ed assicurano un ottimo risultato.
Nei terreni torbosi o comunque ricchi di humus, si esclude l'impiego dell'ATRAFLO in pre-emergenza e si consiglia il trattamento in post-emergenza alla dose consigliata, con l'aggiunta di Lt. 5 di Paramon 80 in 600-1000 litri di acqua.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose di prodotto stabilito nel quantitativo d'acqua necessaria al trattamento, mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non dà luogo a fenomeni di incompatibilità in miscela con altri prodotti antiparassitari.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
L'ATRAFLO è fitotossico per tutte le colture non indicate in etichetta e soprattutto per il mais tardivo di secondo raccolto. Sono raccomandati in tal caso trattamenti al mais localizzati sulle file e non in pieno campo.

Avvertenze: Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es.: bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano - via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
CHEMIA SPA - Stabilimento di S. Agostino (FE) - Strada Statale 255 - km. 46

Registrazione N. 5485 del 3.10.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 5

5487

GEOTAN

(INSETTICIDA MICROGRANULARE)

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
— MALATHION puro . . . . g 3
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

CLASSE IV

Norme precauzionali: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici d imassima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Caratteristiche: il **GEOTAN** viene impiegato contro gli insetti delle colture floricole intensive in pieno campo e in serra. In particolare è efficace contro gli insetti terricoli quali: larve di elateridi, maggiolini, grillotalpa, larve di lepidotteri, agrotidi e di tipule.
Dosi e modalità di impiego: si impiega alla dose di 30-50 g ogni 10 m2, spargendo il prodotto uniformemente sul terreno.
Trattamento localizzato del terreno: distribuire lungo le file pronte per la semina 10-15 g di prodotto ogni m2. Per il trattamento delle aiuole e dei vasi spargere il prodotto in ragione di g 2 per m2 e interrare subito. Per il trattamento delle singole piantine, al momento del trapianto interrare alla base di ciascuna 1 g di prodotto.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Rischio di nocività: il prodotto è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e gli insetti utili. E' necessario pertanto far trascorrere 20 giorni dal trattamento prima di far pascolare il bestiame sulle zone trattate ed alimentarlo con vegetali che direttamente o accidentalmente siano venuti a contatto con il prodotto.

**« SOSPENDERE IL TRATTAMENTO
20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA »**

« **Attenzione**, da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. » Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. 5487 **del** 3.10.83

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g 300**

BIMEX S.p.A. - Farmochimica
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

Officina di produzione **bimex s.p.a. - isola vicentina (vi)**

5488

SEMISAN

(INSETTICIDA IN POLVERE SECCA)

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
— MALATHION puro . . . . g 1
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

CLASSE IV
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici d imassima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Caratteristiche: insetticida per la disinfestazione delle sementi da fiore, piante ornamentali e boschive.

Uso e dosi e modalità di impiego: contro punteruoli, tignole, tonchi, triboli nei locali di conservazione. Mescolare accuratamente 1 g di prodotto per ogni chilo di sementi da conservare con pale o con apposite attrezzature.

Avvertenze: i semi trattati e residuati dalla semina **non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.**

Compatibilità: il prodotto va usato da solo.

Rischi di nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

« **Attenzione**, da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Non impiegare su colture destinate ad alimentazione.
Chi impeiga il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. » Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. 5488 del 3.10.83

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso kg 1**

BIMEX S.p.A. - Farmochimica
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

Officina di produzione **bimex s.p.a. - isola vicentina (vi)**

5489

CERESIVAM MZ

ANTICRITTOGAMICO POLICOMPOSTO PER LA DIFESA DEI CEREALI

ZOLFO COLLOIDALE PURO (ESENTE DA SELENIO) g 20 · MANCOZEB PURO g 50 · BAGNANTI, DISPERDENTI, INERTI QUANTO BASTA A g 100

Classe III

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- conservare la confezione ben chiusa
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- non contaminare alimenti, bevande o corsi di acqua
- non operare contro vento
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto
- conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore
- in caso di malessere ricorrere al medico, mostrandogli questa etichetta
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite ecc.).*
Terapia: *in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.*

MODALITA' DI IMPIEGO
Il CERESIVAM MZ trova impiego nella difesa dei cereali in campo, e del frumento in particolare, dalle malattie crittogamiche, quali oidio, ruggine, septoriosi e fusariosi.
Il CERESIVAM MZ si impiega alla dose di 4 kg/ha in 600-800 litri di acqua, impiegando le normali barre orizzontali utilizzate per il diserbo. L'epoca più opportuna per il trattamento è quella che va dall'inizio della spigatura alla fine della fioritura.
Il CERESIVAM MZ, in caso di contemporanei attacchi di afidi o Aelia rostrata (cimice) si impiega in miscela con DIETOL 40 o FOSMAL 50 contro i primi e con DIETOL 40 o SIVAMCARB contro le seconde.

Divieto di impiego
- divieto di impiego in serra
- divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltigli bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.
Avvertenze: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.
In caso di miscele con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste o possibili prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIVAM FITOCHIMICA

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO - S.p.A.
VIA SCARLATTI 30 • 20124 MILANO • TEL. 270.451 • Telex 320379 SIVAM I
Officina di produzione: Diachem s.p.a. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 5489 del Ministero della Sanità del 3.10.83

PESO: Kg 1

5490

GERMOSTOP

Antigermogliante per patate

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):

PROPHAM puro	g 0,9
Coformulanti	q.b.a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione: *Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.*

Controindicazioni: *Le ossime (PAM, Contrathion; ecc.) che potrebbero essere nocive.*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

CAFFARO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione Ministero della Sanità n.5403 del 3.10.83

CARATTERISTICHE

Il GERMOSTOP è un formulato in polvere secca molto fine, studiato per la distribuzione uniforme sulle patate da tavola, di cui impedisce la germinazione durante la conservazione, evitandone il deterioramento.
Il GERMOSTOP sostituisce l'eliminazione manuale dei germogli evitando inoltre il calo di peso dovuto alla formazione ed allo scarto degli stessi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Distribuire g 200/q di tuberi, curando di cospargere uniformemente il prodotto a partire dal suolo, quindi sugli strati successivi di tuberi, ogni 25-30 cm. circa di spessore, fino al completamento del mucchio.
Dopo il trattamento, coprire i mucchi con teloni, carta o sacchi. Qualora l'immagazzinamento venisse eseguito in cassette, è consigliabile rivestire preventivamente l'interno delle cassette con carta.
Si consiglia di eseguire il trattamento su tuberi completamente asciutti, all'atto dell'immagazzinamento.

AVVERTENZE

- Non trattare patate da seme ne conservare le stesse nei locali dove sono conservate patate trattate con GERMOSTOP.
- Non trattare patate appena estirpate.
- Garantire ai locali d'immagazzinaggio una conveniente aerazione e protezione dalle gelate.
- Le patate trattate, prima dell'immissione al commercio dovranno essere spazzolate, arieggiate o sottoposte a lavaggio.

N.B. Il GERMOSTOP non conferisce alcun odore o sapore alle patate trattate.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del consumo.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO kg 1

5491

(ETICHETTA)

GIBREX

FITOREGOLATORE.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Registrazione Ministero della Sanità
n. 5491 del 3.10.83

Leggere con attenzione e conservare il foglio d'istruzioni accluso.

AGRICO s.r.l.
Viale Masini, 20 - Bologna

g. 1

Composizione:
100 g. di prodotto contengono:
Acido gibberellico puro g. 90

IV CLASSE

Colture: Carciofi, fragole, patate, peri, aranci, limoni, clementini e mandarini.

(ASTUCCIO)

GIBREX

Fitoregolatore

IV CLASSE

Composizione:
100 g. di prodotto contengono:
Acido gibberellico puro g. 90

Tipo di formulazione: polvere solubile in alcol.

Stabilimento produttore:
STI - Solfotecnica Ital.
Torrenieri (SI)

Reg. Mininistero Sanità n. 5491 del del 3.10.83

AGRICO
s.r.l.
v.le Masini, 20 - Bologna

Leggere con attenzione e conservare il foglio d'istruzioni accluso.

g. 1

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

GIBREX

Fitoregolatore.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche: Fitoregolatore ad azione stimolante. La formulazione è una soluzione stabile, conservabile nel tempo e contiene un agente di penetrazione che favorisce l'assorbimento del principio attivo da parte delle piante.

Colture: Carciofi, fragole, patate, peri, limoni, clementini e mandarini.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E' comunque consigliabile impiegarlo da solo. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il grande numero di varietà per le diverse specie vegetali rende impossibile una trattazione specifica; si consigliano prove preventive.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta per gli agrumi.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

5492

(FOGLIETTO ILLUSTRATIVO)

GIBRETAB

FITOREGOLATORE

Composizione:

Acido gibberellico puro . . g. 9

Coformulanti q.b. a g. 100

Tipo di formulazione: compresse effervescenti solubili in acqua

IV CLASSE

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: Fitoregolatore ad azione stimolante. **Sui semi**, diminuisce la durata della germinazione; **sui fiori**, favorisce l'allegagione, contrasta i danni delle gelate, induce la partenocarpia; **sulle piante**, induce precocità di fioritura e di maturazione, ne accresce lo sviluppo con maggior pezzatura dei frutti, annulla l'alternanza della produzione, aumenta le dimensioni ed il colore dei fiori, favorisce il ricaccio delle foraggere.
Il prodotto, grazie alla sua particolare formulazione che lo rende direttamente solubile in acqua e alla sua presentazione in compresse effervescenti è di **pronto impiego e di facile uso.**

Avvertenza. I risultati dell'applicazione del prodotto dipendono in modo determinante dallo stato fisiologico delle piante, dallo stadio di sviluppo, dalle varietà, dalle condizioni climatiche, dal suolo ed in genere dalle situazioni locali. E' pertanto impossibile indicare condizioni standardizzate d'impiego, ma solo suggerire indicazioni di massima lasciando al coltivatore la messa a punto caso per caso con prove preliminari su piccola scala.

Colture, dosi ed epoche d'impiego.
Carciofi: Per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 1-2 co/hl impiegando 4-5 hl/ha, per le **prime produzioni**, alla formazione del capolino centrale e ripetendo alla dose minore dopo la prima raccolta e per le **successive produzioni**, 20 giorni prima del periodo in cui s'intende concentrare il raccolto. Irrigare prima o subito dopo il trattamento. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette. **Fragole:** Per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 2-4 co/hl impiegando 5-8 hl/ha, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Gorella, Pocahontas, Red Gauntlet, Cambridge Favourite, Surprise de Halles. Nelle zone solite a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore. **Patate:** Per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 1/10 co/hl in caso di tuberi sezionati e 1/2 co/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione.

Frutti
Pero: Per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 1-2 co/hl impiegando 10 hl/ha quando il 20-30% di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 90% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori, trattare entro le 48 ore alla dose di 2-2,5 co/hl impiegando 10-15 hl/ha; in caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Passacrassana, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, Coscia, William, Spadona, Gentilona, Spadoncina, Buona Luisa d'Avranches. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare. **Arancio:** Per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 1-2 co/hl impiegando 50 hl/ha, dopo l'invaiatura. **Limone:** Per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 1-2 co/hl prima dell'invaiatura. **Clementini e mandarini:** Per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione, si tratta alla dose di 1 co/hl bagnando completamente le piante, in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini.

Metodi d'impiego. Al momento dell'uso sciogliere la compressa o parte di essa in poca acqua, lasciando riposare per circa 5 minuti, cessata l'effervescenza. La soluzione concentrata va portata alla diluizione voluta e utilizzata in giornata.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E' comunque consigliabile impiegarlo da solo o con l'aggiunta del fertilizzante fogliare FERTIFOL e con il BAGNANTE AGRICO che ne facilita l'assorbimento. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità.
Il grande numero di varietà per le diverse specie rende impossibile una trattazione specifica; si consigliano prove preventive. Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero, specie nella varietà Decana del Comizio. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle improvvise variazioni climatiche.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto per gli agrumi.

Attenzione! Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

Grammi 10.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Leggere con attenzione e conservare questo foglio di istruzioni.

AGRICO **s.r.l.**

Viale Masini, 20 - BOLOGNA

Stabilimento di produzione:
CEQUISA - Barcellona (Spagna)

Stabilimento di confezione:
B.A.M. - San Patrizio (RA)

Registrazione Ministero della Sanità, n. del

5493

DODINA 65

FUNGICIDA

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

Dodina pura	g 65
Coformulanti	q.b. a g 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi resistenti alle terapie a causa della fotosensibilizzazione. Possibilita di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro) e digitale.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: attivo per contatto con azione preventiva ed eradicante; azione curativa per translaminarità.
Colture protette: arboree da frutto (pero, melo, ciliegio) e forestali (pioppo). Ortive (cipolla). Ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra.
Malattie o parassiti combattuti: ticchiolatura, peronospora, marsonnina, alternaria, antracnosi, fusariosi, septoriosi.
Concentrazione e dosi d'impiego: g. 70-100/hl per interventi a carattere preventivo; g 100-120/hl per interventi curativi.

Epoche d'impiego: per trattamenti a carattere preventivo, secondo i calendari adottati; per i trattamenti a carattere curativo eradicante, entro 48 ore dalla pioggia infettante. Ripetere il trattamento in funzione dell'infezione e a seconda dell'andamento stagionale.

Metodi d'impiego: Il prodotto va stemperato a parte in poca acqua e poi vuotato nel totale quantitativo di liquido. Va distribuito in modo da coprire interamente e uniformemente la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari; non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilanzifos, DDVP; le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con oli minerali possono dar luogo a scarsa sospensività; evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%. Si consiglia di non impiegarlo con temperature prossime allo zero e quando l'umidità relativa raggiunga valori elevati.

Rischio a seguito del trattamento: Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame e pesci.

Avvertenze: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 10 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

AGRICO s.r.l.
Viale Masini, 20 - BOLOGNA

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg. 1**

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - OZZANO EMILIA (Bo)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 5493 **del** 3.10.83

5494

GIBRELIN

FITOREGOLATORE IN SOLUZIONE STABILE

Composizione:

Acido gibberellico puro . . . . g. 1,8
Coformulanti . . . . q.b. a g. 100

IV CLASSE

AGRICO s.r.l.
Viale Masini, 20 - 40126 BOLOGNA

Stabilimento produttore:
STI - Solfotecnica Ital.
TORRENIERI (SI)

Registrazione del Ministero della Sanità
n. 5494 **del** 3.10.83

cc. 250

NORME PRECAUZIONALI.

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE.

In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Avvertenza: I risultati dell'applicazione del prodotto dipendono in modo determinante dallo stato fisiologico delle piante, dallo stadio di sviluppo, dalle varietà, dalle condizioni climatiche, dal suolo e in genere dalle situazioni locali. E' pertanto impossibile indicare condizioni standard d'impiego, ma solo suggerire indicazioni di massima lasciando al coltivatore la messa a punto caso per caso con prove preliminari su piccola scala.

Colture, dosi ed epoche d'impiego

Carciofi: per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, nel caso di 2 trattamenti si tratta con 50 cc/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo dopo 15 giorni; nel caso di 4 trattamenti con 25 cc/hl al differenziarsi del primo capolino e ripetendo i trattamenti ogni 15 giorni. Impiegare 4-5 hl/Ha di soluzione. Irrigare prima o subito dopo i trattamenti. In caso di gelate, per stimolare la ripresa della coltura, trattare con 50 cc/hl quando la temperatura è ritornata ai valori normali e le piante si sono riprese. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono quelle a capolini verdi, meno bene quelle violette. **Fragole:** per anticipare e concentrare il periodo di raccolta, si tratta alla dose di 100-200 cc/hl impiegando 5-8 hl/Ha, 4-6 settimane prima del periodo di normale fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Gorella, Pocahontas, Red Gauntlet, Cambridge Favourite, Surprise des Halles. Nelle zone soilte a freddi improvvisi, si sconsiglia di anticipare la produzione e quindi l'impiego del fitoregolatore. **Patate:** per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme, s'immergono per 10 minuti in una soluzione di 5 cc/hl per tuberi sezionati e 25 cc/hl per tuberi interi, asciugando e seminando subito dopo. Per i tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pregerminazione

Frutti

Pero: per migliorare l'allegagione nelle varietà di difficile impollinazione o partenocarpiche, si tratta alla dose di 50-100 cc/hl impiegando 10 hl/Ha quando il 20-30% di fiori sono aperti nelle aree settentrionali e quando il 80% dei fiori sono aperti nelle aree meridionali. In caso di gelate durante la fioritura, per contrastare i danni da sterilità dei fiori, trattare entro le 48 ore alla dose di 100-125 cc/hl e impiegando 10-15 hl/Ha; in caso di gelate a fiore chiuso, attendere per trattare la piena fioritura. Le varietà che meglio rispondono al trattamento sono: Passa crassana, Trionfo di Vienna, Butirra Giffard, Coscia, William, Spadona, Gentilona, Spadoncina, Buona Luisa d'Avranches. Si sconsiglia l'impiego sulla varietà Decana del Comizio. **Dosi eccessive** possono modificare l'aspetto dei frutti e ridurre la fioritura dell'anno successivo mentre **trattamenti tardivi** inducono un eccessivo sviluppo della parte fogliare. **Arancio:** per migliorare la qualità della buccia, si tratta alla dose di 50-100 cc/hl impiegando 50 hl/Ha, dopo l'invaiatura. **Limone:** per ritardare la raccolta e ridurre la presenza di frutti piccoli, si tratta alla dose di 50 cc/hl, prima dell'invaiatura. **Clementini e mandarini:** per migliorare l'allegagione, specie negli ibridi di scarsa produzione, si tratta alla dose di 50 cc/hl in piena fioritura per i mandarini e quando i 2/3 dei petali dei fiori sono caduti per i clementini, bagnando completamente le piante.

Metodi d'impiego. Al momento dell'uso, sciogliere la quantità prevista di prodotto in poca acqua e diluire poi il tutto. La soluzione acquosa è instabile e va utilizzata in giornata.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità. Il prodotto è tecnicamente miscibile con i prodotti a reazione neutra. E' comunque consigliabile impiegarlo da solo. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità. Il prodotto può indurre deformazioni indesiderate sui frutti del pero. La forzatura chimica rende le colture maggiormente sensibili alle variazioni climatiche.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima della raccolta per gli agrumi.

Attenzione! Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO

5495

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Siltylate A Pasta

DISERBANTE PER IL MAIS IN COLTURA NORMALE E IN SECONDO RACCOLTO

Registrazione Ministero Sanità n. 5495 del 10.10.83

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Butylato puro	g. 63
— Atrazina pura	g. 13,5
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicazioni alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione. I solventi presenti nel formulato possono provocare gravi lesioni epatiche, renali e a carico del sistema nervoso centrale e periferico, che richiedono idonee terapie sintomatiche.

CARATTERISTICHE
Il SILTYLATE A PASTA è un formulato costituito dalla miscela di due principi attivi con caratteristiche erbicide complementari. Ha una persistenza abbastanza limitata nel terreno e questa sua caratteristica lo rende indicato sia nelle colture di mais a ciclo normale, sia per il mais di secondo raccolto (a breve ciclo vegetativo e generalmente seminati tra giugno e luglio), perché rende possibile la semina autunnale del frumento diminuendo i rischi derivanti dalla presenza di residui di atrazina nel terreno.
E' inoltre caratterizzato da una marcata azione sulle graminacee annuali resistenti all'atrazina incluso il Panicum dichotomiflorum (Panico americano).
Il prodotto distrugge infatti le più diffuse e dannose infestanti annuali monocotiledoni e dicotiledoni fra le quali il Panicum spp. (Giavone), Amarantus spp. (Amaranto), Polygonum persicaria (Persicaria), Sorghum halepense (Sorghetta) da seme, Polygonum aviculare (Correggiola), Poa annua (Gramigna delle vie), Urtica spp. (Ortica), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Stellaria media (Centocchio), Solanum nigrum (Erba morella), Geranium spp. (Geranio), Mercurialis annua (Mercurella), Veronica spp. (Morso di gallina, Veronica querciola), Plantago spp. (Piantaggine), Matricaria spp. (Camomilla), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Chenopodium album (Farinaccio).
Il SILTYLATE A PASTA agisce per assorbimento radicale e svolge un'azione erbicida ottimale quando il terreno è in tempera. Può essere impiegato in tutti i terreni tranne quelli molto ricchi in sostanza organica o torbosi.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il SILTYLATE A PASTA va impiegato alla dose di 6 Kg./ha diluito nel quantitativo di acqua utile per una uniforme distribuzione sul terreno (dose media 6-8 hl./ha) prima della semina della coltura.
Dopo il trattamento è necessario procedere al suo incorporamento nel terreno, mediante fresatrice, erpice a dischi, erpice a denti (in quest'ultimo caso si consiglia un passaggio incrociato) od altro attrezzo similare. Questa operazione deve essere molto superficiale (4-8 cm.). Tale lavoro di incorporamento, che può identificarsi anche con l'ultimo affinamento del terreno prima della semina, deve essere eseguito non oltre 2-3 ore dopo la distribuzione del prodotto, allo scopo di non perdere per evaporazione nessuna aliquota di formulato.
Dopo la semina risulta utile una rullatura del terreno, specialmente nel caso di impiego di una seminatrice di precisione, per favorire l'aderenza del seme al terreno e, di conseguenza, la nascita della coltura.

CONSIGLI PRATICI
L'incorporamento nel terreno deve seguire alla distribuzione del prodotto nel più breve tempo possibile, operando di preferenza nel periodi in cui il terreno è più fresco (ore del mattino). Anche l'uniformità di incorporamento e la finezza del terreno contribuiscono all'ottenimento dei risultati più favorevoli.
Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.
Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere usato in miscela o contemporaneamente con altri erbicidi solo se espressamente consigliato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture diverse da quelle indicate in etichetta (Mais). Evitare che venga a contatto con le colture vicine ai campi trattati. In caso di dubbio o di varietà poco diffuse o di recente acclimatazione si consiglia di eseguire preventive prove parcellari.

SI RICORDA CHE DAL TRATTAMENTO ERBICIDA ALLA SEMINA DELLE COLTURE SENSIBILI, SUCCESSIVE AL MAIS, OCCORRE UN INTERVALLO DI 5 MESI PER IL FRUMENTO E DI ALMENO 10 MESI PER ALTRE COLTURE (ES. BARBABIETOLA, TABACCO).

ATTENZIONE: NON RIPETERE IL TRATTAMENTO PRIMA DI 7 MESI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.

CONTENUTO **LT. 1**

prodotto nello stabilimento di

SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

5496

Classe III

MALADUST TERRA

Insetticida

Composizione:
gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 4 di MALATHION puro
q.b. a gr. 100 di supporti

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
Morfina, teofillina, aminifillina, coramina, latte, olio e grassi.

Il MALADUST TERRA serve per disinfestazioni, a mezzo di polverizzazioni, su stagni, prati, siepi.

Dosi e modalità d'impiego:
E' sufficiente mezzo Kg. di prodotto per 100 mq. di superficie da disinfestare o proteggere. Per le polverizzazioni usare normali polverizzatori.

Da non applicare con mezzi aerei.
Non si prevedono miscele con altri formulati.

Rischi di nocività:
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Sede legale: BOLOGNA - Via Clavature, 22
Officina di produzione e sede amministrativa: FAENZA - Via S. Silvestro, 1

Registrazione Ministero della Sanità n. 5496 del 3.10.83

DA NON VENDERSI SFUSO **SARIAF** S.p.A. **Peso Kg. 1**

5497

MELAN ENOTRIA EC

INSETTICIDA EMULSIONABILE SISTEMICO

Composizione:

— Monocrotofos puro .	. . gr. 14
— Emulsionanti e solventi . (contiene Xilolo)	q.b. a gr. 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio: interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti; 0,2-1 mg. per i bambini) ogni 10 minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'Atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il MELAN ENOTRIA EC è un fosforganico specifico per il controllo di insetti ed acari che infestano le colture agricole. Agisce per ingestione e per contatto con notevoli proprietà sistemiche che gli consentono di diffondersi rapidamente all'interno delle colture trattate, gr. 200-250 per ogni 100 litri d'acqua.

Agrumi: Tignola o Verme della zagara, Cacoecia, Acari e Cocciniglie.

Pomacee (Melo - Pero): Carpocapsa, Minatrici, Psilla, Afidi, Tortricidi e Acari.

Vite: Cicaline, Tignola e Tignoletta e Acari.

Olivo: Tignola.

Cavoli: Nottue, Afidi.

Patata: Nottue, Acari e Afidi.

Tabacco: Acari e Afidi.

Pioppo: Afidi.

Garofano (in pieno campo e/o in serra): Bega del garofano, Tripidi, kg. 6-7/ettaro in 800-1000 litri d'acqua.

Mais: Piralide, kg. 1,5-2,5/ettaro in 500-800 litri d'acqua.

Barbabietola da zucchero: Cleono, Lixo, Altica, Mosca, Nottue e Afidi.

« Da non applicare con mezzi aerei ».

Compatibilità: il MELAN ENOTRIA EC è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina (Polisolfuri e Poltiglia Bordolese).

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: da non usare sulla cultivar di melo Golden Delicious. Su Ciliegio e Mele del gruppo Delicious rosse prima dell'uso interpellare la Società.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta; sugli agrumi 75 giorni.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione N. 5497 del [illegible] del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 1

5498

BAYLETON TOTAL PR

FUNGICIDA SISTEMICO SPECIFICO

per la lotta contro peronospora e oidio della vite

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayleton Total PR contengono:
g 1,5 di Triadimefon puro;
g 10 di Metalaxil puro;
g 40 di Propineb puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Caratteristiche: il Bayleton Total PR è un fungicida specifico per la lotta combinata contro le due principali malattie della vite: peronospora ed oidio.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari
— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi e latte.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10 hl d'acqua/ha).
0,2-0,25% (200-250 g/100 lt d'acqua) fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervallo di 14-15 giorni.
0,25-0,3% (250-300 g/100 lt d'acqua) dopo l'allegagione ampliando l'intervallo fra i singoli trattamenti a 16-18 giorni.
Mantenere la cadenza più stretta (14-15 giorni) qualora perdurassero delle condizioni ambientali particolarmente favorevoli allo sviluppo delle malattie sopraindicate.

Divieti d'impiego
— Divieti d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non impiegare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici a reazione neutra di più comune impiego. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione n. 5498 **del Ministero della Sanità**

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 25

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5499

ROOTING LIQUIDO

RADICANTE ORMONICO PER TALEE DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Composizione (Rif. a g 100):
NAA (acido alfa-naftalenacetico) puro .... g 1
diluenti .... q.b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento. Evitare di respirare i vapori.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO:

Preparare le talee nel modo usuale e immergere l'estremità inferiore per una lunghezza da 1 a 2 cm. in una soluzione contenente da 2 a 10 cc. di prodotto per litro d'acqua, lasciandole per 18-24 ore. Estrarre le talee e sciacquarle bene con acqua per togliere l'eccesso di soluzione, infine piantarle subito a una profondità leggermente superiore del normale.

Talee legnose: diluire cc. 10 di ROOTING LIQUIDO in un litro d'acqua.
Talee non del tutto lignificate: diluire cc. 5 di ROOTING LIQUIDO in un litro d'acqua.
Talee erbacee: diluire cc. 2,5 di ROOTING LIQUIDO in un litro d'acqua.
Compatibilità: il prodotto non va miscelato con altri formulati.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

Industria Chimica Farmaceutica
Via Correggio, 45 - 20149 MILANO

DA NON VENDERSI SFUSO

Off. di prod.: Laboratori Chimici CIFA - Caravaggio (Bg)
Registrazione del Ministero della Sanità N. 5499 del 18-10-83

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Oltre alle consuete norme igieniche, proteggere gli occhi quando si maneggia il prodotto concentrato, o lo si applica in ambienti chiusi.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Il 'NIMROD' WP è un fungicida efficace contro l'oidio del melo, del pesco, della rosa e del melone.
Ha proprietà sistemiche e translaminari con azione preventiva e curativa, manifesta attività fumigante.
Si diffonde entro la lamina fogliare verso l'apice e i margini.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO (riferite a 100 litri di acqua)

Contro l'oidio del
- Melo g 30 - 60
- Pesco g 30 - 60
- Rosa in pieno campo: G 150 -300
- Melone g 30 - 120

N.B. - Salvo che nell'impego su nelo, si consiglia di unire alla miscela pronta il bagnante 'AGRAL' in ragione dello 0,1%. Bagnare bene. Impiegare la dose più alta nel caso di forte infestazione.

ICI Solplant SpA

"NIMROD" WP

Fungicida in polvere bagnabile ad azione diretta e translaminare per la difesa di: melo, pesco, rosa, melone contro il mal bianco (Oidio).

COMPOSIZIONE

Bupirimate puro	g 23,75
Emulsionanti, diluenti, bagnabti	q.b. ag 100

EPOCA DI INTERVENTO

Melo	- Prefioritura
Pesco	- Ad inizio della vegetazione
Rosa, Melone	- Inizio comparsa della malattia

Successivamente: ad intervalli di 7-14 giorni o secondo l'andamento della malattia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ

È compatibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi impiegati in frutticoltura e floricoltura. È compatibile anche con olio bianco.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare il melo Imperatore (Morgenduft). Può risultare fitotossico anche sulle cv di melo Jonathan, Gravenstein, Idared.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA 21 giorni.

"Attenzione: ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso"

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ICI Solplant SpA

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI SOLPLANT S.p.A. - CRESPELLANO (BO)
Registrazione Ministero della Sanità n°5500 del 3.10.83
'NIMROD' Marchio registrato Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO **kg 1**

5501

BAYCOR CAPTAN

FUNGICIDA ORGANICO

per la lotta contro ticchiolatura delle pomacee con azione collaterale contro mal bianco del melo, contro monilia e perforazione delle foglie (gommosi) delle drupacee, ruggine ed oidio di alcuni ortaggi, peronospora, ticchiolatura, oidio e ruggine delle piante ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor Captan contengono:
g 6,25 di Bitertanolo puro;
g 37,5 di Captano puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,2-0,3% (200-300 g in 100 lt d'acqua) effettuando gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Il prodotto è particolarmente indicato per il pero e la Golden Delicious.

Drupacee (pesco, susino, albicocco, mandorlo): contro monilia: 0,25-0,3% (250-300 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti, prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia.
Contro oidio e perforazione delle foglie (gommosi): 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 giorni circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua).

Ortaggi (fagiolo, zucchino e cetriolo): contro antracnosi, ruggine e mal bianco: 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni, effettuando il primo all'inizio dell'attacco.

Piante ornamentali e da fiore in pieno campo ed in serra: contro peronospora, ticchiolatura e ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore: 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua); contro oidio o mal bianco: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua).

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il Baycor Captan può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra. Non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.), con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: può risultare fitotossico su alcune cultivar di melo (Stark delicious - Winesap - Stayman - Renetta del Canada) e di pero (Butirra d'Anyou - Butirra Clairgeau - Contessa di Parigi - Trionfo di Vienna) per le quali si sconsiglia.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della frutta e 15 giorni prima del raccolto per le altre colture.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: I.R.C.A. - Albano S. Alessandro (BG)
Registrazione Ministero Sanità n. 5501 **del** 3.10.83

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

g 100

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5502

BAYCOR ANTRACOL

FUNGICIDA ORGANICO

per trattamenti liquidi su pomacee, rosa e garofano in pieno campo

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor Antracol contengono:
g 8 di bitertanolo puro;
g 42 di propineb puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Si raccomanda l'uso di maschere durante l'impiego del prodotto.

Prescrizioni particolari

— Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.
— In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito: lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura, con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,15-0,25% (150-250 g in 100 lt d'acqua) eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 gg a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 gg in dipendenza dell'andamento climatico.

Rosa e garofano in pieno campo: contro peronospora, ticchiolatura e ruggine: 0,15-0,25% (150-250 g in 100 lt d'acqua). Contro oidio o mal bianco: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua).

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

Divieti d'impiego

— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Baycor Antracol può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: solo alcune varietà di pero (Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S. Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna) si sono dimostrate sensibili ai prodotti a base di propineb.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 500

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5503

ANTRACOL RAMATO MICRO

FUNGICIDA CUPRO ORGANICO

per trattamenti liquidi su vite, pomodoro, solo fino alla prima fioritura, e garofano in pieno campo

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Antracol Ramato Micro contengono:
g 10 di propineb puro;
g 20 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro);
sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego: 0,3-0,4% (300-400 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora della vite, l'alternariosi, la peronospora, la ticchiolatura e la septoriosi del pomodoro (solo fino alla prima fioritura), la ruggine del garofano in pieno campo.
N.B. - a) Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
b) La dose maggiore deve essere usata in caso di sfavorevole andamento stagionale.

Divieti di impiego
— Divieto di impiego in serra.
— Divieto di impiego su colture diverse da quelle indicate.

Non impiegare con mezzi aerei

Compatibilità: l'Antracol Ramato Micro è miscibile con quasi tutti gli antiparassitari a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: in caso di andamento climatico freddo e piovoso è sconsigliabile impiegare il prodotto su viti in fioritura.
Novicità: il prodotto è tossico per i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 5503 **del** 3.10.83

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

Kg 1

5504

BAYCOR Z. f.

FUNGICIDA ORGANICO

per trattamenti liquidi su pomacee, drupacee ed ortaggi

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor z.f. contengono:
g 8 di bitertanolo puro;
g 67,5 di ziram puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Il prodotto è particolarmente indicato per frutteti misti.

Drupacee (pesco, susino, albicocco e mandorlo): contro monilia: 0,2-0,25% (200-250 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti, prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia. Contro oidio con buona azione collaterale contro bolla, corineo, fusicoccum e cytospora: 0,15-0,2% (150-200 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 giorni circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,22% (220 g in 100 lt d'acqua).

Ortaggi (fagiolo, zucchino, cetriolo): contro antracnosi, mal bianco, ruggine e peronospora: 0,2% (200 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni, effettuando il primo all'inizio dell'attacco.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il Baycor Zf può essere miscelato con fungicidi ed insetticidi a reazione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: solo le varietà di pero Spadona, Gentilbianca, Gentilona, Camellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con Baycor Zf.

Nocività: evitare che gallinacei ed equini pascolino nei campi trattati per una settimana dopo il trattamento.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto della frutta e 14 giorni per gli ortaggi

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 5504 **del** 3.10.83
DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

g 100

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5505

CLASSE TERZA
ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Formulato liquido a base di Dodina.

COMPOSIZIONE:
gr. 100 di prodotto contengono:
Dodina pura .... gr. 20
Diluenti ed
emulsionanti q.b. a 100

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi di intossicazione: azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei resistenti alle terapie a causa della fitosensibilizzazione. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

Registrazione N. 5505 del 3/10/83
Ministero della Sanità del

CARATTERISTICHE:
L'APAREX 20 liquido, comporta, rispetto ai formulati in polvere bagnabile, notevoli vantaggi tecnici ed applicativi:
– Più rapida ed efficace attività fungicida.
– Completa solubilità in acqua che consente il suo impiego anche a temperature relativamente basse. Difatti poiché il principio attivo dell'Aparex 20 non è soggetto a cristallizzazione, si evita la formazione di deposito frequente invece con l'impiego della Dodina in polvere bagnabile.
– Buona sospensività anche in miscela con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici, olii minerali che solitamente presentano scadenti caratteristiche di sospensività con la Dodina.
– L'APAREX 20 ha azione preventiva e bloccante.

CAMPI D'IMPIEGO:
– Pomacee: (melo-pero) contro Ticchiolatura.
– Drupacee: (ciliegio-nespolo) contro Antracnosi e Ticchiolatura.
– Fragola: contro Vaiolatura.
– Solanacee: contro Peronospora.
– Patata: contro Peronospora.
– Ortaggi da bulbo: (aglio cipolla-porro) contro Peronospora.
– Ortaggi da foglia: (endivia, lattuga, scarola, bieta da costa, spinacio, sedano) contro Peronospora.
– Ortaggi da radice (carota) contro Peronospora.
– Pioppo: contro Marssonina.
– Vite: contro Peronospora.
– Olivo: contro Occhio di Pavone.
– Colture floreali e ornamentali: in pieno campo o in serra
– garofano: contro Fusariosi, Ruggine, Alternaria, Septoria
– rosa: contro Ticchiolatura e Ruggine.

DOSI D'IMPIEGO:
Gr. 200-250 per 100 litri d'acqua.

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Diluire la quantità necessaria direttamente nella botte irroratrice. "Da non applicare con mezzi aerei".

COMPATIBILITÀ:
(Prodotti a base di Dodina) non è compatibile con i Clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina; non è consigliabile miscelarlo con Carbaril, Dimetoato, Metilazinfos, DDVP;
le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività, evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di Intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,05%.

TOSSICITÀ: Il prodotto è tossico per animali domestici pesci e bestiame.

AVVERTENZE: da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente prima che non siano trascorsi 10 giorni dal trattamento.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta.
«Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».
«Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato».

Da non vendersi sfuso
Peso kg 10

TECNICA
QUALITÀ

TECNITERRA S.r.l.

Antiparassitari - Fertilizzanti Idrosolubili

Uffici:
20129 MILANO - Via N. Bixio, 34
Sede Legale e Stabilimento:
SEGRATE (MI) Via Tiepolo, 9

5508

KLOBEN® C

ERBICIDA

® Marchio registrato E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

COMPOSIZIONE:

Neburon puro g 60
Coformulanti quanto basta a g 100.

Classe IV

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il KLOBEN C è un erbicida indicato per il diserba del frumento in trattamenti di pre-emergenza dello stesso e delle infestanti: agisce per assorbimento radicale; se favorito dall'umidità penetra negli strati sottosuperficiali del terreno sviluppando un'azione erbicida rapida e prolungata.
Il KLOBEN C controlla efficacemente, tra le dicotiledoni: Alchemilla arvensis, Adonis aestivalis, Anthemis arvensis, Atriplex patulum, Capsella Bursa pastoris, Centaurea Cyanus, Chenopodium spp., Chrysanthemum segetum, Fumaria officinalis, Linaria Elatine, Matricaria Chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum spp., Raphamus Raphanistrum, Ranunculus arvensis, Sinapis arvensis, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Viola arvensis; tra le graminacee: Apera Spica-venti, Poa annua, Alopecurus myosuroides.
Il KLOBEN C si usa alla dose di 5 kg/ha, da distribuire uniformemente con 400 - 700 litri di acqua per ettaro, su terreno ben preparato, non zolloso, possibilmente livellato con una leggera rullatura: l'epoca di impiego è subito dopo la semina o nei giorni che seguono immediatamente.
Il KLOBEN C ha una efficacia ridotta in terreni contenenti oltre il 35% di argilla o oltre il 3,5% di sostanza organica: in questi casi la dose può essere aumentata fino a 7 kg/ha.
Il KLOBEN C può essere impiegato anche in miscela con altri erbicidi per un'azione più completa in presenza di particolari infestanti. Più precisamente:

— in presenza di Lolium m., Phalaris spp., Galium a., Lamium spp., Veronica spp., Polygonum a., Polygonum c., Viola a., Fumaria a.: usare Trifluralin alla dose di 800-1000 g/ha di p.a.; o Phendimetalin alla dose di 400-600 g/ha di p.a.;

— in presenza di Alopecurus m., Poa a., Poa t., Lolium m., Phalaris spp. e Avena a nascita autunnale: usare Isoproturon alla dose di 1500 g/ha di p.a.;

— in presenza di Lolium m., Phalaris spp., Poa spp., Bifora r., Fumaria a., Veronica spp., Polygonum a., Polygonum c., e Lolium spp.: usare Terbutrin alla dose di 600-800 g/ha di p.a.;

— Il KLOBEN C, in caso di miscola estemporanea, deve essere applicato alla dose ridotta di 2,5 - 3 kg/ha, in un letto di semina preparato con cura e con semente interrata a 3-4 cm di profondità (cioè non scoperta dal terreno).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il KLOBEN C è miscibile con altri diserbanti: non è comunque da usare in miscela con concimi, insetticidi e fungicidi.

Avvertenza

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il KLOBEN C, preferibilmente, non è impiegato su un grano duro nell'Italia settentrionale e su nuove varietà del medesimo, senza effettuare saggi preliminari. Evitare trattamenti su terreni sabbiosi. Non traseminare leguminose. Dopo frumento, in caso di secondo raccolto di o con leguminose (quali fagioli, fagiolini, erba), eseguire prima della semina un'aratura profonda. Il KLOBEN C può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non ripetere il trattamento prima di 6 mesi.

NOCIVITA'

Durante il trattamento tenere lontani persone non addette, animali domestici e bestiame.

Attenzione. Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.

20093 Cologno Monzese (MI) - Via A. Volta, 16 - Tel. (02) 253021

Stabilimento di produzione

Du Pont de Nemours - Cernays (Francia)

Registrazione n. [illegible] del Ministero della Sanità del [illegible]

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg 1

5509

NATURA DEL RISCHIO - Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare controvento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro rianimazione.

Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti, 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE - Il CHIMIGOR 40 è un insetticida dotato di efficacia contro numerosi insetti parassitari delle colture agrarie. Il CHIMIGOR 40 ha un potere abbattente ed una azione citotropica, per cui penetra nei tessuti vegetali agendo sulle forme di insetti più nascoste.

MODALITA' DI IMPIEGO:

Olivo: contro Mosca delle olive: 150 g. per ettolitro di acqua negli attacchi «precocissimi» (luglio) e «normali» (settembre-ottobre); 75 g. in quelli «precoci» (agosto). I trattamenti si eseguono normalmente all'inizio dell'ovodeposizione, cioè quando si notano le prime punture della mosca

DA NON VENDERSI SFUSO

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

CLASSE III

CHIMIBERG

CHIMIGOR 40

INSETTICIDA A BASE DI DIMETOATO

COMPOSIZIONE:

Dimetoato puro	g. 38
Solventi ed emulsionanti	q.b. a 100

Contiene Xilolo ed Alcool isobutilico

Prodotto nello stabilimento «DIACHEM S.p.A.» di Albano S. Alessandro (Bergamo)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5509 del 23.11.83

CHIMIBERG
BERGAMO

sulle olive; contro Tignola: gr. 250 per ettolitro di acqua contro larve della generazione fillofaga.

Ciliegio: contro Mosca della ciliegia: 60 g. per ettolitro di acqua sulle varietà a maturazione media e tardiva.

Pesco, Albicocco: contro Mosca della frutta: 125 g. per ettolitro di acqua su pesco, 75 g. per ettolitro di acqua su albicocco. Normalmente è sufficiente un'irrorazione all'invaiatura dei frutti.

Pero: contro Zuezera: 200 g. per ettolitro di acqua; effettuare 6-8 trattamenti distanziati di 12-15 giorni l'uno dall'altro ad iniziare dalla fine di maggio.

Carciofo: contro Depressaria: 150 g. per ettolitro di acqua.

Floricole: contro Ditteri dei fiori, Striscino del garofano e Hylemya Brunnescens eseguire, alla dose di 200 g. per ettolitro di acqua, trattamenti a partire dal mese di aprile contro queste larve minatrici.

Per la preparazione dell'emulsione basta versare, agitando energicamente, la dose necessaria di prodotto in tutto il quantitativo di acqua richiesto per ottenere la concentrazione desiderata.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' - Il CHIMIGOR 40 è compatibile con tutti i fungicidi comunemente usati ad eccezione della poltiglia bordolese, borgognona e polisolfuro di calcio.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA' - A seguito dei trattamenti il prodotto è nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame.

- SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
- Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BOTTIGLIE ALLUMINIO DA Kg. 1

5510

LORAN-4P

FUNGICIDA ORGANICO CONTRO LE SCLEROTINIE E BOTRYTIS DELLE COLTURE ORTICOLE, FLOREALI IN PIENO CAMPO E FRAGOLE

Composizione:

— Dicloran puro	gr. 4
— Coformulanti	q.b. a gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il LORAN 4 P è un fungicida organico in polvere secca. Indicato per combattere i marciumi provocati da Botrytis e Sclerotinia di varie colture.

Insalata - Lattuga - Radicchio: il LORAN 4 P si applica in superfice al terreno nella dose di gr. 30 per mq. di terreno, mediante fine polverizzazione; una volta sparso va interrato ad 1-2 cm. di profondità. Sulle piantine ortive in semenzaio, in letti caldi e sulle piantine a dimora, si applica il LORAN 4 P alla dose di gr. 8 per mq.

Fragola: il LORAN 4 P si applica per combattere la Botrytis cinerea, poco prima della fioritura e si continuano i trattamenti a distanza di 10-15 giorni l'uno dall'altro, sospendendoli 3-4 settimane prima della raccolta. La dose è di gr. 4-6 per mq. ovvero kg. 40-60 per ettaro.

Colture ortive (pomodoro - zucchini - cetrioli - melanzane - basilico): in semenzaio, in letti caldi e serre: contro marciumi pedali e radicali da Rizoctonia, applicando al terreno prima della semina e del trapianto, alla dose di gr. 30 per mq. ed eventuali trattamenti alla coltura mediante polverizzazioni al colletto, alla dose di gr. 8 per mq.

Piante ornamentali (Rose, Crisantemi, Ciclamini, Tulipani, Begonie): contro attacchi da Botrytis ed altre muffe quali Sclerotinia spp., mediante polverizzazioni sulle foglie o al colletto delle piante.

Gladioli: si applica mediante polverizzazioni al bulbo prima della sua messa a dimora o immagazzinamento, con kg. 1 di prodotto per ogni 100 kg. di bulbi. Per controllare la Botrytis e la Sclerotinia sulla pianta di gladiolo, effettuare un trattamento al terreno lungo il solco destinato a ricevere i bulbi, impiegando il LORAN 4 P alla dose di gr. 500 ogni 20 metri lineari di solco.

Colture di garofani ed altri fiori: il LORAN 4 P si impiega per prevenire il **Mal del Colletto** (Rhizoctonia solani) dei Garofani **ed altri marciumi pedali** quali Botrytis, Sclerotinia spp. di altri fiori, trattare il terreno prima del trapianto, alla dose di gr. 15-30 per mq. di terreno, quindi interrarlo. Il LORAN 4 P si applica anche sulla coltura effettuando trattamenti a distanza di 1 mese, alla dose di gr. 4-8 per mq. di coltura.

« Da non applicare con mezzi aerei ».

Compatibilità: il LORAN 4 P per il suo particolare impiego, non viene a contatto con altri prodotti antiparassitari, comunque è compatibile con tutti gli antiparassitari eccezion fatta per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

« Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione N. del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 0,200

5511

II CLASSE TOSSICOLOGICA

NOCIVO

DESORMONE 80

Diserbante selettivo a base di sale sodico dell'acido 2,4 D utilizzabile nel diserbo dei cereali, dei canali di bonifica

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 80 di 2,4 D puro (da sale sodico)
Coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio:

Intossicazione grave per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Evitare di respirarne i vapori.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Rendere innocue dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (p. e.: interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva).
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione:
Astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per la dermatosi.

Controindicazioni:
E' sconsigliata la digitale.

CARATTERISTICHE

Il **DESORMONE 80** ha uno spettro d'azione erbicida sulle infestanti dicotiledoni.

E' selettivo per i cereali.

Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi ecc. Si dovrà evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture, avendo cura di trattare con **DESORMONE 80** in assenza di vento affinché non giungano sulle colture sensibili le particelle di prodotto.

PRINCIPALI IMPIEGHI

IN CEREALICOLTURA: il **DESORMONE 80** si impiega per il diserbo dei cereali, siano essi di semina autunnale che primaverile: in ogni modo è indispensabile che il trattamento venga effettuato tra la fine dell'accestimento e lo stadio che precede la formazione della botticella.

La dose di impiego va da kg. 0,8, a kg. 1,3 per ettaro.

DISERBO CANALI: La flora infestante le sponde dei canali di bonifica è molto varia: essa è rappresentata in gran parte da canna, tife, ma anche da piante dicotiledoni quali artemisia, poligonum spp., romice, menta, ortica. Mentre sulle canne e monocotiledoni si agisce con prodotti ad azione specifica, sulle dicotiledoni si agisce con il **DESORMONE 80** che viene impiegato alla dose dello 0,3-0,4%.

DISERBO DEGLI AGRUMETI: Possono manifestarsi ricacci di convolvolo che è sensibile al **DESORMONE 80**. Pertanto si dovranno trattare le chiazze ricoperte di Convolvolo con **DESORMONE 80** alla dose di kg. 1,3 per ettaro, facendo bene attenzione che anche le più minute particelle di prodotto non vadano a contatto con le foglie delle piante di agrumi.

DISERBO PRATI E PASCOLI: Contro Ferula e Romice kg. 0,800-1,300 per ettolitro per trattamenti localizzati sulle infestanti: non irrigare il prato nei 6 gg. successivi al trattamento.

Spollonatura chimica del nocciuolo: il **DESORMONE 80** si può impiegare per la spollonatura chimica del nocciuolo. Impiegare gr. 400-500 di prodotto per 100 litri di acqua, localizzando scrupolosamente il getto sui polloni erbacei dell'annata da distruggere, per evitare danni alla pianta madre.

Effettuare il trattamento quando i polloni erbacei hanno emesso la quinta foglia.

CONDIZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **DESORMONE 80** ha un'azione non immediata: è necessario che il prodotto permanga sulle piante per un certo periodo prima della pioggia. Si raccomanda pertanto di eseguire il trattamento quando non si temono piogge imminenti.

La quantità di poltiglia da distribuire può variare a seconda del tipo di irroratrice di cui si dispone.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con altri erbicidi secondo suggerimenti dei tecnici di zona e, comunque, dopo averne saggiato il comportamento.

« **Avvertenza**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici ».

Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Causa la sua attività, anche minime quantità di prodotto possono provocare danni alle colture sensibili vicine a quelle da trattare come vite, leguminose, alberi da frutta, ortaggi, ecc.

Pur essendo il prodotto poco volatile, si raccomanda di non trattare in prossimità di colture sensibili agli ormonici. Operare con irroratrici a debole pressione in modo da evitare la formazione di gocce troppo piccole che possono essere trasportate da deboli correnti d'aria sulle colture vicine. Dirigere i getti scrupolosamente sulle colture da trattare.

Trattare durante le giornate senza vento e con temperatura dolce.

Non gettare i residui della soluzione in acqua che debba servire per la preparazione di poltiglie per trattamenti antiparassitari e per irrigazione.

Pulire accuratamente gli apparecchi e gli attrezzi usati per il trattamento con soda al 5%.

I recipienti di legno e quelli porosi non sono più utilizzabili per la preparazione e distribuzione di insetticidi o anticrittogamici.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per animali domestici, pesci e bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

« **Attenzione**: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto Kg.

RAVIT S.p.A. per l'industria chimica

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia 3 - Tel. 53.32.68

Stabilim.: Paganica (Aq)

Reg. n. 5514 **Ministero della Sanità del** 10.10.83.
E/2

5512

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

MIKAL RAME

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro
la peronospora della vite
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 di Fosetil Alluminio puro.
Gr. 30 di Rame puro (da ossicloruro tetraramico).
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **MIKAL R** è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.

L'attività nei confronti della peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.

La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche, unite alla persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la peronospora della vite anche con interventi distanziati a cadenza fissa.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.: Paganica (L'Aquila)

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **MIKAL R** va impiegato sulla vite **dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di « chiusura del grappolo »** compresa.

Il primo trattamento va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.

Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di «chiusura del grappolo» compresa.

Per evitare interferenze nella fecondazione si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza della fioritura. Dovendo eseguire trattamenti antiperonosporici in tale periodo sono consigliabili miscele contenenti mancozeb anziché rame.

Dose: gr. 400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto durante la fioritura.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5512 **Ministero della Sanità del** 10 10 83

Peso netto kg.

2 83

5513

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contrtto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Questo prodotto è infiammabile: maneggiare con cura.
In locali chiusi è consigliabile indossare guanti, indumenti e scarpe di gomma, e respiratori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati dal caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metilsolfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

ICI Solplant SpA

"ACTELLIFOG"

Insetticida-acaricida fosforganico in formulazione pronta per l'impiego con generatori di "FOG" per il controllo degli insetti nelle serre

COMPOSIZIONE

Pirimifos-metil puro	g 7,17
Solventi, stabilizzanti	q. b. a g 100

CLASSE III

Attenzione: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI

Cetrioli, fragole, peperoni, pomodoro, lattuga, in **serra.**
Trattare alla dose di 4,5 - 6,3 kg per ettaro.
Ripetere i trattamenti ad intervalli di 3-5 giorni sino all'eliminazione dell'infestazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare 'ACTELLIFOG' senza diluizione con macchine "FOG" (Pulsfog o Swinfog) preferibilmente di sera.
Chiudere la serra prima del trattamento, lasciarla chiusa durante la notte e ventilare al mattino prima di entrare. Durante l'applicazione non dirigere il getto direttamente sulle piante.

Attenzione

Non trattare a temperatura inferiore ai 15° C o superiore a 32°C. Non trattare colture con foglie umide o danneggiate da siccità. Non trattare colture in fiore senza consultare un tecnico di fiducia. Non usare il FOG in giornate ventose, soprattutto se la serra è in cattiva condizioni.
In caso di ignizione della miscela interrompere subito il flusso dell'insetticida e, ad evitare reignizioni, diminuire la miscela aria-combustibile e/o usare un ugello più largo.

COMPATIBILITÀ

Data la natura del formulato è sconsigliata qualsiasi miscela.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci. È nocivo per il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.
Attenzione: ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

ICI Solplant SpA

ICI SOLPLANT S.p.A.
Stabilimento di produzione:
ICI PLANT PROTECTION DIV. - Yalding, Kent, Inghilterra
Registrazione Ministero della Sanità N. [illegible] **del** [illegible]
'ACTELLIC' Marchio registrato della Imperial Chemical Industries PLC

DA NON VENDERSI SFUSO **kg 5**

5514

SEPRAVAX COMBI 20/33 PB

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE
PER COLTURE FLORICOLE INTENSIVE IN PIENO CAMPO E IN SERRA

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:
— OSSICARBOSSINA pura . . . . g 20
— CAPTANO puro . . . . g 33,3
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

CLASSE III

Attenzione: manipolare con prudenza.
Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi di acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
Prescrizioni particolari: una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Avvertenze: durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare occhiali protettivi date le proprietà irritanti del p.a. Carbossina.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la pelle e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Caratteristiche: il **SEPRAVAX COMBI 20/33 PB** è un fungicida ottenuto dalla combinazione della ossicarbossina ad azione sistemica con il captano ad azione preventiva di copertura. Il prodotto si impiega prevalentemente sul garofano in trattamenti fogliari per il controllo della Ruggine, Alternaria, Carbone (Heterosporium echinulatum), Botrite, Septoria, Fusarium roseum.
Dosi e modalità d'impiego:
G A R O F A N O
In trattamenti preventivi il **SEPRAVAX COMBI 20/23 PB** si impiega alla dose di 200 g/100 l di acqua con applicazioni ripetute alla distanza di 7-8 giorni e bagnando bene le piante fino allo sgocciolamento.
In trattamenti curativi, soprattutto in presenza di attacchi di ruggine, il prodotto si applica alla dose di 250-300 g/100 l di acqua. Si effettuano 3-4 trattamenti alla distanza di 3-4 giorni, dopo di che la ruggine sarà bloccata, per continuare poi con la cadenza settimanale. Durante il periodo estivo si raccomanda di eseguire il trattamento verso sera per favorire l'assorbimento durante la notte.
R O S A
Contro la ruggine della Rosa, il **SEPRAVAX COMBI 20/33 PB** si applica alla dose di 200-250 g/hl alla comparsa delle prime pustole. I trattamenti vengono ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni per 3-4 volte fino alla scomparsa della malattia.
Preparazione della miscela: sospendere la dose del prodotto in poca acqua e mescolare fino ad ottenere un fluido omogeneo; versare gradualmente questa poltiglia nel quantitativo totale di acqua richiesto ed agitare ripetutamente.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »
« NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE »

Compatibilità: il **SEPRAVAX COMBI 20/33 PB** non è miscibile con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, polisolfuri ecc.) con olii e con zolfi. La sua applicazione deve rispettare un tempo di tre settimane dalla distribuzione di olii e zolfi.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischio di nocività: l'impiego del **SEPRAVAX COMBI 20/33 PB** è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci ed insetti utili.

« SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GG. PRIMA DELLA RACCOLTA »

Attenzione: da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. 5514 del 20.12.83

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Netto g 200**

S E P R A N s. r. l.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolle, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

officina di produzione bimex s.p.a. - via cogolle, 5 - isola vicentina (vi)

5515

II Classe

VIDDEN® D SIAPA

(FUMIGANTE)

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco ed agrumi.

COMPOSIZIONE	contenuto **kg. 200**
100 grammi di prodotto contengono:	
— 1,3 - dicloropropilene puro	g 55,6
— 1,2 - dicloropropano puro	g 33
— Coformulanti	q.b. a g 100

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di
SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza 172 - Roma

Registrazione Ministero Sanità n. 5515 del 23.11.83

® Marchio registrato della THE DOW CHEMICAL COMPANY

NATURA DEL RISCHIO:

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico - tempo di latenza: anche parecchie ore.
Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iporacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.
Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittere da epatite tossica.
Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.
Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.
Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone. Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.
In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena; cortisonici; ossigeno se necessario; se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).
Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in Centro di rianimazione.
Controindicazioni: non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte o olio.

CARATTERISTICHE

Il VIDDEN D SIAPA è una particolare formulazione che iniettata nel terreno, vi libera dei vapori che diffondendosi in tutti i più piccoli meati raggiungono i parassiti uccidendoli in breve tempo.

Il prodotto è particolarmente attivo contro Nematodi, Insetti (Maggiolino, Grillotalpa, Cavallette, Formiche), Millepiedi, Talpe, semi di erbe infestanti e, inoltre, riduce la carica dei germi di varie malattie fungine, generatori di marciumi radicali (Fusarium, Phoma, Rhizoctonia).

Esercita inoltre una azione favorevole sull'attività benefica di alcuni gruppi di microrganismi del suolo e sulla mobilitazione di elementi nutritivi.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

La dose d'impiego del VIDDEN D SIAPA varia a seconda dello stato di infestazione del terreno. Come dosi rispettivamente minima e massima si consigliano 150-250 lt. di prodotto per ettaro. In terreni infestati oltre che da Nematodi anche da Elateridi, da altri insetti o da semi di erbe infestanti, sarà opportuno impiegare 200-250 lt. di prodotto per ettaro. Effettuando il trattamento con palo iniettore eseguire le iniezioni a distanze regolari di cm. 30 x 30 a quadrato o meglio a quinconce alle seguenti dosi di VIDDEN D SIAPA in relazione alla quantità per ettaro prescelta:

— lt. 150 per ettaro: c.c. 1,35 per iniezione
— lt. 200 per ettaro: c.c. 1,80 per iniezione
— lt. 250 per ettaro: cc. 2,25 per iniezione

Il prodotto deve essere iniettato alla profondità di cm. 15-20, su terreno nudo e precedentemente ben sminuzzato e livellato.

Dopo ogni iniezione chiudere immediatamente il foro provocato dall'iniettore con un colpo di tacco. Finito il trattamento rullare o bagnare leggermente il terreno.
In generale l'epoca migliore per i trattamenti cade nei periodi che precedono la semina od il trapianto (autunno o primavera).

E' consigliabile che il terreno presenti un grado di umidità simile a quello richiesto normalmente per la semina, una temperatura non inferiore ai 10°C e non superiore al 25°C (temperatura ottima circa 15°C).

Si dovrà avere cura di non effettuare trattamenti in vicinanza di piante arboree (Vite, Pesco, ecc.), tenendo presente che tra applicazione del fumigante e la semina o il trapianto nel terreno trattato dovranno trascorrere 28 giorni.

Prima della messa a coltura sarà opportuno comunque sottoporre il terreno ad una leggera lavorazione in modo da liberarlo completamente dei vapori residui.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

E' VIETATO L'IMPIEGO DEL PRODOTTO IN SERRE ED AMBIENTI CHIUSI.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5516

AMESIP(R) L

Diserbante in pasta liquida selettivo in post-emergenza per la coltura di mais e per il diserbo degli agrumi.

COMPOSIZIONE

— Ametrina pura	g	45
— Coadiuvanti e solventi: quanto basta a	g	100
- contiene Glicol etilenico		

(R) marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 - Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 5516 del 9.11.83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto controlla molte Graminacee e Dicotiledoni, in particolare controlla la **Digitaria sanguinalis** (Sanguinella o Gramignone), **Echinocloa crus-galli** (Giavone), **Setaria viridis** (Setaria).
Il prodotto è in grado di controllare alcune infestanti che risultano resistenti all'Atrazina. Il prodotto agisce sulle infestanti per via fogliare oltre che per via radicale.
Il prodotto si impiega in post-emergenza della coltura di mais alta 30-50 cm., con apposite macchine irroratrici con ugelli eventualmente 'schermati' disposti sotto le foglie della coltura e diretti verso il terreno, in modo da evitare il più possibile l'irrorazione delle foglie della coltura, irrorando le malerbe fra le file del mais alto 30-50 cm., alla dose di 3-4 Kg/ha distribuendo il prodotto in un adeguato quantitativo di acqua.
Nel diserbo degli agrumi intervenire precocemente su erbe infestanti già emerse dal terreno, non molto sviluppate, ed irrorare con pompe a bassa pressione e con ugelli eventualmente 'schermati', onde evitare il contatto diretto con le parti verdi della coltura, impiegando una dose di 4-8 Kg/ha di prodotto formulato, secondo il minore o maggiore sviluppo delle infestanti e la loro maggiore o minore sensibilità allo stesso.
Impiegare inoltre le dosi più elevate in terreni pesanti e ricchi di sostanza organica.

Preparazione della poltiglia: impastare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni diserbanti, onde ampliarne lo spettro di azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto di colture sensibili vicine e con le foglie del mais e degli agrumi.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta per gli agrumi.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5517

ANTIFITO

(ERBICIDA SISTEMICO TOTALE IN MICROGRANULI BAGNABILI)

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

— ATRAZINA pura	g 23
— SIMAZINA pura	g 34,5
— Coformulanti q.b. a	g 100

CLASSE III

Attenzione: Manipolare con prudenza.

Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili, dopo l'uso, con i mezzi più idonei le confezioni che contengono il prodotto (trattare le stesse con soluzioni di soda caustica). Interrarle in fosse profonde più di metri 1, cospargendole con calce viva. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche: Erbicida sistemico totale in microgranulari bagnabili. Agisce per assorbimento fogliare e radicale. Si impiega per il diserbo dei terreni non destinati a coltura in genere alla dose di g 2-10 per litro di acqua per metro quadrato. Distribuire il prodotto uniformemente e irrorare abbondantemente se non è prevista una pioggia imminente.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: Il prodotto va impiegato da solo.
Fitotossicità: Il prodotto non deve raggiungere alberi, colture utili o comunque le zone di terreno interessate alle loro radici. Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per gli altri trattamenti antiparassitari se non sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.
Rischi di nocività: Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, pesci e bestiame.
Attenzione: Da impiegare esclusivamente per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. »
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. »

Reg. Ministero Sanità n. 5517 del 9-11-83

NON VENDERE SFUSO **Peso gr 100**

BIMEX

B I M E X S . p . A .
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.60 - 55.81.90

officina di produzione bimex s.p.a. - via cogolla, 5 - isola vicentina (vi)

5518

Ovicida e larvicida del ragno rosso e del ragno giallo

OVILAR

attenzione: manipolare con prudenza | **classe terza**

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:
Tetradifon puro gr. 7,36
Solventi emulsionanti quanto basta a 100
Contiene Xilolo

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Avvelenamento acuto per ingestione inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: *vomito - diarrea - parestesie diffuse - cefalea - vertigini - astenia intensa - convulsioni.*
Consigli terapeutici: *Intossicazione acuta, lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g. 25 di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g.) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.*
Controindicazioni: *la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare l'adrenalina e l'efedrina.*

Registrazione N° 5518 del Ministero della Sanità del 9.11.83

OVICIDA-LARVICIDA: Liquido emulsionabile.
EFFICACE CONTRO: le uova estive e le larve degli acari (ragnetti rossi e gialli) dannosi alle pomacee; drupacee; vite; agrumi; ortaggi (a foglia, a frutto, a bulbo); olivo; colture floreali in pieno campo o in serra.
Interrompe il ciclo riproduttivo del parassiti.
E' dotato di potere penetrante attraverso la foglia e di azione duratura.
DOSI D'IMPIEGO: gr. 200-300 per 100 litri d'acqua.
In piena estate, con forti infestazioni usare la dose massima.
MODALITA' D'IMPIEGO: Aggiungere l'OVILAR all'acqua ed alle altre miscele antiparassitarie; agitare con cura la soluzione ed irrorare abbondantemente entrambe le pagine delle foglie. Effettuare il primo trattamento alla comparsa delle prime larve (questo periodo coincide generalmente nel melo e nel pero con la vigilia della fioritura). Successivamente si può intervenire nel corso di tutta la stagione primaverile-estiva.
« Da non applicare con mezzi aerei »
COMPATIBILITA': E' compatibile con i comuni antiparassitari non alcalini e con gli integratori fogliari IRRAL, IRRALFLOR e IDRAL.
Per ottenere la distruzione immediata anche degli acari adulti miscelare l'OVILAR con AFIDEX.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
E' tossico per gli insetti utili.
Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.
« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

ANTIPARASSITARI FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI — **TECNITERRA** s.r.l. Uffici: MILANO - Via N. Bixio, 34 — **Sede Leg. e Stab.: SEGRATE**

Peso Kg. 0,250
DA NON VENDERSI SFUSO

5519

IV CLASSE

SILZON

(POLVERE BAGNABILE)

DISERBANTE DI IMPIEGO IN PRE E POST-EMERGENZA SU BIETOLE DA ZUCCHERO, DA ORTO E DA FORAGGIO

Registrazione Ministero Sanità n. 5519 del 9 11.83

® Marchio registrato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Cloridazon puro	g. 69
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SILZON penetra nelle piante attraverso le radice e le foglie. Distribuito sul terreno nudo viene assorbito dalle radici delle malerbe germinanti e ne provoca la morte immediata o dopo poco tempo.
Il SILZON può anche essere impiegato quando le malerbe sono già emerse purché siano ancora allo stadio cotiledonare o con non più di due foglie vere.
Poichè il prodotto agisce prevalentemente per assorbimento radicale, sarà necessario che il terreno sia sufficientemente umido in modo da permettere al principio attivo di penetrare tra le particelle del terreno per essere quindi a disposizione dell'apparato radicale delle erbe infestanti.
Ove si esegua il trattamento su terreno asciutto, l'azione diserbante si esplica solo dopo una pioggia. Un terreno accuratamente affinato e livellato ed una semina regolare rappresentano le premesse per un buon risultato erbicida. Le concimazioni con stallatico devono essere eseguite in autunno e non in primavera.
Il SILZON è molto attivo contro: Amarantus retroflexus - amaranto; Atriplex patula - atriplice maggiore; Capsella bursa-pastoris - capsella; Chenopodium album - farinaccio; Galeopsis tetrahit - canapa selvatica; Galinsoga parviflora - galinsoga; Lamium amplexicaule - erba ruota; Matricaria chamomilla - camomilla; Poa annua - gramigna delle vie; Papaver rhoeas - papavero; Polygonum persicaria - persicaria; Polygonum convolvulus - convolvolo nero; Raphanus raphanistrum - rafanistro; Sinapis arvensis - senape; Solanum nigrum - erba morella; Spergula arvensis - spergola; Stellaria media - centocchio; Thlaspi arvense - erba storna; Urtica urens - ortica piccola; Veronica spp. - veronica.
Il SILZON è mediamente attivo contro: Ajuga spp. - iva; Anagallis arvensis - anagallide; Centaurea cyanus - fiordaliso; Euphorbia spp. - euforbia; Fumaria officinalis - fumaria; Galium aparine - gallio; Mercurialis annua - mercurella; Polygonum aviculare - coreggiola; Senecio vulgaris - erba calderina; Vicia spp. - veccia; Viola tricolor - viola del pensiero.
Il prodotto non è attivo contro le malerbe perenni o germinanti in profondità come Agropyrum repens, Cirsium arvensis, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Cyperus spp., Equisetum spp.; Panicum crus-galli, Sorghum halepense ed in genere contro tutte le malerbe quando hanno superato lo stadio di sensibilità.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il SILZON può essere distribuito con qualsiasi tipo di pompa irroratrice. La miscela si prepara stemperando in poca acqua la quantità di prodotto prestabilita, versando il tutto nel totale quantitativo di acqua contenuto nel serbatoio riempito per 3/4 e mescolando con cura. Durante l'irrorazione la poltiglia deve essere tenuta in movimento da un agitatore meccanico o con rimescolamento a risucchio. Di solito per il trattamento a pieno campo si impiegano da 300 a 600 litri di acqua per ettaro e per trattamenti localizzati da 100 a 200 litri.

Prima di effettuare il trattamento sarà opportuno regolare l'altezza della barra irrorante e verificare il funzionamento degli ugelli misurando la quantità di miscela che viene emesso da ogni ugello. Dopo una interruzione del lavoro la poltiglia deve essere agitata accuratamente. La miscela di SILZON non danneggia le parti metalliche ed i tubi di gomma dell'apparechio irroratore. Le bietole da seme possono essere trattate nell'anno di semina secondo le indicazioni comuni; nella primavera successiva è possibile un trattamento dopo la ripresa vegetativa su terreno libero da infestanti.
Il trattamento on SILZON può essere eseguito anche dopo un eventuale trapianto. Le bietole da foraggio trapiantate possono essere trattate con successo dopo l'avvenuto radicamento e cioè dopo circa una settimana dal trapianto.

EPOCA DEI TRATTAMENTI

Pre-semina: tenendo conto dell'ambiente e delle condizioni climatiche in cui si opera è il trattamento più razionale. Con il trattamento di pre-semina ci si sottrae infatti ai rischi di una scarsa piovosità che a volte può verificarsi nella stagione primaverile.
L'applicazione viene eseguita sul campo già preparato ed affinato per la semina ed è seguita dall'incorporamento superficiale del prodotto al terreno a mezzo di erpici snodati o a denti, avendo cura di non interrare a più di 3-4 cm. di profondità.

Pre-emergenza: il trattamento erbicida può essere effettuato da subito dopo la semina della bietola fino a poco prima dell'emergenza. Fattore determinante per il successo di tale diserbo è la presenza di umidità nel terreno; se entro 2-3 settimane dal trattamento non dovessero verificarsi delle precipitazioni di una certa importanza sarà opportuno ricorrere ad una irrigazione. Una rullatura effettuata subito dopo la semina favorirà una nascita più uniforme delle infestanti consentendo una migliore attività erbicida.

Post-emergenza e post-diradamento: tali trattamenti erbicidi sono consigliabili quando non è stato possibile intervenire nelle due epoche indicate precedentemente e cioè in pre-semina e pre-emrgenza della coltura.

Il SILZON è selettivo per la bietola quando questa avrà superato lo stadio di 2-4 foglie vere; dopo tale periodo si potrà effettuare il trattamento sia in presenza di malerbe che non abbiano superato lo stadio di 2 foglie vere che su terreno privo di erbe infestanti. Anche in questo caso sarà indispensabile che si abbia una buona umidità nel terreno o che comunque intervengano piogge di una certa consistenza entro 2-3 settimane dal trattamento.

DOSI D'IMPIEGO

Diserbo a pieno campo: La dose media è di 4 kg. per ettaro. Nei terreni di medio impasto tendenti all'argilloso, argillosi ed organici, è opportuno che questa dose sia elevata fino a 5-6 kg./ha.
Nei terreni torbosi il diserbante viene fissato dalle particelle di humus e quindi un trattamento in pre-emergenza delle malerbe è inefficace: su tali terreni si possono avere risultati eccettabili con un trattamento in post-emergenza alla dose di 8 kg. per ettaro, quando le infestanti sono allo stadio cotiledonare.
Nei terreni sabbiosi e molto leggeri si consiglia di ridurre la dose media fino a 3 kg./ha.

Diserbo sulle file: La dose d'impiego deve essere ridotta alla effettiva superficie di terreno che si desidera trattare applicando la seguente formula:

$$\frac{l\ (cm) \times kg.}{d\ (cm)}$$

l = larghezza della striscia in cm.
kg = dose d'impiego in kg. riferita alla superficie totale
d = distanza tra le file in cm.

Striscie di	DISTANZA FRA LE FILE 40 cm	45 cm	50 cm	55 cm
(dosi d'impiego 4 Kg/ha)				
20 cm	2,0 Kg	1,8 Kg	1,6 Kg	1,5 Kg
25 cm	2,5 Kg	2,2 Kg	2,0 Kg	1,8 Kg
(dosi d'impiego 5 Kg/ha)				
20 cm	2,5 Kg	2,2 Kg	2,0 Kg	1,8 Kg
25 cm	3,1 Kg	2,8 Kg	2,5 Kg	2,3 Kg

MISCIBILITA CON ALTRI DISERBANTI - Al fine di completare l'azione erbicida del prodotto nei confronti delle graminacce si consiglia di effettuare una miscela di 2-2,5 Kg di SILZON e 4 lt. di SIAP 1 per ettaro applicandola con la tecnica di pre-semina seguita da interramento. Con tale miscela inoltre si svincola il risultato del diserbo dall'andamento stagionale in quanto il SIAP 1 agisce per gassificazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SILZON è miscibile con gli insetticidi in polvere bagnabile e con le formulazioni in pasta, previsti per la lotta contro Altica e Cleono, non sono generalmente miscibili gli insetticidi in formulazioni emulsionabili.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulari deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOSSICITA'

Il SILZON è ben tollerato dalla bietola, si sconsiglia tuttavia il trattamento nel periodo che va dall'emergenza delle piantine fino all'emissione delle prime due foglie vere (grandezza di un pisello) perché si potrebbero verificare, specialmente con alte temperature, rallentamenti nella crescita ed accartocciamenti delle foglie. Molti esperimenti ed osservazioni hanno peraltro dimostrato che si tratta in genere di fenomeni passeggeri che non influiscono sulla produzione. Si possono avere temporanei rallentamenti di crescita dopo il trattamento solo quando le bietole sono già indebolite da altre cause, come ad esempio campi incrostati o infangati attacchi di malattia o parassiti insufficiente energia germinativa, semina troppo profonda, superdosaggio dei prodotti per la concia dei semi, eccessiva concentrazione salina nel terreno, danneggiamenti causati da rullature, erpicature ed arature, nonché da grandine e gelo.
Se la fuoriuscita delle bietole è impedita da una crosta superficiale si può ricorrere all'impiego di rulli o di erpici. I rulli devono però essere impiegati non più di 4-6 giorni dopo la semina, per evitare di danneggiare le bietoline germinanti.
Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente lavate prima di essere usate per altri trattamenti. Evitare che la miscela erbicida giunga a contatto con colture vicine sensibili.
Si raccomanda di non impiegare dosi elevate di concime immediatamente prima della semina, specialmente su terreni leggeri. Concimazioni con più di 130 Kg. per ettaro di azoto (circa 6 q.li di solfato ammonico) non dovrebbero mai essere effettuate prima della semina mentre invece eventuali ulteriori concimazioni in copertura non interferiscono con l'attività erbicida del prodotto.

Azione residua — L'azione del formulato si protrae parecchie settimane fino ad un massimo di 3 mesi a seconda delle precipitazioni e della natura del terreno. Un terreno trattato con SILZON in cui la semina non sia riuscita per gelo, malattie, parassiti o per altre cause, può essere riseminato con bietole, mais, patate, dopo una normale aratura. Si sconsiglia invece la semina e il trapianto di crucifere come colza, ravizone, cavolo, cavolfiore e la semina del pomodoro. Non si devono invece temere azioni residue per la coltura che segue il normale raccolto delle bietole, se si sono osservate le modalità di impiego consigliate.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

CONTENUTO KG. 5

5520

PALLINAL

Fungicida organico di contatto ad azione preventiva per la lotta contro oidii, ticchiolatura e peronospora su colture di vite e melo.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Nitrotal-isopropil puro	g. 12,5
Metiram puro	g. 60
Coformulanti	q.b. a g. 100

CLASSE IV

DISTRIBUZIONE E VENDITA:

BASF - Agritalia S.p.A. - Milano

OFFICINA DI PRODUZIONE:

BASF Aktiengesellschaft

6700 Ludwigshafen/Rhein (Germania Federale)

Reg. Min. San. N.° [illegible] **del** [illegible]

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
- Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
- Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati: alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PALLINAL deriva dall'associazione di due princìpi attivi ad azione complementare ed è indicato per la lotta contemporanea contro l'oidio e la ticchiolatura del melo e contro l'oidio e la peronospora della vite.

Pallinal agisce per contatto ed esplica un'attività di tipo preventivo.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Oidio e Ticchiolatura del Melo:

— Trattamenti pre-florali : 300 g/hl

— Trattamenti post-florali : 250-300 g/hl

Oidio e Peronospora della Vite: 250-300 g/hl

Distribuire un quantitativo di poltiglia per ettaro sufficiente per coprire interamente ed uniformemente la vegetazione.

Preparazione della miscela

Stemperare la dose prestabilita di prodotto in poca acqua e poi versare nel quantitativo totale d'acqua.

Divieto di impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il PALLINAL è miscibile con il PERFEKTHION e con gli insetticidi di comune impiego. Questi devono essere aggiunti alla poltiglia di irrorazione poco prima del trattamento.

Il PALLINAL è miscibile con i fertilizzanti fogliari Basfoliar 34 e Fetrilon-Combi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

kg. 1

5523

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SILTIOCARB 50 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)

ERBICIDA SELETTIVO
PER LA LOTTA CONTRO IL GIAVONE NELLE RISAIE

Registrazione Ministero Sanità n. 5523 **del** 9.11.83

marchio depositato n. 126941

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Benthiocarb puro	g. 50
— Coformulenti	q.b. a g. 100
Contiene XILOLO	

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini.

Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione.

Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE

Il SILTIOCARB 50 EC è un erbicida ad azione antigerminello, per contatto e per assorbimento radicale, non volatile, specifico per la lotta contro Echinochloa crus-galli (Giavone) e contro Setaria spp (Panicastrella), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Heleocharis spp (Giunco tondo), Cyperus difformis (Cipero).

Non richiede incorporamento nel terreno quando viene impiegato su suolo asciutto e possiede inoltre una buona attività residuale.

EPOCHE D'IMPIEGO

Il SILTIOCARB 50 EC si può impiegare:

1 - Prima della semina del riso su terreno asciutto, ben affinato e pronto per la sommersione che normalmente si effettua prima della semina. L'allagamento della risaia può avvenire subito dopo la distribuzione dell'erbicida oppure dopo qualche giorno.

2 - Nelle fasi di post-emergenza precoce del riso quando questo ha emesso almeno una foglia e mezza e con giavone avente 1 o 2 foglie. Non distribuire il prodotto con giavone più sviluppato in quanto non sufficientemente sensibile dopo lo stadio di 3 foglie.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Irrorare l'erbicida alla dose di 6-8 litri di prodotto in 400-600 litri di acqua/Ha curando l'uniformità dell'applicazione sulla superficie interessata.

Impiegare la dose minore su terreni leggeri e viceversa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i fungicidi, insetticidi e fertilizzanti comunemente usati in risaia.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico con una sola foglia, soprattutto se le planticelle sono sommerse completamente da acqua stagnante e calda.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO **LT. 5**

silia spa società italiana lavorazioni industriali agrarie

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

Via di Tor Sapienza, 172 - Roma

5524

KUMULUS FL

Zolfo colloidale liquido

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Zolfo puro (esente da selenio)	g 54,8
Coformulanti (contiene etilenglicole) q.b. a	g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il KUMULUS FL è indicato per i trattamenti contro tutte le forme di oidio o mal bianco.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Viticoltura: 18-120 cc per hl di acqua.
Frutticoltura (Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Nocciolo): 60-120 cc per hl d'acqua.
Orticoltura (Pomodoro, Cucurbitacee, Pisello, Carciofo, Cavoli): 80-150 cc per hl d'acqua.
Floricoltura in pieno campo (Rosa, Crisantemo, Ortensia, Begonie): 80-150 cc per hl d'acqua.
Usare le dosi più basse durante i periodi con temperature più elevate.
Il prodotto si impiega preventivamente e cioè si interviene prima o all'inizio della comparsa della malattia e ripetendo i trattamenti in funzione dell'andamento stagionale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Non è miscibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide. Il prodotto è miscibile con gli altri antiparassitari. Per la miscela si consiglia di immettere nel recipiente usato per l'irrorazione prima gli anticrittogamici, quindi il Kumulus FL ed infine gli insetticidi.
Avvertenza: deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': può arrecare danno alle seguenti cultivar di

Mele: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman red - Winesap.

Pere: Buona Luisa Davranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese.

CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

Per evitare fenomeni di fitotossicità nel periodo estivo effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e non trattare subito dopo una pioggia.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni rilevanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

litri 5

DISTRIBUZIONE E VENDITA:
BASF-Agritalia S.p.A. - Milano
Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein
(Germania Federale)
Reg. Min. San. N.° 5524 **del** [illegible]

5525

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SILACLOR

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
DISERBANTE SELETTIVO PER IL MAIS

Registrazione Ministero Sanità n. 5525 del 23.11.83

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

— Alachlor puro	g. 43,2
— Coformulanti *	g. 100,0

Contiene mono-clorobenzoio.

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto agisce su un numero molto elevato di infestanti provenienti da seme, particolarmente su quelle appartenenti alla famiglia delle Graminacee quali Echinochloa spp. (Giavone), Poa spp. (Gramigna della vite), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Setaria spp. (Panicastrelle), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano), Sorghum halepense (Sorghetta) da seme. Fra le infestanti a foglia larga controlla Amarantus retroflexus (Amaranto), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Matricaria chamomilla (Camomilla), Portulaca oleracea (Erba porcellana), Sinapis arvensis (Senape), Veronica spp. (Veroniche). Il prodotto è invece poco efficace su Stellaria media (Stellaria), Urtica spp. (Ortiche), Polygonum spp. (Persicaria, Coreggiola) e non controlla le malerbe perenni munite di rizomi, bulbi, stoloni quali Cynodon dactylon (Gramigna), Convolvulus arvensis (Convolvolo), Sorghum halepense (Sorghetta), Cirsium arvense (Stoppione), Artemisia vulgaris (Artemisia).

Per ottenere i migliori risultati è opportuno operare attenendosi alle seguenti modalità:

- Preparare accuratamente il terreno affinché non rimangono zolle;
- Applicare il prodotto **subito dopo la semina o qualche giorno dopo ma prima della nascita delle infestanti;**
- Diluire il prodotto in 4-6 o più ettolitri di acqua e distribuire la miscela uniformemente;
- Provvedere ad una leggera irrigazione a pioggia se entro 2 settimane non si è verificata una precipitazione di 8-10 mm.;
- Non effettuare eventuali lavorazioni a profondità tali da portare in superficie terreno non raggiunto dall'erbicida.

DOSI DI IMPIEGO

Il prodotto può essere usato da solo, dove predominano le Graminacee resistenti all'Atrazina o nel mais di secondo raccolto, alle dosi di lt. 6/ha che possono essere ridotti a lt. 5/ha nei terreni sciolti ed aumentati a lt. 7-8/ha nei terreni ricchi di sostanza organica.

Più frequentemente la composizione floristica dei campi di mais richiede l'unione dell'Atrazina all'Alachlor e pertanto le dosi/ha saranno di lt. 4-5/ha di prodotto e di Kg. 2/ha di un fomulato commerciale al 50% di Atrazina.

Quando si usa il prodotto da solo è sufficiente versarlo nel quantitativo di acqua necessario mescolando con cura.

Nel caso di miscela con prodotti a base di Atrazina è preferibile sciogliere i due prodotti in poca acqua separatamente, versare nella botte prima il prodotto a base di Atrazina e successivamente, sempre mescolando con cura, questo formulato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Il prodotto è compatibile con gli altri diserbanti impiegati sulla coltura di mais.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Evitare che il prodotto giunga a contatto di colture diverse dal mais. Alle dosi normali d'impiego non si hanno residui dannosi per le colture seminate purché dall'applicazione dell'erbicida alla semina di altre colture intercorrano 3-4 mesi e si proceda ad una buona aratura prima della semina.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO **LT. 1**

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

Via di Tor Sapienza, 172 - Roma

5527

SILQUAT

(SOLUZIÒNE)

Registrazione Ministero Sanità n. 5527 **del** 9.11.83

® Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Paraquat puro (da paraquat dicloruro)	g. 17,86
— Coformulanti	q.b. a g. 100,00

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 23 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro o cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata). L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale: non attendere la comparsa di sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perchè sia praticata l'emodialisi.
Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc..
Intossicazione per ingestione e per inalazione
I primi sintomi sono: epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà nella deglutizione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività dei tests di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato renali.
L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria.
L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di Paraquat nel sangue.
Intossicazione per contatto
Occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili stristure (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.
Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.
Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del Paraquat e sulla terapia possono essere richieste direttamente alla società produttrice di questo presidio sanitario.
CARATTERISTICHE
Il SILQUAT è un diserbante-disseccante per contatto, con parziale azione di traslocazione. Agisce direttamente ed esclusivamente sulle parti verdi (foglie, steli, germogli, fiori) delle piante trattate, rispettando gli organi lignificati (è quindi adattissimo per il diserbo negli interfilari e tra pianta e pianta nei vigneti e nei frutteti).
Non ha azione residua dato che il principio attivo viene prontamente e totalmente assorbito dai colloidi del terreno e conseguentemente inattivato: viene inattivato anche dalle acque fortemente torbide. La temperatura e l'umidità dell'aria non influenzano l'azione del SILQUAT e, quindi, anche eventuali piogge che dovessero seguire a breve distanza di tempo dal trattamento, non ne comprometterebbero assolutamente l'efficacia. Il SILQUAT non danneggia né le radici né i semi, anche se questi ultimi sono in fase di germinazione, purché non sia emersa la parte aerea della piante.
MODALITA' D'IMPIEGO
I trattamenti con SILQUAT vanno effettuati quando le infestanti hanno raggiunto un certo sviluppo; ma, se le infestanti si trovano in uno stadio di sviluppo molto avanzato, sarà necessario usare il prodotto alle dosi maggiori.
I trattamenti andranno preferibilmente effettuati nelle ore del tardo pomeriggio od alla sera.
Il SILQUAT deve essere distribuito in soluzione con una quantità di acqua variante da 300 a 800 litri per ettaro. E' inoltre necessario aggiungere alla soluzione un bagnante non ionico. Si consiglia pertanto l'aggiunta di SILBAT in ragione di 500 gr. per ettolitro. Si dovrà inoltre evitare che il liquido diserbante venga a contatto con le foglie delle piante coltivate.
Il prodotto può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature. Si sconsiglia l'uso degli atomizzatori, sia per la dispersione con danno alle colture sia per l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a questo inconveniente. Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per la diluizione e l'impiego del prodotto.
Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.
SETTORI E DOSI D'IMPIEGO
E' VIETATO L'IMPIEGO DIRETTO SUI FORAGGI
— Diserbo controllato, totale o localizzato di vigneti, frutteti, agrumeti; diserbo interparcellare delle colture ortive e floreali; preparazione e conservazione delle piazzole dell'olivo:
2-4 Kg./ha a seconda del grado e del tipo di infestazione e della fase di sviluppo delle malerbe da eliminare.
— Diserbo pre-semina, pre-emergenza e pre-trapianto delle colture ortive floreali ed erbacce in genere; diserbo vivaio:
3-4 Kg./ha.
— Diserbo asparagiale:
2-4 Kg./ha, trattando poco prima della fuoriuscita dei turioni.
— Diserbo totale dei luoghi incolti:
3-5 Kg./ha a seconda della specie di infestanti e del loro grado di sviluppo.
— Diserbo canali e sponde di corsi d'acqua:
da 4 Kg. a 8-10 Kg./ha contro Cannuccia (Phragmites communis), Carice (Carex), Mazza sorda (Typha). Tale trattamento dovrà essere ripetuto una-due volte durante la stagione ad intervalli di un mese, un mese e mezzo in funzione delle diverse condizioni ambientali.
— Miglioramento dei pascoli:
5-10 Kg./ha a seconda dello sviluppo delle infestanti, alcuni giorni prima della lavorazione e la semina eventuale di essenze utili.
— Diserbo del medicaio:
2,5-3 Kg./ha contro Stellaria, Veronica ed altre infestanti prima della ripresa vegetativa del medicaio. Contro la Cuscuta si dovrà intervenire direttamente sulle chiazze infestanti in qualsiasi momento dell'anno, impiegando 300-500 g. per 100 litri di acqua.
— Semina senza aratura (Sod-seeding):
si effettua un disseccamento delle infestanti 5-7 giorni prima della semina senza aratura impiegando la dose di 4-5 Kg./ha.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA'
E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. Il prodotto può essere usato in miscela o contemporaneamente con altri erbicidi solo se espressamente consigliato. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA'
Si consiglia di non usare il SILQUAT in presenza di piante arboree molto giovani. Si dovrà inoltre evitare che il liquido diserbante venga a contatto con le foglie delle piante coltivate e, comunque, che vengano colpite le colture limitrofe.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenuto conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zona di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

Via di Tor Sapienza, 172 - Roma

CONTENUTO KG. 5

5528

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

MIKAL RAME BLU

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la peronospora della vite
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 di Fosetil Alluminio puro.
Gr. 30 di Rame puro (da ossicloruro tetrarameico).
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da mobilità nelle piante.
La sistemicità si manifesta in modo soprattutto ascendente.
L'attività nei confronti della peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.
La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
Queste caratteristiche, unite alla persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta contro la peronospora della vite anche con interventi distanziati a cadenza fissa.

RAVIT S.p.A. per l'industria chimica
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. 55..8 **del Ministero della Sanità del** ....

4/83

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Il prodotto va impiegato sulla vite dal primo trattamento antiperonosporico fino alla fase di « chiusura del grappolo » compresa.
Il primo trattamento va effettuato quando i germogli della vite sono lunghi cm 10.
Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo.
Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di «chiusura del grappolo» compresa.
Per evitare interferenze nella fecondazione si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza della fioritura. Dovendo eseguire trattamenti antiperonosporici in tale periodo sono consigliabili miscele contenenti mancozeb anziché rame.
Dose: gr. 400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

E' miscibile con i prodotti viticoli della nostra gamma.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non impiegare il prodotto durante la fioritura.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5529

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SILTIOCARB P

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
DISERBANTE PER LA LOTTA
CONTRO LE INFESTANTI NELLE RISAIE

Registrazione Ministero Sanità n. 5529 **del** 23.11.83

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

— Benthiocarb puro	g. 36
— Propanil puro	g. 18
— Coformulanti *	q.b. a g. 100

* contiene CICLOESANONE e XILOLO

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni:
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE
La formulazione è un concentrato emulsionabile da usare in post-emergenza per il diserbo del riso. Il prodotto, grazie all'azione congiunta dei due principi attivi, si dimostra particolarmente attivo contro il Giavone, le Cyperacee ed Alismatacee nate da seme e che si trovano ai primi stadi di sviluppo.
L'intervento anticipato è reso possibile dalla combinazione Benthiocarb + Propanil, che libera dall'influenza della temperatura; si ottengono infatti eccellenti risultati anche con temperature basse.
Infestanti controllate: Giavone, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus Alisma plantago nate da seme.
Colture protette: Riso.
Epoca di intervento: il trattamento deve essere effettuato quando il Giavone si trova nella fase vegetativa compresa fra la 1ª e la 3ª foglia. Per ottenere la massima contemporaneità nella nascita delle infestanti si consiglia, dopo la semina del riso di tenere l'acqua ad un livello molto basso: 8-10 cm. In questo modo, al momento del trattamento, tutto il Giavone o quasi, si troverà nello stesso stadio di sviluppo e si potranno così eliminare quasi totalmente successive nascite dell'infestante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alla dose di 8-10 Kg./ha usando la dose più bassa contro il Giavone giovane e quella più elevata se predomina il Giavone invecchiato a 3-4 foglie.

Il formulato va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato: con motopompe a barra (8 m. ed ugelli da 1 mm.): 300-400 lt./ha; con pompe a spalla: 400-500 lt./ha.

Quando si impiegano le dosi massime (inizio accestimento), è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua a 600-700 lt./ha. La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile e, cioè, a circa 50 cm. da terra. L'applicazione del prodotto deve essere effettuata irrorando uniformemente la miscela erbicida, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina delle infestanti.

La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta, è sufficiente pertanto togliere l'acqua dalle camere 24-26 ore prima del trattamento avendo cura che le infestanti siano asciutte.

La risaia deve rimanere tale almeno per 24 ore, dopo di che, si dovrà ripristinare il livello dell'acqua, mantendolo il più alto possibile per 6-8 giorni. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso. Nel caso di riso trapiantato, effettuare la distribuzione del prodotto tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi al livello degli apici delle, foglie di riso per colpire meglio le infestanti che possono essere protette dalla vegetazione del riso, già abbastanza espansa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo. Inoltre, non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di fertilizzanti, insetticidi od altri antiparassitari altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA'
Alle dosi di impiego più elevate il prodotto, in particolari condizioni, può causare parziali necrosi od ingiallimenti degli apici delle foglie del riso che si risolvono però nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudicare lo sviluppo delle giovani piantine di riso.

NON ESEGUIRE L'INTERVENTO NEL CASO IN CUI SI PREVEDA UNA PIOGGIA A DISTANZA DI 3-6 ORE. EFFETTUARE IL TRATTAMENTO IN GIORNATE PRIVE DI VENTO, ONDE EVITARE CHE LA NUBE IRRORANTE POSSA ESSERE TRASPORTATA SU COLTURE LIMITROFE SENSIBILI: MEDICA, TRIFOGLIO, PISELLO, FAGIOLO, FRUTTETI, VIGNETI OD ALTRE.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO **KG. 5**

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

5530

TCA 95

ERBICIDA PER IL CONTROLLO DELLE GRAMINACEE INFESTANTI IN GRANULI SOLUBILI

COMPOSIZIONE

— TCA sodio puro .	gr. 95
— Coformulanti .	q. b. a gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante la manipolazione e l'impiego del prodotto si dovranno indossare abiti ed occhiali protettivi ed, eventualmente, respiratori (o semimaschere).

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il TCA 95 è un diserbante con azione specifica sulle più diffuse graminacee infestanti annuali e poliennali, è pure dotato di ottima azione secondaria verso alcune erbe a foglia larga (Amaranthus retroflexus, Brassica arvensis, Chenopodium album, Poligonum spp., Saponaria vaccaria). Agisce prevalentemente per assorbimento radicale e in parte anche per via fogliare. Se impiegato da solo non va interrato in quanto dotato di una forte solubilità in acqua e pertanto viene facilmente a contatto con le radici. In annate siccitose risulta indispensabile, per la buona riuscita del trattamento, l'incorporamento.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Pre-semina anticipata. Normalmente la flora infestante è costituita oltre che da graminacee anche da Dicotiledoni, pertanto il TCA 95, nella dose di Kg. 10-15 per ettaro risulta indispensabile per completare l'azione erbicida di: Pyrazon, Metamitron, Lenacil ed Ethofumesate ai quali viene miscelato.

Pre-semina
— Colture autunnali Kg. 13-15/ettaro
— Colture primaverili Kg. 7-10/ettaro

Pre-emergenza
— Colture autunnali Kg. 13-15/ettaro
— Colture primaverili Kg. 10-13/ettaro

Le dosi più basse si riferiscono all'impiego nei terreni sabbiosi. Qualora venga miscelato a diserbanti ad azione dicotiledonicida si rende necessario l'incorporamento.

RISO
Il TCA 95 combatte efficacemente la Serla o Rasparella (Leersya Oryzoides) e l'Erba bianca (Alopecurus gemiculatus). Effettuare il trattamento dopo la raccolta sulle stoppie in assenza di paglia oppure in inverno su terreno arato alla dose di Kg. 25-30/ettaro. Dal momento del trattamento alla semina del riso devono passare almeno 60 giorni.

PATATA
Kg. 7-10/ettaro in pre-emergenza; per il controllo delle infestanti Dicotiledoni aggiungere Kg. 2-2,5/ettaro di Monolinuron.

ERBA MEDICA
Kg. 10/ettaro nell'autunno dell'anno d'impianto: in presenza di infestanti a foglia larga aggiungere Kg. 4-5/ettaro di Dinoseb acetato.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità. Il TCA 95 è miscibile ai diserbanti che controllano le Dicotiledoni quali: Metamitron, Lenacil, Pyrazon, Ethofumesate, 2,4-D, MCPA, Clorato di Sodio, Dinoseb acetato, Linuron, Monolinuron.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Nei trattamenti al riso non trattare negli ultimi 60 giorni che precedono la semina.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (Bo)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. 5530 del 3.10.83 del Ministero della Sanità

NON VENDERSI SFUSO

5532

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

ERREVIT

Fungicida cupro-organico per la lotta contro
la Peronospora della vite e contro
Peronospora del pomodoro
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 19,8 di Rame puro (sottoforma di ossicloruro tetraramico)
Gr. 12 Mancozeb puro
Gr. 12 Folpet puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

L'ingestione provoca:
Azione irritante del tratto gastro-intestinale, con coliche addominali, bruciori, vomito, diarrea.

Il contatto con cute e mucose provoca:
Dermatiti, congiuntiviti faringiti. Possibilità di collasso cardio-circolatorio.

Consigli terapeutici di primo intervento:
In caso di ingestione:
Sollecitare il vomito, lavanda gastrica con carbone attivo (25 gr/litro di acqua), cure sintomatiche.

Per le forme cutaneo-mucose:
Lavaggio con acqua semplice, pomate oftalmiche, pomate dermatologiche.

Controindicati:
Alcool, olii, grassi.

Nel casi gravi:
Ricovero presso centri di rianimazione.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00138 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. [illegible] **Ministero della Sanità del** [illegible]
12 / 1982

CARATTERISTICHE

L'**ERREVIT** è un fungicida cupro-organico nel quale sono presenti tre principi attivi: il rame, il mancozeb ed il folpet, per la lotta contro la Peronospora della vite.
Possiede inoltre una qualche azione frenante sullo sviluppo della botrite

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite
- Contro la Peronospora: gr. 500/hl.

Pomodoro (solo fino alla prima fioritura)
- Contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Septoriosi del Pomodoro: gr. 450-500/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i prodotti della nostra gamma.
Non è compatibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco

Avvertenza: devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5533

ANTICRITTOGAMICO COMPLETO IN POLVERE SECCA

IV CLASSE

Composizione:

CLOROTALONIL puro	gr.	7,5
ZOLFO ventilato puro (esente da Selenio)	gr.	89,0
Coformulanti	q.b. a gr.	100,0

Tipo di formulazione: polvere secca

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA (Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione n. [illegible]
del [illegible]
del Ministero della Sanità

CARATTERISTICHE: anticrittogamico molto persistente a vasto spettro di azione. La sua formulazione consente un facile impiego nelle zone siccitose e la copertura della vegetazione da proteggere anche nei punti più difficili da trattare.

PARASSITI COMBATTUTI: Peronospora, Oidio, Muffa grigia, Antracnosi, Septoriosi, Moniliosi, Collectotricosi, Fumaggine, Vaiolatura, Bolla, Corineo, Ticchiolatura, Ruggine, Cladosporiosi, Alternariosi.

COLTURE PROTETTE: vite, pomacee (melo, pero), **drupacee** (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo), **agrumi** (arancio, mandarancio, limone, pompelmo, mandarino), **cereali** (frumento, segale, orzo, avena, sorgo), **mais, riso, barbabietola da zucchero, tabacco, colture ortive** (patata, pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero, cetriolo, zucchino, cavoli, lattuga, carota, sedano, fagiolo, fava), **colture industriali di piante ornamentali e da fiore in pieno campo e serra, piante forestali.**

DOSI D'IMPIEGO: Kg. 30-40/Ha a seconda delle colture e del loro sviluppo.

EPOCHE D'IMPIEGO: a scopo preventivo, a seconda del calendario di incubazione delle malattie. Contro l'oidio il trattamento può essere eseguito anche dalla prima comparsa delle infezioni.

MODALITA' D'IMPIEGO: trattare preferibilmente al mattino quando le piante sono ancora bagnate di rugiada. Distribuire uniformemente il prodotto affinché tutta la chioma delle piante risulti protetta. Evitare di trattare d'estate nelle ore più calde.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari formulati in polvere secca ad eccezione di quelli a reazione alcalina, con olii minerali, Captano, DDVP, Binapacryl e Diclofluanide. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: può arrecare danno alle seguenti **varietà di melo:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta del Canada, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; **di pero:** Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio e sulla **varietà di vite** Sangiovese. Può essere fitotossico per le cucurbitacee. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di melo, di pero e colture da fiore più delicate, prima dell'applicazione saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

Deve essere irrorato almeno tre settimane dall'impiego di olii minerali e captano.

Sospendere i trattamenti 7 GIORNI prima del raccolto

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 10

5534

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

POMARGOL

Prodotto ad azione fisiologica contro la rugginosità delle mele Golden Delicious

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 60 Zolfo puro (esente da selenio).
Sostanze ad azione fisiologica, eccipienti, coadiuvanti ed inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **POMARGOL** è un prodotto formulato in polvere bagnabile che va sciolto in acqua e irrorato sulle piante per combattere la rugginosità delle mele Golden Delicious.

Il **POMARGOL** contenendo zolfo, possiede anche azione antioidica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Iniziare i trattamenti a partire dall'apertura dei mazzetti fiorali.

Ripeterli ogni 8-10 giorni fino a cinque settimane dopo la caduta dei petali.

Dosi: kg. 1/hl.

Quando la temperatura è superiore a 20 gradi abbassare la dose a gr. 500-700/hl.

ANTIPARASSIDARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. .... del Ministero della Sanità del ....

3/82

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire il **POMARGOL** in un volume doppio o triplo d'acqua. Indi versare la poltiglia così ottenuta nell'irroratrice riempita per metà e portare a volume agitando

Tenere la poltiglia in agitazione durante il trattamento.

Preparare la miscela al momento dell'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Si consiglia di impiegare il prodotto da solo onde facilitarne l'azione. E' comunque compatibile con: Dithane M 45, Zirex 90, Redran PB 25 e Zolone 25.

Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.

Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Mele:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap; alla Golden Delicious se usato in periodi diversi da quello indicato al paragrafo « Dosi e modalità d'impiego ».

Sospendere i trattamenti cinque giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5535

II Classe

TELONE®

(FUMIGANTE)

Nematocida del terreno e per reimpianti di vite, pesco ed agrumi.
Contro le Anguillule (Nematodi) ed ogni insetto terricolo.

COMPOSIZIONE	contenuto kg. 20
100 grammi di prodotto contengono:	
— 1,3 - dicloropropene puro	g 92,3

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di
SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza 172 - Roma

® Marchio registrato della THE DOW CHEMICAL COMPANY
Registrazione Ministero Sanità n. 5535 del 15.11.83
® Marchio depositato n.

NATURA DEL RISCHIO:

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico - tempo di latenza: anche parecchie ore.
Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia. I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.
Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittere da epatite tossica.
Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione e edema polmonare.
Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea.
Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone. Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con molta acqua corrente per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 gr. di solfato di sodio o di magnesio. Terapia sintomatica.
In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena; cortisonici; ossigeno se necessario; se è presente edema polmonare somministrare anche diuretici (tiazide).
Nei casi gravi è indispensabile il ricovero in Centro di rianimazione.
Controindicazioni: non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

CARATTERISTICHE

Il TELONE è un fumigante nematocida che elimina dal terreno le Aunguillule o Nematodi.
In particolare l'Anguillula delle Patate (Heterodera rostochiensis), l'Anguillula delle piante erbacee e floreali (Tylenchus devastator), l'Anguillula della Bietola (Heterodera Schactii), l'Anguillula delle radici (Heterodera radicicola), l'Anguillula del Frumento (Tylenchus Tritici) di norma presenti in tutti i terreni e parassiti di quasi tutte le colture.

DOSI DI IMPIEGO

Le dosi di impiego del TELONE variano da 100 a 150 litri per ettaro. La dose minima si impiega nei terreni mediamente infestati da Nematodi, la massima nei terreni fortemente infestati o di natura molto sciolta
Nella scelta della dose di impiego si eseguirà un analogo criterio a seconda del grado di infestazione e della specie dei Nematodi presenti nel terreno. Contro i Nematodi a cisti si impiegheranno, ovviamente, le dosi maggiori.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il TELONE si inietta nel terreno, preventivamente lavorato, mediante pali iniettori.
Le iniezioni vanno fatte alla distanza di cm. 30-40 fra loro alla profondità di 10-15 cm. Dopo il trattamento si dovrà rullare il terreno e, comunque, irrigarlo per renderlo il più possibile impermeabile ad evitare così una rapida esalazione del nematocida.
Affinché il prodotto esplichi un'azione completa si consiglia di operare quando la temperatura del terreno si aggira intorno ai 15°C e quando il terreno stesso non è né troppo umido né troppo secco.
Il giusto grado di umidità è quello richiesto per la semina.

PRECAUZIONI

La Fumigazione deve essere fatta su terreno nudo in quanto i vapori di TELONE sono fitotossici. Pertanto si dovrà avere cura di non effettuare i trattamenti in vicinanza di piante arboree); per la stessa ragione tra l'applicazione del fumigante e la semina od il trapianto nel terreno trattato, dovranno trascorrere almeno 28 giorni, comunque, prima della messa a coltura sarà opportuno sottoporre il terreno ad una leggera lavorazione.

AVVERTENZA: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

E' VIETATO L'IMPIEGO DEL PRODOTTO IN SERRE ED AMBIENTI CHIUSI.
NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5536

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici: conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento grave per inalazione, ingestione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione:
Emorragie cutanee e delle mucose. La sintomatologia è prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di ingestione accidentale provocare il vomito con acqua calda salata; nei casi gravi ricorrere al medico perché pratichi trasfusioni di sangue ed endovenose di Vitamina K somministrandola anche per bocca, essendo il principio attivo un anticoagulante.

CONTROINDICAZIONI:
Anticoagulanti

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO KG. 25

graintox

ESCA TOPICIDA RATTICIDA

PRONTA ALL'USO

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:

Warfarin puro	gr.	0,025
Coformulanti ed adescanti	q. b. a gr.	100

KOLLANT

KOLLANT - Industrie Chimiche S.p.A.

ISTRUZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO:
GRAINTOX è un'esca topicida pronta all'uso per la distruzione di topi e ratti. GRAINTOX svolge la sua azione tossica dopo 4 - 5 ingestioni causando la morte dei roditori per emorragia interna, senza agonia e quindi senza suscitare allarme e diffidenza nei consimili, il che permette la totale disinfestazione. I topi una volta intossicati, presi da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all'aperto.
GRAINTOX va sparso a mucchietti di 50 - 70 gr. ove si nota presenza o passaggio di topi e ratti, avendo cura di non toccare l'esca con le mani e di mascherarla agli animali domestici.
GRAINTOX va usato in colture floricole, orticole, arboree in pieno campo o in serra; nei magazzini di raccolta delle derrate alimentari e dei mangimi; nelle stalle.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto è tossico per l'uomo, gli animali domestici. Il bestiame ed i pesci se assorbito o ingerito.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato.

Registrazione del Ministero della Sanità

n del

KOLLANT
INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
sede: PADOVA, via Euganea, 52
Officina di produzione propria
VIGONOVO (VE)
via C. Colombo, 7-7/A
Tel (049) 502 855 - 655.300
Telex 430813 KIC

5537

RONILAN FL

Fungicida particolarmente efficace contro la Botrite, Monilia e Sclerotinia.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:
Vinclozolin puro g. 41,3
Coformulanti q.b. a g. 100
(contiene: glicole etilenico)

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N.° 5537 **del** [illegible]

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il RONILAN FL è un fungicida organico in forma liquida ad azione preventiva e bloccante, attivo contro le principali forme di Botrite, Sclerotinia e Monilia. Il RONILAN FL è tollerato dalle piante e non conferisce alcun sapore ai raccolti.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Botrite della vite
150-200 cc/100 litri impiegando per la distribuzione almeno 1.000 litri di acqua per ettaro.
Il numero di interventi è strettamente dipendente dalle condizioni climatiche, con particolare riguardo alla piovosità. In condizioni favorevoli all'attacco della malattia si consigliano quattro trattamenti ai seguenti stadi vegetativi: fine fioritura, prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura, tre-quattro settimane prima della raccolta. Su varietà di vite a maturazione precoce o meno sensibile: prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura e tre settimane prima della raccolta. E' necessario assicurare una ricca ed uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere ed in particolare dei grappoli. Il RONILAN FL non influisce sulla fermentazione del mosto.

Botrite della fragola
100-150 cc/100 litri impiegando per la distribuzione almeno 1.000 litri di acqua per ettaro.
In condizioni favorevoli all'attacco della malattia intervenire nei seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, piena fioritura e tre settimane prima della raccolta.

Monilia delle drupacee: Mandorlo, Susino, Albicocco, Ciliegio e Pesco
100-150 cc/100 litri.
— Monilia dei rami e dei fiori
Trattamenti all'inizio e durante la fioritura (intervallo di 8-12 giorni).
— Monilia dei frutti
Trattamenti 4-5 e 3 settimane prima della raccolta.

Sclerotinia e Botrite delle insalate: Lattuga, Indivia e Radicchio
100-150 cc/100 litri. Trattare iniziando dopo il trapianto quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie e ripetere eventualmente l'intervento. Distribuire il prodotto con almeno 1 litro d'acqua per 10 mq.

Botrytis dei pomodori
50-80 cc/100 litri. Trattare iniziando dopo la prima fioritura e ripetere l'intervento ad intervalli di 10-15 giorni.
Il volume d'acqua da impiegare è calcolato in funzione dello sviluppo e della fase fenologica della pianta in modo da distribuire: fino al secondo palco florale 600-800 l/ha e successivamente 1.000-1.500 l/ha di poltiglia.

Botrite e Marciume bianco (Sclerotium) delle liliacee e iridacee: Aglio, Cipolla, Gladiolo e Tulipano in pieno campo.
Trattamento dei bulbi: 300 cc/100 litri. Trattamento per immersione per circa 15'.

Botrite delle colture floricole: Gerbera, Ciclamino, Geranio in pieno campo
50-80 cc/100 litri. Trattamenti preventivi ripetuti.

Non trattare semenzai o vivai

Per ottenere una poltiglia più omogenea è utile stemperare il prodotto in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI NELL'IMPIEGO AGRICOLO

Il RONILAN FL è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio POLYRAM COMBI e KUMULUS S. Il RONILAN FL è miscibile con i fertilizzanti fogliari HAKAPHOS e BASFOLIAR 34.
Si sconsiglia di miscelare il prodotto a poltiglie fortemente alcaline.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

litri 1

5538

III CLASSE TOSSICOLOGICA

**ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA**

COPERAL MB

**Fungicida
Polvere bagnabile**

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 8 di Cimoxanil puro
gr. 68,6 di Mancozeb puro
Sostanze inerti q.b. a 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamante con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ANTIPARASSIDARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. .... **del Ministero della Sanità del** ....

3/82

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Sulla vite può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro, solo fino alla prima fioritura: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
Usare la dose di 200 gr. ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora e di Alternaria.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con: Beniate; Dithane M 45; Karathane WD; Karathane L C; Iprodial; Sulfosol 80; Gutene; Dimetoil E; Drinfos 20; Lannate 25; Lannate L; Delfos M 20; Tortrin 85; Fitofos 20; Ovotek; Sumifos; Emmaton 50; Zolone P.B. 25; Zolone Liquido 25; Azofol L.
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5539

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

MIKAL F BLU

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro Peronospora ed Escoriosi della vite

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 50 di Fosetyl alluminio puro
gr. 25 di Folpet puro
Adiuvanti e coloranti q.b. a 100

Norme precauzionali

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione.

Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea.

Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.

Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia.

Lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida sistemico e di contatto, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante.

La sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente.

L'attività del prodotto nei confronti della Peronospora si è rivelata sia preventiva che curativa.

Tale attività è tanto più evidente quanto più la vegetazione è giovane ed in fase di attiva crescita.

La grande sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

Queste caratteristiche che unite alla sua grande persistenza d'azione, permettono di impostare una lotta antiperonosporica con interventi distanziati a cadenza fissa.

Il prodotto possiede anche azione sulla Escoriosi ed un'azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilim.: Ossasolo (To)

Reg. n. .... del Ministero della Sanità del ....

3/82

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

VITICOLTURA

Contro Peronospora. Il primo trattamento con il prodotto si deve effettuare quando i germogli della vite sono lunghi cm. 10.

Il secondo trattamento va distanziato di 10 giorni dal primo. Successivamente i trattamenti vanno distanziati di 15 giorni fino alla fase di allegagione compresa.

Dose: gr. 250-300/hl.

Contro Escoriosi. Dose gr. 300/hl. — effettuare due trattamenti: il primo nella fase di « gemma mossa » (fase D del Baggiolini) e il secondo nella fase di foglie formate (fase E del Baggiolini).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima del raccolta

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5540

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

BENZEB 5 - 60

Polvere bagnabile
Fungicida organico per la lotta contro la Ticchiolatura del Melo e del Pero e contro altre malattie della Vite, del Garofano e della Rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
gr. 5 di Benomyl puro
gr. 60 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico formato da due principi attivi (Benomyl + Mancozeb) in proporzioni ben definite, per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee.

Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione di contatto del Mancozeb il prodotto può impiegarsi a cadenza fissa, indipendentemente dall'andamento stagionale, dal primo all'ultimo trattamento contro la Ticchiolatura.

Il prodotto combatte inoltre altre malattie delle colture sottoindicate

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

Melo e Pero - Contro Ticchiolatura gr. 200/hl. — Iniziare i trattamenti appena prima dell'apertura delle gemme e ripeterli a cadenza fissa di 8 giorni nel periodo prefiorale, e di 12 giorni nel periodo post-fiorale.

Vite: contro Peronospora, gr. 300/hl.; esplica inoltre una qualche azione di contenimento su Botrytis.

Rosa in pieno campo: contro Ruggine, Peronospora e Ticchiolatura, gr. 300/hl.
Garofano in pieno campo: contro Ruggine, Alternariosi, Eterosporiosi e Septoria gr. 300/hl.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Compatibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Varietà di pere sensibili al **MANCOZEB:** Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

ANTIPARASSIDARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

bpd

Reg. n. .... **del Ministero della Sanità del**

3/82

5541

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

BENZEB 10 - 40

Polvere bagnabile
Fungicida organico per la lotta contro la Ticchiolatura del Melo e del Pero e contro altre malattie della Vite, del Garofano e della Rosa

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 10 di Benomyl puro
gr. 40 di Mancozeb puro
Coformulanti q.b. a 100

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni

Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ANTIPARASSIDARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento: Ravit Quassolo (TO)

Reg. n. .... del Ministero della Sanità del ....

3/82

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida organico formato da due principi attivi (Benomyl + Mancozeb) in proporzioni ben definite, per la lotta contro la Ticchiolatura delle pomacee.

Grazie all'azione sistemica del Benomyl, unita all'azione di contatto del Mancozeb il prodotto può impiegarsi a cadenza fissa, indipendentemente dall'andamento stagionale, dal primo all'ultimo trattamento contro la Ticchiolatura.

Il prodotto combatte inoltre altre malattie delle colture sottoindicate.

APPLICAZIONI E DOSI D'IMPIEGO

— **Melo e Pero** - Contro Ticchiolatura gr. 200/hl. — Iniziare i trattamenti appena prima dell'apertura delle gemme e ripeterli a cadenza fissa di 8 giorni nel periodo prefiorale, e di 12 giorni nel periodo post-fiorale.
— **Vite**: contro Peronospora, gr. 300-350/hl.; esplica inoltre una qualche azione di contenimento su Botrytis.
— **Rosa** in pieno campo: contro Ruggine, Peronospora e Ticchiolatura, gr. 300/hl.
— **Garofano** in pieno campo: contro Ruggine, Alternariosi, Eterosporiosi e Septoria gr. 300/hl.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Compatibile con i prodotti della nostra gamma.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiute.

FITOTOSSICITÀ

Varietà di pere sensibili al **MANCOZEB**: Abate Fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

AVVERTENZA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5542

MANCOSOL®

ANTICRITTOGAMICO AD AZIONE MULTIPLA

Caratteristiche: anticrittogamico ad azione preventiva ed anche curativa per gli oidi.
Campi d'impiego e dosi: ogni 100 litri d'acqua:
- **Vite:** gr. 500-600 per peronospora, escoriosi, antracnosi, marciume nero, oidio.
- **Pomacee:** gr. 500-600 per ticchiolatura, septoria, ruggine, alternaria, Glomerella, oidio.
- **Pomodoro solo fino alla prima fioritura:** gr. 400-500 per peronospora, alternariosi, septoriosi, cladosporiosi, antracnosi, oidio.
- **Cereali in campo:** kg. 7-8/Ha per ruggine, septoriosi, Helminthosporium sp., Rhynchosporium Secalis, Alternaria sp., Dilophospora Alopecuri, Fusarium sp., Cladosporium sp.
- **Pioppo:** gr. 600-800 per marssonina, ticchiolatura.

Divieti d'impiego: divieto d'impiego in serra e su colture diverse da quelle indicate.
Epoche d'impiego: a scopo preventivo, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie. **Pomodoro:** solo fino alla prima fioritura. **Cereali in campo:** trattare nel periodo compreso tra la spigagione e la fioritura.
Modalità d'impiego: bagnare abbondantemente ed uniformemente la superficie vegetale da proteggere onde ottenere una loro perfetta copertura. Aggiungere ogni 100 litri di poltiglia gr. 100 di bagnante ASTROL.
Da non applicare con mezzi aerei.
Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina, con olii minerali, captano, DDVP, binapacryl, diclofluanide e con concimi fogliari contenenti boro. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: cultivars di melo sensibili al prodotto: Imperatore, Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Rome Beauty, Stayman Red, Stayman Winesap, Renetta del Canada. **Cultivars di pero sensibili al prodotto:** Buona Luigia d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio, Coscia, Curato, Gentil Bianca, Giardina, Moro, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, William precoce, Abate Fêtel, Butirra precoce Morettini, Conference, Armella, Gentilona, Principessa di Gonzaga, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna. **Cultivars di vite sensibili al prodotto:** Sangiovese. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di melo e di pero, saggiare la selettività del formulato su alcune piante prima dell'applicazione a pieno campo. Non usare il prodotto durante le ore molto calde. Il prodotto deve essere irrorato almeno 21 giorni dopo l'applicazione degli olii minerali e del captano.
Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.
Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Composizione:

MANCOZEB puro .	gr. 30
ZOLFO micronizzato (esente da selenio) puro . . .	gr. 20
Coformulanti .	q.b. a gr. 100

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Registrazione N.
del
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanze pericolose per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti ● Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi d'intossicazione: *l'ingestione provoca nausea - conati di vomito - sonnolenza - turbe nervose - bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).*
Terapia:
In caso di ingestione: *provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza, la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche.*
Per l'irritazione della cute e delle mucose: *lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.*
Controindicazioni: *alcool, olii, grassi.*
Nei casi gravi, ricovero urgente in Centro di rianimazione.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

5543

CARBOFURAN BAYER
CURATER 2,5 Granulare

CLASSE I

VELENO

INSETTICIDA SISTEMICO

per la lotta contro i parassiti che vivono nel terreno (elateridi, blaniuli, scutigerelle) e quelli che attaccano le foglie nei primi stadi di sviluppo (altica, atomaria, cleono, mosca) di barbabietola da zucchero, mais, patata, cipolla e aglio

COMPOSIZIONE

g 100 di Carbofuran Bayer Curater 2,5 Granulare contengono:
g 2,5 di carbofuran puro
adesivanti ed inerti quanto basta a 100.

ATTENZIONE - Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, n. 1255.

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della polinesterasi).
Sintomi d'intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero in centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

ISTRUZIONI PER L'USO

1) **Trattamento parziale del terreno:** bietola: 20-24 kg/ha; mais: 16-24 kg/ha; cipolla e aglio: 20-24 kg/ha; patata: 30-40 kg/ha. Distribuire il prodotto localizzato lungo le file con le apposite attrezzature meccaniche.
2) **Trattamento generale del terreno:** 80-120 kg/ha distribuendo il prodotto spaglio uniformemente a mezzo di spandiconcimi e quindi interrando.

Il Curater 2,5 Granulare non trasmette alcun odore o sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.

Da non applicare con mezzi aerei

Miscibilità: il prodotto va impiegato da solo.
Nocività: il prodotto è tossico ad animali domestici, bestiame e pesci.
Il Carbofuran Bayer Curater 2,5 Granulare può essere usato solo in presemina, in pre-emergenza o pre-trapianto.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 5543 **del** 23.11.83

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg **25**

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5544

AGER BEMIL

Fungicida sistemico a base di Benomil

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

BENOMIL puro gr 50
Ingredienti inerti q.b. a gr 100

CLASSE IV

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i normali interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE GENERALI

L'AGER BEMIL è un fungicida sistemico ad azione preventiva e eradicante indicato contro le malattie crittogamiche: Moniliosi, Ticchiolatura, Oidio, Botritis dei fruttiferi (meli, peri, albicocchi, susini e peschi), della vite, delle colture ornamentali in pieno campo e frumento.

Preparazione della poltiglia: Formare una pasta semiliquida sciogliendo la dose di Ager Bemil in poca acqua, portare a volume aggiungendo la rimanente acqua e tenendo la miscela in costante agitazione. Salvo che nei trattamenti per il melo è consigliabile l'aggiunta di un bagnante per trattamenti a piante di difficile bagnatura.

Modalità o dosi di impiego

FRUMENTO: contro fusariosi e septoriosi gr. 150/200 Ha

VITE: contro la Botritis usare gr. 60 di Ager Bemil per 100 lt. di acqua; iniziare i trattamenti subito prima della fioritura per le qualità sensibili al'a botritis del peduncolo o in caso di andamento stagionale piovoso o subito dopo la fioritura. Effettuare 5 trattamenti rispettando il periodo di carenza. Usare non meno di 1500 lt. di acqua/Ha bagnando accuratamente i grappoli.

L'Ager Bemil non ha effetti negativi sulla fermentazione dei mosti. Contro l'oidio usare gr. 60 di Ager Bemil per 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti ne'la fase di gemma mossa a 3-4 cm. e continuare per tutta la stagione secondo il nomale ca'endario antioidico.

MELO e PERO: contro la Ticchiolatura e oidio: usare gr. 50/60 di Ager Bemil per 100 lt. di acqua ad intervalli fissi, iniziando all'apparizione dei mezzetti fiorali. Alla dose superiore il prodotto svolge azione curativa ed eradicante contro la Ticchiolatura.

Gloeosporium: gr. 60 di Ager Bemil in 100 lt. di acqua in un unico trattamento preraccolta all'inizio di settembre. Su varietà particolarmente sensibile si consiglia di aumentare la dose a gr. 100 per 100 lt.

ALBICOCCO, PESCO e SUSINO: contro la Moniliosi: gr. 60 per 100 lt. di acqua. Effettuare i trattamenti prima, durante e dopo la fioritura e, se necessario, prima della raccolta (rispettando però il periodo di carenza) per prevenire le malattie da conservazione (Botritis e Monilia) sulle piante da industria.

PIANTE ORNAMENTALI: contro Oidio e Botritis gr. 60 di Ager Bemil per 100 lt. di acqua.

L'impiego del prodotto è consentito solo in campo per le colture indicate in etichetta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: L'Ager Bemil è compatibile con la maggior parte dei fungicidi e degli insetticidi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Si consiglia di tenere lontani gli animali domestici ed il bestiame durante i trattamenti.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del'a raccolta per il frumento; 15 per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Avvertenza: Non lasciare che l'Ager Bemil diventi umido durante l'immagazzinamento, ciò può procurare alcune trasformazioni chimiche che riducono l'efficacia fungicida del prodotto. Tenere la confezione ben chiusa quando il prodotto non è impiegato. Bruciare la confezione dopo l'uso. Se il trattamento con l'Ager Bemil effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta non è efficace può essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente. L'impiego immediato di altro fungicida adeguato potrebbe essere consigliabi'e.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, a persone ed animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.

Via Nomentana, 299 - ROMA

Officina di Produzione: ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - AVENZA (MASSA)

Registrazione del Ministero del'a Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 1

5545

PERTIODIN®

FUNGICIDA ORGANICO
AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

TIOFANATE METIL puro		gr. 35
DODINA pura		gr. 35
Coformulanti	q.b. a	gr. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

CARATTERISTICHE: fungicida organico ad azione preventiva o curativo.
MALATTIE COMBATTUTE: ticchiolatura, oidio, verticilliosi, fusariosi.
COLTURE PROTETTE: melo, pero, colture industriali di piante ornamentali e da fiore.
AVVERTENZA: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

DOSI D'IMPIEGO:

Melo - Pero: trattamenti pre-florali e primi post-florali . . . gr. 100-150/hl
trattamenti post-florali e successivi . . . gr. 80-100/hl
trattamenti curativi . . . gr. 150/hl

Colture industriali di ornamentali e fiori: gr. 3-4/mq in 5-10 lt. d'acqua.

EPOCHE D'IMPIEGO:

Melo - Pero: eseguire trattamenti preventivi a distanza di circa una settimana l'uno dall'altro nel periodo primaverile e ad intervallo più ampio nel periodo post-florale successivo. In funzione curativa contro la ticchiolatura eseguire il trattamento entro 60-72 ore dall'inizio delle piogge infettanti.

Colture industriali di fiori: a scopo preventivo eseguire trattamenti su terreno prima dell'impianto della coltura e, se necessario, a coltura in atto, a seconda del calendario d'incubazione delle malattie.

MODALITA' D'IMPIEGO: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela ottenuta nel totale quantitativo d'acqua rimescolando energicamente. Distribuire quindi la miscela uniformemente su tutti gli organi e le superfici da proteggere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina, clorobenzilati ed endosulfan; non è consigliabile miscelarlo con carbaryl, dimetoato, azinphos-metile e DDVP. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali possono dar luogo a scarsa sospensività. In ogni caso è preferibile eseguire miscele con prodotti in polvere bagnabile. Se si deve eseguire una miscela con prodotti liquidi, usare la miscela subito dopo la preparazione con apparecchi provvisti di agitatore. **AVVERTENZE:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': per la Golden Delicious può essere fitotossico a dosi superiori allo 0,5%. Evitare trattamenti con acque troppo fredde e con temperature esterne prossime a 0°C. Su colture in atto di piante ornamentali e da fiore, dato l'elevatissimo numero di varietà, eseguire trattamenti di saggio su poche piante, prima di trattare l'intera coltivazione.

NOCIVITA' A SEGUITO DEL TRATTAMENTO: il prodotto è tossico per gli animali domestici, bestiame e pesci. Da non impiegare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente od accidentalmente prima che non siano trascorsi 15 giorni dal trattamento.

Sospendere i trattamenti 15 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex I 511046

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione N.
del
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi di intossicazione: *azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.*

Terapia: *lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.*

DA NON VENDERSI SFUSO
Kg. 1

5546

NECOBOL

Fungicida organico in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

— CAPTAFOL puro gr. 80

— Bagnanti e sospensivanti q.b. a gr. 100

CLASSE TOSSICOLOGICA IV

NORME PRECAUZIONALI:

— conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Durante la manipolazione e l'impiego, usare guanti ed occhiali protettivi. Evitare il contatto diretto con il prodotto, puro o diluito, ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto stesso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 20 per litro d'acqua) e digitale.

MODALITA' D'IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)

Il NECOBOL è un fungicida organico di sintesi a vasto spettro d'azione.

Pomacee: contro il cancro del legno trattando alla caduta delle foglie gr. 200 contro la ticchiolatura gr. 100-150.

Drupacee: contro la Bolla, Corineo, e cancro delle drupacee nei trattamenti al bruno gr. 250, nei trattamenti al verde gr. 150.
Unico trattamento alla caduta delle foglie gr. 500.
Contro monilia del pesco, albicocco, susino, mandorlo gr. 150-200, contro marciume bruno dell'albicocco, ciliegio e mandorlo gr. 250 nei trattamenti al bruno, gr. 100-150 nei trattamenti al verde.

ORTICOLTURA:

Pomodoro: contro Peronospora, Septoria, Alternaria, Antracnosi, Botrite gr. 150-200.

Peperone e Melanzana: contro Peronospora ed Alternaria gr. 150-200; contro il Cancro del colletto (Phytophthora capsici) pre-trapianto immergendo i colletti in una sospensione di 150 g/hl, distribuire sul terreno Kg. 1-1,5, per 100 mq. disperdendo con acqua quanto basta.

Anguria, Melone, Cetriolo, Cipolla, Porro, Sedano e Fagiolo: contro Peronospora, Phytophthora Antracnosi, Vaiolatura, Botrite gr. 150-200.

Tabacchicoltura: contro Peronospora, Alternaria, Antracnosi gr. 100.

Cereali in campo: contro Ruggine, Septoria Kg. 2 ad Ha.

Concia delle sementi: contro Carie, Elmintosporiosi, mal del piede del grano, brusone del riso (Piricularia oryzae) elmintosporiosi del grano, mais e riso, per la bietola da zucchero gr. 600 per q.le.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

COMPATIBILITA': è incompatibile con prodotti a reazione alcalina e oleosi ed emulsionabili.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': è tossico per i pesci.

INTERVALLO: sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

S.C.A.M. srl MODENA
Officina di Produzione: SCAM - MODENA
Registrazione Ministero della Sanità n. 5546 del 23 11. 83

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Netto Kg. 0,100

SCAM
MODENA
CONCIMI BIOCHIMICI
CONCIMI FOGLIARI
ANTIPARASSITARI
Stabilimento e uffici: S. MARIA DI MUGNANO - Tel. 30.91.31

5547

EMISCAM

Aficida polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

PIRIMICARB puro	gr. 23,75
Bagnanti ed adesivanti	q.b. a gr. 100

CLASSE TOSSICOLOGICA: III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
- conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi d'intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi bradicardia edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

CONTROINDICAZIONI: la ossima (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

MODALITA E DOSI D'IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua):

L'EMISCAM è un aficida specifico caratterizzato da una notevole prontezza d'azione.
Contro tutti gli afidi alla dose di gr. 100-150 da usarsi sulle seguenti colture:

Agrumi: (arancio, mandarino, mandarancio, limone, cedro, bergamotto);

Frutticoltura: (melo, pero, pesco, ciliegio, susino, albicocco, mandorlo);

Orticoltura: (insalate, lattughe, cicorie, pomodoro, peperone, melanzana, cocomero, melone, zucchino, cetriolo, fagiolino, fagiolo, pisello).

Cereali: (frumento, orzo, mais).

Compatibilità: è compatibile con tutti i formulati.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

INTERVALLO: osservare un intervallo di 14 giorni dall'ultimo trattamento e la raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

S.C.A.M. srl MODENA
Officina di Produzione: SCAM - MODENA
Reg. Ministero Sanità n. 5547 del 29 11 83

DA NON VENDERSI SFUSO.

Peso Netto Kg. 0,100

5548

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Una compressa da g. 10 contiene g. 1 di NAA.

contiene 10 compresse da g. 10

ALFA - TAB

FITOREGOLATORE

Prodotto ad azione anticascola per melo e pero

Composizione:

NAA puro	g. 10
Coformulanti	q.b. a g. 100

Tipo di formulazione: compresse solubili in acqua

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

AGRICO s.r.l.

Viale Masini, 20 - BOLOGNA

Stabilimento di produzione:
FERM PROD. INC. - New York - N.Y. (U.S.A.)

Registrazione del Ministero della Sanità

n. 5548 del 23 11 83

MODALITA D'IMPIEGO

Caratteristiche: fitoregolatore ad azione anticascola.
Il prodotto, grazie alla sua particolare formulazione che lo rende direttamente solubile in acqua e alla sua presentazione in compresse effervescenti è di pronto impiego e di facile uso.

Colture: melo, in particolare su varietà Delicious Rosse e Golden, Jonathan, Stayman, Winesap, King David, Morgenduft, Gravenstein, Renetta del Canadà; pero, in particolare su varietà William, Kaiser, Butirra Clairgeau, Passa Crassana, Decana del Comizio, Curato, Buona Luisa d'Avranches, Favorita di Clapp.

Concentrazioni e dosi d'impiego: 1 compressa per 100 litri di acqua.

Epoche d'impiego: sulle varietà precoci, 7-8 giorni e sulle varietà più tardive, 20-25 giorni prima della raccolta.

Metodi d'impiego. Al momento dell'uso, sciogliere la compressa o parte di essa in poca acqua, lasciando riposare per circa 5 minuti una volta cessata l'effervescenza agitando occasionalmente. Si ottiene una soluzione concentrata che va portata alla diluizione voluta. La soluzione va usata in giornata. La diluizione va eseguita con acqua perfettamente pulita e non calcarea in recipienti non metallici pulitissimi. La soluzione va distribuita a volume normale, bagnando uniformemente la vegetazione, dirigendo il getto verso i frutti e i loro peduncoli. Trattare nelle ore meno calde e meno illuminate della giornata.

Avvertenze
— Evitare lo sgocciolamento e quindi il sovradosaggio.
— Il prodotto interviene nei processi fisiologici e pertanto i risultati del trattamento dipendono anche dalle condizioni fisiologiche delle piante e dalla situazione ambientale. Esse vanno pertanto attentamente valutate con messe a punto preliminari.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il prodotto va impiegato da solo.

Fitotossicità: Evitare di trattare piante sofferenti o che hanno acquisito sensibilità eccessiva ai fitoregolatori. In caso di varietà non provate, eseguire test parziali.

Sospendere il trattamento 5 giorni prima del raccolto.

Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto [illegible]

5551

VECLAN

Diserbante selettivo per cereali in polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

NEBURON puro	gr. 60
Coadiuvanti	q. b. a gr. 100

CLASSE TOSSICOLOGICA: IV

NORME PRECAUZIONALI:

- — conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- — non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- — dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Il VECLAN è un diserbante selettivo per il grano e per i cereali minori.

E' assorbito per via radicale e traslocato per via xilematica.

Il VECLAN è poco solubile in acqua, perciò si stratifica sulla superficie del terreno rispettando i germinelli del grano. Controlla la Poa annua e la Coda di topo che germinano all'epoca del trattamento; inoltre inibisce la germinazione e la crescita di numerose dicotiledoni annuali (Papavero, Stellarie, Cerastio, Capsella, Veccia, Ranuncoli, Camomilla).

Il VECLAN si impiega nel periodo compreso fra la semina e l'emergenza del grano e dei cereali minori alla dose di Kg. 5-7 per Ha, in 800-1000 litri d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: è incompatibile con tutti i prodotti antiparassitari.

Fitotossicità: può essere impiegato una seconda volta sul medesimo terreno solo se si osserva un intervallo di 7 mesi dalla prima applicazione.

INDICAZIONI DI IMPIEGO: Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

S.C.A.M. srl MODENA
Officina di produzione: SCAM/MODENA
Reg. Min. Sanità n. 5651 del 23 11. 83

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Netto Kg. 5

SCAM
MODENA
CONCIMI BIOCHIMICI
CONCIMI FOGLIARI
ANTIPARASSITARI
Stabilimento e uffici: S. MARIA DI MUGNANO - Tel 30.91.31

5552

ACSIUS 5

Insetticida liquido emulsionabile

COMPOSIZIONE:

Permetrina pura	gr. 5
Solventi ed emulsionanti	q.b. a gr. 100

contiene xilolo.

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

CLASSE TOSSICOLOGICA: III.

NORME PRECAUZIONALI:

— conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi d'intossicazione: l'ingestione di elevate quantità di permetrina può causare tremore.

Trattamenti terapeutici: indurre il vomito. Trattamenti sintomatici.

MODALITA D'IMPIEGO: (dosi per 100 lt. d'acqua)

L'ACSIUS 5 esplica la sua azione prevalentemente per contatto e in minor misura per ingestione: è particolarmente attivo verso lepidotteri, psillidi, afidi e trialeurodidi.

Frutticoltura (mele, pesche, ciligie, prugne, pere): contro l'afide grigio e verde, le ricamatrici della frutta, la psilla del pero, i tripidi e afidi del pesco gr. 200.

Orticoltura: (solanacee, brassicacee, cucurbitacee, lattuga, porri, carote, spinaci, funghi): contro la cavolaia, nottue, trialeurodidi, afidi, gr. 150-200.

Viticoltura: contro le tignole, cicaline, gr. 150-200.

Agrumi: contro Dialeurodidi, Afide bruno, Tignola della zagara, Cocciniglie.

Floricoltura: contro gli afidi, tripidi, larve di cocciniglie, tignola delle piante ornamentali gr. 150-200.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: ACSIUS 5 è incompatibile con poltiglie solfocalciche.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compita.

RISCHI DI NOCIVITA': l'ACSIUS 5 è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Non immettere nel campo trattato pollame e bestiame prima di 5 giorni.

INTERVALLO: osservare un intervallo di 5 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta per le pere, 2 giorni per gli ortaggi, 10 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziali per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

S.C.A.M. srl MODENA
Officina di Produzione: SCAM - MODENA
Reg. Min. Sanità N. 5552 del 23 11 83

DA NON VENDERSI SFUSO.

Peso Netto Kg. 0,100

5553

ELMASIL PD

DISERBANTE TOTALE

per la distruzione delle erbe infestanti in viali, piazze, impianti sportivi ed industriali, strade ferrate ed autostrade

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Elmasil PD contengono:
g 33 di Dalapon puro;
g 37 di Diuron puro;
g 10,5 di MCPA come sale sodico;
bagnanti, sospensivanti ed eccipienti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.
Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi ed epoca d'impiego: 15-20 kg/ha (15-20 g/10 m²) diluiti in 1.000-2.000 lt d'acqua (1 lt di soluzione ogni 10 m² di superficie), intervenendo dopo la nascita delle infestanti, prima che abbiano superato l'altezza di 5-10 cm. Un solo trattamento è in genere sufficiente per l'intera stagione.
N.B. Evitare che il prodotto raggiunga alberi, cespugli e colture utili o la **zona di terreno interessata dalle loro radici.**

Non impiegare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si impiega da solo, dato il suo campo d'azione contro le infestanti.
Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a diretto contatto con colture sensibili (riso, frumento, ortaggi, vite, alberi da frutta e floreali in genere). Pertanto eseguire il trattamento preferibilmente in giornate senza vento. A lavoro ultimato, lavare accuratamente con acqua bollente e soda le pompe ed i recipienti usati per la preparazione della soluzione e, quindi, risciacquarli ripetutamente con acqua. In genere è consigliabile di non usare le pompe ed i recipienti (soprattutto quelli di legno) destinati ai trattamenti alle piante da frutto ed alle viti.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Da non usare su terreni destinati a colture alimentari.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 5553 **del** 23.11.83

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5554

ENOMETIL

INSETTICIDA FOSFORGANICO

COMPOSIZIONE

— Metilparathion puro . . . . g. 16
— Solventi ed emulsionanti (contiene xilolo) . . . . q. b. a g. 100

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEI RISCHI D'INTOSSICAZIONE

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti, 0,2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ENOMETIL è un insetticida fosforganico attivo per contatto, asfissia ed ingestione con accentuato effetto citotropico. Trova impiego per il controllo di numerosi insetti che infestano le colture agricole sia erbacee che arboree.

DOSI E CAMPI DI APPLICAZIONE

gr. 250-300 per ogni 100 litri di acqua intervenendo in occasione di ogni attacco da parte di:

Melo: Carpocapsa, forme mobili di Cocciniglia di S. Josè, Afide verde, A. lanigero, Tentredine, Antonomo, uova svernanti di Afidi in genere, Cecidomia.

Pero: Psilla, Tingide, Tentredine, Cecidomia, Carpocapsa, forme mobili di Cocciniglia di S. Josè, Antonomo, uova svernanti di Afidi in genere, Cocciniglia grigia.

Pesco - Ciliegio - Albicocco - Susino: Tentredine del susino, Tignole del susino e albicocco, Anarsia del pesco, Tignola orientale del pesco, generazioni estive di Diaspis, Afide nero del susino e ciliegio.

Vite: Tignola e Tignoletta della vite, Tortrici, Sigaraio, Cocciniglia cotonosa, Eriofide, Pulvinaria.

Olivo: Tignola, Fleotribo, Cotonello, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Fleotripide, Mosca.

Agrumi: Cocciniglia mezzo grano di pepe, Iceria purchasi, Tripidi, Afidi e Mosca.

Pioppo: Stilpnozia, Crisomela, Cimicetta, Afidi, Punteruolo, Saperda, Tarlovespa.

Orticoltura: Afide nero della **fava**, Cavolaia e Mosca del **cavolo**, **cavolfiore**, **verza**, **crucifere** in genere; Mosca del **carciofo**, Punteruolo del **cavolo**; Tripide, Mosca, Afidi, Criocera e Tignola della **cipolla**, **aglio** e **porro**; Mosca della **carota**, Dorifora della **patata** e **melanzana**; Tignola della **patata**.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: L'ENOMETIL è miscibile con i più comuni insetticidi ed anticrittogamici; si devono escludere i preparati a reazione alcalina, come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. In caso di miscela con olii minerali sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato"

ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione N. del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 5

5556

AGER AKAR KT 42 EC

Acaricida ad azione immediata e di lunga persistenza

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

DICOFOL puro	gr. 42
Coaduivanti ed inerti q.b. a	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del preparato. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici: intossicazone acuta, lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari. fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.

L'AGER AKAR KT 42 EC è efficace nel controllo di vari acari che attaccano le culture sotto indicate. E' efficace contro tutti i ragnetti rossi, gialli, allungati.
Possiede azione citotropica che gli consente di agire anche su acari situati nelle pagine inferiori delle foglie; esso trova impiego in frutticoltura (meli, peri, peschi, albicocchi, susini, ciliegi) in agrumicoltura (aranci, mandarini, mandaranci, limoni) in floricoltura in pieno campo (rose, azalee, garofano, astri, ciclamini, crisantemi) in orticoltura (fragola, pomodoro, lattuga, cetriolo, melone, patata, melanzana, carciofo, cipolla e cavolo).

Dosi di impiego per 100 litri di acqua: all'inizio della stagione per controllare gli acari gr. 50-100 (trattare prima e dopo la fioritura); quando la maggior parte delle uova si sono schiuse e gli acari diventano numerosi. Trattare accuratamente le piante in modo da assicurarsi una completa copertura a tutte le foglie.
Sugli alberi che non portano frutta usare la stessa dose facendo irrorazioni quando gli acari diventano numerosi.
Piante ornamentali in pieno campo: per il controllo degli acari sulle rose, azalee, astri, ciclamini, crisantemi, garofani usare gr. 50-100.
In caso di forti infestazioni si consiglia di ricorrere a due trattamenti distanziati di 4-5 giorni con l'impiego delle dosi massime indicate.

Modalità d'impiego: versare la dose necessaria di prodotto in poca acqua e mescolare bene. Aggiungere poi la miscela ottenuta alla rimanente quantità di acqua continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: L'AGER AKAR KT 42 EC è miscibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi e può essere usato solo o in combinazione con Perthane Parathion, Malathion, Toxafene, Captan, Karatane, Zolfo ed olii. Non deve essere usato con materiali fortemente alcalini come calce e polisolfuro di calcio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di latenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 15 giorni.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle persone alle cose ed agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.

Via Nomentana, 299 - ROMA

Officina di Produzione: Stabilimento ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MASSA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 5

5557

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SILDIFAM

(LIQUIDO EMULSIONABILE)

DISERBANTE SELETTIVO
PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO,
DA ORTO E DA FORAGGIO

Registrazione Ministero Sanità n. 5557 del 15.11.83

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Femmedifam puro	g. 15,9
— Coformulanti *	q.b. a g. 100

* contiene cicloesanone

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini.

Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione.

Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE

Il SILDIFAM è un diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero, da orto e da foraggio e controlla le più comuni infestanti annuali.

Agisce per assorbimento fogliare, specialmente su plantule di dicotiledoni. In presenza di Graminacee si consiglia la miscela con 2,3-3 Kg/ha di un prodotto all'80% di Dalapon.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega quando il maggior numero di infestanti è presente e non ha superato lo stadio di 2 foglie vere, indipendentemente dallo stadio della coltura.

La dose d'impiego è di 6-8 litri/ha.

— Applicare il prodotto diluito in 300-400 litri di acqua, in giornate non ventose, bagnando bene le infestanti;
— non eseguire il trattamento se le piante sono bagnate di rugiada o nella imminenza di una pioggia;
— il prodotto fornisce i migliori risultati se applicato con temperature di 15-20° C ed infestanti in rapida crescita. Temperature superiori ai 25° C possono provocare ustioni alle foglie della bietola;
— si sconsiglia l'uso del prodotto su bietole danneggiate da insetti o comunque in cattivo stato vegetativo.

Preparazione della poltiglia
Versare il prodotto nel serbatoio contenente circa metà della dose di acqua prevista, agitare e poi aggiungere l'acqua restante.

Avvertenze
Lavare adeguatamente le pompe impiegate con acqua e soda o carbonato attivato prima di eseguire il trattamento.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SILDIFAM è compatibile con SILFOS M, SILEND 35 EC, SILEND 35 PB. L'aggiunta di 3-4 litri di Concime Organico Liquido per ettaro migliora l'effetto del prodotto.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO LT. 5

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

Via di Tor Sapienza, 172 - Roma

5558

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SILOXIN T

(POLVERE BAGNABILE)

FUNGICIDA PER LA CONCIA A SECCO O AD UMIDO DELLE SEMENTI DI FRUMENTO, ORZO, MAIS, AVENA, RISO, SORGO

Registrazione Ministero Sanità n. 5558 del 15.11.83

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Thiram puro	g. 30
— Carbossina puro	g. 30
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Durante la manipolazione del prodotto si dovranno usare occhiali protettivi date le proprietà irritanti del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il SILOXIN T è un fungicida ad azione sistemica che, assorbito dal germinello, entra in circolazione distruggendo i germi patogeni compresi naturalmente quelli sulla superficie del seme.

Il SILOXIN T risulta efficace contro il carbone, le varie specie di Carie e contro le Helminthosporium spp. dell'orzo, del mais e di altri cereali.

Il SILOXIN T controlla inoltre i Fusarium ed i Marciumi radicali provocati da Pythium.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il SILOXIN T viene consigliato per la concia secca o umida dei cereali alla dose di 250-300 g. per quintale di seme.

Il prodotto viene mescolato al seme da trattare oppure può anche essere preparata una pasta più o meno densa con l'aggiunta di acqua, da spruzzare uniformemente sul seme, provvedendo ad un continuo movimento dello stesso.

Il SILOXIN T viene particolarmente consigliato per i semi da utilizzare per la moltiplicazione.

Il seme trattato e residuato dalla semina non deve assolutamente essere utilizzato per l'alimentazione dell'uomo, del bestiame, degli animali domestici e della selvaggina.

COMPATIBILITA'

Il SILOXIN T è compatibile con gli insetticidi, i fungicidi ed i nanizzanti normalmente usati per la concia del seme.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il SILOXIN T è tossico per i pesci.

E' nocivo per animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO **KG. 0,200**

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

5559

I CLASSE

Phorate 5 G Silia

(GRANULARE)

GEODISINFESTANTE GRANULARE PROTETTO AD AZIONE SISTEMICA

Registrazione Ministero Sanità n. 5554 del 15 11 83
Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Phorate puro	g. 4,5
— Coformulanti	q.b. a g. 100,0

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto. (Per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione:

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare Pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il PHORATE 5 G SILIA è un granulare sistemico provvisto di azione per contatto, asfissia ed ingestione che, distribuito all'epoca delle semine e dei trapianti, assicura la difesa delle piantine per tutto il primo e più delicato periodo di vegetazione proteggendole sia dai parassiti delle radici e del colletto (Agrotidi, Atomarie, Blaniuli, Elateridi, Grillotalpe, Maggiolini, Mosche e Punteruoli delle radici, Scutigerelle, Tipule e Nematodi dei generi Meloidogyne e Pratylenchus) sia da precoci attacchi di parassiti delle foglie e degli steli (Afidi, Altiche, Casside, Mosche minatrici, Ragno rosso, Tripidi).

Il prodotto, oltre che per geodisinfestazione totale alla dose di 40-60 kg./ha è idoneo per la distribuzione localizzata da effettuare con idonei microgranulatori opportunamente tarati in modo da assicurarne la giusta ed uniforme distribuzione unitamente al necessario incorporamento nel terreno. Per tale distribuzione che, a seconda delle colture e delle attrezzature disponibili, può essere effettuato nei solchi di semina o ai lati delle file, sono consigliabili le seguenti dosi:

10-12 kg./ha su barbabietola da zucchero
12-15 kg./ha su mais, patata, pomodoro, tabacco
20-24 kg./ha su ornamentali ed orticole (carota, cavoli, fagiolo, melanzana, peperone, pisello, sedano, zucchino)
8-10 g./mq. su vivai di ornamentali.

Nei casi in cui l'interramento del prodotto non sia assicurato dalla tecnica di distribuzione provvedervi mediante leggera lavorazione od irrigazione. Su terreni fortemente alcalini o ad alto contenuto di sostanza organica è consigliabile aumentare di circa 1/3 le dosi suggerite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico verso insetti utili, bestiame, animali domestici e pesci. Non trattare durante la fioritura. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente, prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal trattamento.

L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO DEVE ESSERE EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE CON ATTREZZATURA MECCANICA

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

Via di Tor Sapienza, 172 - Roma

CONTENUTO **KG. 10**

5560

Fongarid® 25 WP

Polvere bagnabile
fungicida specifico per colture floreali ed ornamentali in pieno campo o in serra

Composizione
100 g di prodotto contengono:
25 g furalaxyl puro
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)
Officina di produzione: SARIAF, Faenza

Registrazione Ministero della Sanità n. .... **del** ....
® marchio registrato

Caratteristiche
FONGARID 25 WP è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato contro le malattie crittogamiche delle piante ornamentali e da fiore, causate da Ficomiceti quali Pythium spp., Phytophthora spp., Bremia spp., Peronospora spp. e Pseudoperonospora spp.

Indicazioni
FONGARID 25 WP è indicato sulle seguenti colture: Azalea, Begonia, Bulbose da fiore (Tulipano, Crocus, Narciso, Gladiolo, Giacinto), Cactacee e piante grasse in genere, Calla, Ciclamino, Cineraria, Crisantemo, Dieffenbackia, Erica, Felci, Fuchsia, Gerbera, Gloxinia, Geranio, Garofano, Orchidee, Poisettia, Petunia, Rosa, Saintpaulia, Viola.

Modalità d'impiego
Le particolari proprietà del FONGARID 25 WP offrono differenti possibilità d'impiego, per cui per ogni tipo di coltura si potrà scegliere quello più adatto ed efficace. Il prodotto, infatti, può essere mescolato al terricciato, interrato, somministrato a mezzo innaffiamento oppure applicato mediante irrorazione fogliare.

Dosi d'impiego
— Terricciati: 50-100 g di prodotto in 10-15 litri di acqua per metro cubo di terra. Si diluisce il prodotto in acqua e quindi si mescola accuratamente con il terreno.
— Interramento: 6-8 g di prodotto in circa 1 litro di acqua per 10 mq. Distribuire il prodotto uniformemente alla superficie del terreno e quindi incorporarlo con una leggera lavorazione (8-10 cm).
— Somministrazione per innaffiamento: 15-25 g di prodotto in 10 litri di acqua. Questo metodo è particolarmente valido per la coltivazione in vaso. Per un vaso di 12 cm di diametro somministrare circa 80 cc di miscela.
— Irrorazione fogliare: 8-12 g di prodotto in 10 litri di acqua. Bagnare accuratamente la vegetazione da proteggere.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità
Il prodotto è compatibile con altri fungicidi che ne completano l'azione.
« Avvertenza ». In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali e le informazioni per il medico prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: Usare il prodotto solo in campo o in serra su colture floreali non soggette a rotazione con colture agrarie alimentari; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

5561

Caratteristiche del prodotto

Il LENAR 30 agisce sulle più comuni infestanti dei bietolai prevalentemente sui semi in germinazione, ma anche per assorbimento radicale. Risultano tuttavia poco sensibili l'Amaranthus, il Gallium, l'Euphorbia, la Veronica h. e tutte le perenni.

La persistenza dell'azione erbicida è senz'altro lunga ed è condizionata dall'andamento stagionale e dalla natura del terreno.

Il LENAR 30 è un erbicida poco solubile in acqua e pertanto, affinché il prodotto possa esercitare la sua azione, è necessario che cada una pioggia di almeno 10-15 mm entro due settimane dal trattamento, altrimenti bisogna provvedere ad una irrigazione.

Epoche, dosi e modalità d'impiego

Barbabietole - Il LENAR 30 può essere impiegato nel diserbo delle barbabietole in pre-semina e in pre-emergenza alle seguenti dosi:

Pre-semina: Kg 1,8-2,2/ha incorporando il prodotto con un erpice alla profondità di 2-3 cm.

Pre-emergenza: Kg 2,3-2,7/ha da effettuarsi dopo la semina purché la bietola non abbia iniziato l'emergenza.

Per completare il già ampio spettro d'azione del prodotto particolarmente verso le infestanti graminacee e per aumentare i margini di sicurezza per la coltura si consiglia di ridurre i dosaggi del prodotto a Kg 1,4-1,6 per ettaro associandolo (a seconda se si impiega in pre-semina o in pre-emergenza) a 5 lt/ha di Tramat.

Sulla bietola di semina autunnale si ottengono ottimi risultati con la stessa miscela ai seguenti rapporti: LENAR 30 Kg 2,4-2,6/ha + Tramat 5-6 lt/ha. Tali dosaggi sono ben tollerati dalla bietola autunnale, notoriamente più rustica, e consentono di esercitare un eccellente controllo anche di sensibili infestazioni di Avena spp., Phalaris, Bromus che si verificano nelle regioni centro-meridionali ed insulari.

Spinacio - Il LENAR 30 può essere convenientemente impiegato in pre-semina o in pre-emergenza rispettivamente alla dose di Kg 2-2,5/ha.

L'impiego del LENAR 30 è sconsigliabile nei terreni sabbiosi o ricchi di scheletro ed in quelli di natura torbosa; nel primo caso si può verificare qualche sintomo di fitotossicità e nel secondo il controllo erbicida può risultare soltanto parziale anche adottando le dosi più elevate.

Avvertenze per l'impiego

Assicurarsi del buon funzionamento e dell'uniformità di distribuzione dell'attrezzatura. Effettuare l'operazione con la massima scrupolosità ed attenzione onde evitare errori nelle dosi. Usare un volume d'acqua di 5-6 hl per ettaro.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità. E' miscibile con altri prodotti che ne completino l'efficacia.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».

« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO Kg. 5

LENAR 30

Erbicida selettivo per la barbabietola da zucchero e da foraggio e per lo spinacio.

Composizione su 100 g:

Lenacil puro	g. 29,4
Inerti e bagnanti	q.b. a 100

CLASSE IV

SCHERING SpA

Divisione Agricoltura

20131 MILANO - Via Mancinelli, 7/11

Officina di Nova Milanese

Registrazione del Ministero della Sanità N. [illegible] **del** [illegible]

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

5562

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

VITAL R

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 4,20 di Cimoxanil puro.
Gr. 39,75 di rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico).
Sostanze inerti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **VITAL R** è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.

Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. .... **Ministero della Sanità del** ....

2/83

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE:

Contro peronospora: usare gr. 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.

PATATA e POMODORO:

Contro peronospora: usare gr. 300 di prodotto ogni 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con: Benlate; Dacostar; Dithane M 45; Karathane PB e LC; Rovral; Sofril 80; Azifene; Dafene; Fosfene; Folgreen L; Lannate 25 ed L; Lorzene; Metilon; Naftil; Parafene; Spintox; Sumifene; Zitiol; Zolone PB e L; Liquid Plant Food.

Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5563

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

VITAL F

Fungicida

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8.4 di Cimoxanil puro.
Gr. 63.99 di Folpet puro.
Sostanze inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali:
— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:
Azione irritazione sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00128 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via S. Proveglia, 3 - Tel. 53.32.66
STAB.: Paganica (L'Aquila)

Reg. n. 5563 **Ministero della Sanità del** 23 ... 83

3 / 83

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata, e del pomodoro.

Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.

Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150 gr. di prodotto ogni 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.

Peronospora della patata e del pomodoro: usare 150 gr. di prodotto per 100 lt. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida.

Non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.
Rispettare un intervallo di almeno 20 giorni fra un trattamento con il prodotto ed un trattamento con Olii minerali e Polisolfuri.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola, patata, pomodoro, e 40 giorni sulle uve da vino per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5564

SEVITAN

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA
PER COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO O IN SERRA

Composizione: g 100 di prodotto contengono:
— CARBARYL puro (esente da β-naftolo) . . g 5
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi di acqua. Non operare contro vento. **Evitare il contatto con la pelle, gli** occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

Caratteristiche: il **SEVITAN** è un insetticida che si impiega contro: ciclamino, azalee, crisantemo, dalia, garofano, geranio, giacinto, tulipano, gladiolo, iris, pianta di vetro (impatiens), pisello odoroso, rosa, viola del pensiero, asparago ornamentale, edera variegata. **AFIDI:** ciclamino, gladiolo, iris, ortensia, poinsettia, begonia, felci: **TRIPIDI.** Narciso, azalee, geranio, rosa, primula, colens, felci: **ALEURODIDI.** Oleandro, poinsettia, rosa, colens, croton, felci, edera variegata, ficus, filodendro, palma, piante grasse (euforbia, aloe, echinocactus, semprevivum, sanseveria: **COCCINIGLIE.** Crisantemo, ortensia, salvia, splendens: **CIMICI.** Giglio, viola del pensiero, asparago ornamentale: **CRIOCERA.** Garofano: **BEGA VERDE.** Dalia: **FORBICINE.** Giacinto: **BRUCHI.** Gladiolo e iris: **NOTTUE.** Rosa: **TENTREDINI.** Salvia splendens e viola del pensiero: **DORIFORE.** Violacciocca: **ALTICHE.** Violacciocca: **LEPIDOTTERI MINATORI.**
Dosi e modalità d'impiego: il **SEVITAN** s'impiega impolverando in modo uniforme la vegetazione.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: il **SEVITAN** è compatibile con la generalità dei fitofarmaci di più comune impiego ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di nocività: l'impiego del **SEVITAN** è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci ed insetti utili. Non trattare durante la fioritura.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti con esclusione di colture destinate ad alimentazione; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. 5564 del 16.12.83

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Netto g 300**

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

5565

CLASSE I

VELENO

CHIMIBERG

CHIMIQUAT L

DISERBANTE DISSECCANTE LIQUIDO A BASE DI PARAQUAT

COMPOSIZIONE

Paraquat puro (sotto forma di dicloruro)	g. 17,88
Bagnanti e diluenti	q.b. a 100

ATTENZIONE! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

Prodotto nello Stabilimento «DIACHEM S.p.A.» di ALBANO S. ALESSANDRO (Bergamo)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5565 del 23.11.83

BERGAMO

NATURA DEL RISCHIO: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Evitare di respirarne i vapori - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle e gli occhi - Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi - In caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. - **INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Il formulato contiene una sostanza emetica di sintesi.**

ATTENZIONE: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata). L'introduzione nell'organismo **anche di poche gocce** del prodotto può essere fatale: **non attendere la comparsa dei sintomi** per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata la emodialisi. Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito, se non è già comparso (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller.

INTOSSICAZIONE PER INGESTIONE E PER INALAZIONE: I primi sintomi sono: epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività del test di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epatorenali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di paraquat nel sangue.

CARATTERISTICHE: Il CHIMIQUAT L è un formulato a base di Paraquat caratterizzato da una rapida azione caustica per contatto. In virtù di queste proprietà il CHIMIQUAT L distrugge rapidamente tutte le parti verdi delle piante trattate senza agire — e quindi danneggiare — sulle parti legnose delle colture. Il CHIMIQUAT L a contatto con il terreno si inattiva rapidamente e non lascia conseguentemente residui fitotossici che possano danneggiare le successive semine. Il CHIMIQUAT L risulta efficace su vegetazione indipendentemente dal decorso climatico e cioè sia dopo un periodo di prolungata siccità come pure dopo un periodo di pioggia. Pur consigliando di eseguire il trattamento, come di norma, in buone condizioni climatiche, il CHIMIQUAT L risulta attivo anche se al trattamento segue una pioggia. Il CHIMIQUAT L si può impiegare in qualsiasi periodo dell'anno non essendone l'efficacia influenzata in modo determinante dalla temperatura. - **MODALITA' DI IMPIEGO:** Il CHIMIQUAT L è un erbicida ad applicazione fogliare per cui il trattamento deve essere effettuato direttamente sulla vegetazione infestante. Per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'adozione di una buona attrezzatura irroratrice che consenta la distribuzione del prodotto solo sulla vegetazione infestante. Inoltre la quantità di acqua deve essere tale da consentire l'omogenea e completa aspersione delle infestanti. In genere con le usuali attrezzature che vengono all'uopo impiegate, da 500 a 1500 litri per ettaro di superficie. -

DOSI DI IMPIEGO: Per diserbo di vigneti, frutteti, colture arboree in genere, kg./Ha 2-4 - Erba medica: trattare durante il periodo invernale quando la medica è ferma, almeno 6 settimane prima della semina: kg. 2-3 ettaro. Intervenire su medicai di almeno 1 anno. Non trattare se i terreni sono molto leggeri - Sod-seeding (semina senza aratura) kg. 4/5 ettaro - Diserbo canali (sponde) kg. 8/10 ettaro. E' vietato l'impiego diretto sui foraggi. - **NOTA:** Al fine di ottenere i migliori risultati sarà necessario aggiungere al CHIMIQUAT L un bagnante, come ad esempio il Netzmittel, in ragione di kg. 0,7-0,8 per 100 litri di acqua. - DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. -

COMPATIBILITA': E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. Con gli erbicidi, se indispensabile, eseguirla dopo aver consultato un tecnico di fiducia. - **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. - **FITOTOSSICITA':** Trattandosi di un erbicida impiegarlo sulle colture consigliate. Evitare che vengano colpite le colture limitrofe o comunque sensibili. - **RISCHI DI NOCIVITA':** Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. - SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO. - **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

Taniche da kg. 20

5566

Disserbante selettivo per cereali

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare
con prudenza

COMPOSIZIONE

- Ioxynil estere ottanoico puro . . . . g 14,5
- Mecoprop estere butossietanolico puro . . . . . . g 48
- Emulsionanti e solventi . . . . q.b. a g 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

UNION CARBIDE ITALIA S.p.A.
Via Durini 28
20122 Milano

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

SINTOMI D'INTOSSICAZIONE:
Casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, faccia rossa.
Casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea.
Casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI MASSIMA E CONDIZIONATI AL CASO:
Primo soccorso: mettere subito il paziente in stato di assoluto riposo in luogo fresco. Togliere ed isolare gli indumenti contaminati. Lavare pelle e capelli con acqua e sapone nel caso in cui siano stati a contatto con l'erbicida. Se il paziente riesce a bere, somministrargli generosamente acqua o the, ma non latte. Per i pazienti in coma aggiungere glucosio al 5 % .
L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente (togliere gli indumenti, portare l'infortunato in luogo fresco, applicare compresse bagnate di alcool). Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato.
Come sedativi si possono adoperare, a piccole dosi, la cloropromazina (25 mg) e la promazina (50 mg), ma tali farmaci possono provocare un aumento dell'ipertermia.
In caso di ingestione: lavanda gastrica con carbone attivo adsorbente oppure con soluzione al 5% di bicarbonato di sodio. Purgare con solfato di sodio. Durante il trasporto in ospedale il paziente deve rimanere immobile e tranquillo (eventualmente con l'impiego dei sedativi già ricordati).
Si somministreranno liquidi per via parenterale e si praticherà respirazione artificiale. Ossigenoterapia.
In ospedale, in base alla determinazione degli elettroliti e ad altri controlli ematici, si potrà regolare esattamemte il bilancio elettrolitico.

ALCUNE CONTROINDICAZIONI: morfina, atropina, barbiturici, purganti oleosi.

CARATTERISTICHE

Il **CERTROL H** può essere impiegato su ogni varietà di cereali: grano, orzo, segale, alle dosi e nelle condizioni raccomandate. Non trattare in nessun caso cereali già traseminati con leguminose.
Il **CERTROL H** possiede un ampio periodo di intervento ed è efficace contro le seguenti malerbe, di difficile controllo: Bifora, Gallio, Matricaria, Stellaria, Polygonum, Veronica.
Il **CERTROL H** controlla altresi infestanti comuni quali: Fiordalisi, Capsella, Chenopodio, Papavero, Fumaria, Veccia, Ranuncoli.
Il **CERTROL H** distrugge allo stadio di plantula il Crisantemo segetum e la Galeopsis tetrahit.

EPOCA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento può essere eseguito durante la fase di accestimento sino a fine levata. Come caso limite si può già intervenire allo stadio di 4 foglie del cereale.
Trattare di preferenza quando le malerbe sono giovani in fase di attiva crescita, non aspettare che si formino i bottoni fiorali perché sarebbe troppo tardi.
I trattamenti più vantaggiosi sono su infestanti giovani: esse non hanno ancora avuto modo di nuocere al cereale e sono più facili da distruggere.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Con temperatura tra 15-20° C . . . . impiegare 2,5 litri/ha

Con temperatura tra 8-14° C e per trattamenti tardivi dalla fine dell' accestimento sino a fine levata . . . . impiegare 2,5-3 litri/ha

Quantitativo di acqua: Se il trattamento è effettuato in uno stadio precoce e le malerbe non sono ancora riparate dal cereale, distribuire la dose di CERTROL H con 250-400 litri/ha. Se il trattamento è tardivo e le malerbe sono sviluppate e riparate dal cereale, impiegare 400-600 litri/ha.
Non trattare se la temperatura all'ombra è superiore ai 25° C. Effettuato il trattamento lavare abbondantemente l'apparecchiatura. Le parti in legno o in gomma che fossero venute a contatto con la soluzione erbicida non potranno venire in alcun modo bonificate e perciò andranno adibite al solo diserbo.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA' : Il CERTROL H è compatibile con la generalità dei diserbanti.

AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo il carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi, anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE: **da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.**
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Officina di produzione: ANIC AGRICOLTURA S.p.A.
Carrara Avenza (Massa Carrara)

VOLUME LITRI : 10

Registrazione Ministero Sanità N° 5566 del 23.11.83

DA NON VENDERSI SFUSO

CERTROL® è un marchio registrato della Union Carbide Agricultural Products Company Inc., USA.

83530

5568

CARBOFURAN MARGESIN
SOILANE

COMPOSIZIONE PER 100 GRAMMI
gr. 4,5 CARBOFURAN puro
Coformulanti q.b. a 100.
Attenzione: Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 Agosto 1968, N° 1255.

Insetticida carbammato ad azione sistemica da impiegarsi solamente in pre-emergenza per le barbabietole da zucchero e granoturco. Il prodotto è efficace contro Elateridi, Maggiolino, Pentodon, Scutigerella, Blaniuli, Altica, Atomaria, Mosca minatrice (Pegomia), Afidi e Nematodi.

NATURA DEL RISCHIO
Rischio d'intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto
- Non contaminare colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Evitare di respirare i vapori
- Non operare contro vento
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Rendere inutilizzabili dopo l'uso con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrare in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva)
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi d'intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare. Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di Atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi. Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

MODALITA' DIMPIEGO:
1) Trattamento localizzato sul terreno: Barbabietola da zucchero: 10-15 kg/ettaro; Mais: 7-8 kg/ettaro (effettuando la distribuzione mediante l'impiego di microgranulatori)
2) Trattamento generale del terreno: barbabietola da zucchero, granoturco kg 40/ettaro, distribuendo il prodotto a spaglio uniformemente a mezzo di spandiconcime e quindi interrandolo accuratamente. Il CARBOFURAN MARGESIN (SOILANE) non trasmette nessun odore o sapore alle piante che crescono sul terreno trattato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega solo o può essere distribuito in miscela con concimi granulari.

RISCHIO DI NOCIVITA'
Il prodotto è tossico agli animali domestici, al bestiame ed ai pesci, ed agli insetti utili.
Il CARBOFURAN MARGESIN (SOILANE) può essere impiegato solo in preemergenza.
"Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro [illegible] pericoloso".
"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato"
"Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali".

J. & A. MARGESIN SPA - FITOFARMACI - LANA D'ADIGE (BZ)
Officina di produzione: Lana d'Adige (BZ)
Registrazione Ministero della Sanità N° 5568 del 15 11 83
DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO NETTO: KG 5

5569

CLASSE IV

MICROCAPFOL PB 80

Fungicida Organico Micronizzato, Formulato in polvere bagnabile.
Caratterizzato da: largo spettro d'azione, attività bloccante le infezioni, lunga persistenza.

COMPOSIZIONE: 100 g. di prodotto contengono
CAPTAFOL puro 80 gr.
Bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a 100 gr.

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
— Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.
— Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

IL MICROCAPFOL PB 80 va impiegato alle seguenti dosi per ettolitro d'acqua, su:

Olivo: contro l'Occhio di pavone: 250-300 gr/hl, con due interventi uno prima della fioritura, l'altro a fine agosto-primi di settembre; il trattamento di fine estate è efficace anche contro la lebbra.

Pomacee: contro il Cancro del legno: 200 gr/hl, effettuando un trattamento nella fase di orecchiette di topo del melo o dei mazzetti affioranti del pero e due in autunno, uno nel periodo in cui le foglie cadono dalle piante e l'altro a defogliazione completa; contro la ticchiolatura: 75-150 gr/hl, limitandosi ai primi trattamenti fino allo stadio di « orecchiette di topo » del melo e dei « mazzetti affioranti » del pero.

Drupacee: contro Gommosi, Cancro e Bolla di pesco e mandorlo: 250 gr/hl in trattamenti al « bruno »; 150 gr/hl in trattamenti al « verde ». I soliti due tre trattamenti al « bruno » possono essere sostituiti con un'unico trattamento alla caduta delle foglie a dose maggiorata (500 gr/hl). Contro Monilie del pesco, albicocco, susino, mandorlo e ciliegio: 150-200 gr/hl, intervenendo in prefioritura-fioritura e durante la caduta dei petali; contro il Marciume bruno dell'albicocco, del ciliegio e del mandorlo: 200 gr/hl in trattamenti al « bruno », 100-150 gr/hl in trattamenti al « verde »; contro la ruggine del pesco e del susino: 150 gr/hl; Cilindro-sporiosi del ciliegio: 100 gr/hl; Ticchiolatura del nespolo: 150 gr/hl.

Agrumi: contro l'Allupatura e la Melanosi: 150 gr/hl; contro la Gommosi del colletto: Penellature con una sospensione al 10%.

Vite: contro Peronospora e Muffa grigia: 120-150 gr/hl, per le uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Garofano in pieno campo: contro Fusariosi: 100-150 gr/hl, irrorando bene tutta la pianta, particolarmente la zona del colletto e del terreno circostante; contro Alternaria e Ruggine: 150-200 gr/hl; contro Phytophora (nicotinae e parasitica): 10 gr. di formulato per mq di superficie da trattare, diluendolo nella quantità d'acqua sufficiente ad irrorare attorno al colletto delle piante 15-30 giorni dopo il trapianto. Il prodotto può essere fitotossico se irrorato direttamente sul fiore.

Gladioli, Tulipani, Narcisi, Iris e Lilium in pieno campo: contro Fusariosi, Botrite, Phythium: immergere i bulbi per mezzora in una sospensione all'1-1,3% di formulato in acqua. Per il Lilium l'immersione dei bulbi deve essere effettuata immediatamente prima della loro messa a dimora.

Rosa in pieno campo: contro la Peronospora e il Cancro del legno: 100 gr/hl in trattamenti al « bruno ».

Ortaggi (pomodoro, patata, fagiolo, cocomero, melone, cetriolo): contro Alternaria, Antracnosi, Botrite, Peronospora, Ticciolatura, Vaiolatura e Ruggine: 150-200 gr/hl.

Tabacco: contro Alternaria, Antracnosi, Peronospora: 100 gr/hl.

Cereali: contro Ruggine, Septoria e Ticchiolatura: 2 Kg. per ettaro. Nella concia a secco delle sementi (granturco, frumento e riso): 200 gr. per quintale di semente, avendo cura di mescolare accuratamente il prodotto al seme. IL MICROCAPFOL PB 80 può pure essere usato per la concia a secco dei semi di bietola da zucchero e del pomodoro in tal caso la dose sarà di 600 gr. per quintale di seme; inoltre il prodotto alle predette dosi è pure efficace contro le seguenti malattie trasmesse per seme: Carie, Elmintosporiosi e Mal di piede del grano e del granoturco; Brusone del riso; Cercospora e Mal di piede della bietola.

Per la preparazione della miscela: Stemperare l'opportuna dose di prodotto in poca acqua, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea, aggiungere quindi il rimanente quantitativo d'acqua necessario a raggiungere la diluizione richiesta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' IL MICROCAPFOL PB 80 è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o debolmente acida, non deve invece essere miscelato con quelli a reazione alcalina, con prodotti oleosi e/o emulsionabili ed impiegato non prima di 20 giorni dopo il loro uso.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto se irrorato direttamente sul fiore può essere fitotossico per il garofano o produrre scolorimenti per la rosa.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto può essere tossico per i pesci e per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.
Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione: V.le De Gasperi, 4 - 48010 COTIGNOLA (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5569 **del** 15 11 83

Peso netto: Kg. 1

5570

AGER TRICIL 12 P.B.

Acaricida in polvere bagnabile

Composizione: gr. 100 di prodotto contengono:

CIEXATIN puro	gr. 11,7
Bagnanti, sospensivanti ed inerti q.b. a	gr. 100

C L A S S E I I I

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: Nocivo per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione: cefalea occipitale continua o parossistica; ronzii auricolari; iperacisia; vertigini; rachialgia; dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra; ritenzione urinaria; insufficienza respiratoria e di circolo; interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi); dermatosi.

Consigli terapeutici: allontanamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando in relazione alla via di contaminazione, abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale. Terapia sintomatica.

Modalità d'impiego

L'AGER TRICIL 12 P.B. è efficace per la lotta contro le forme mobili di acari che infestano meli e peri, e piante ornamentali in pieno campo. E' efficace anche contro le specie di acari resistenti agli acaricidi tradizionali ed agli insetticidi organo fosforici.
Il prodotto si impiega alla dose di 200 grammi per 100 litri di acqua. Stemperare il prodotto in poca acqua e poi diluire, sotto agitazione, nel totale quantitativo di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con la maggior parte dei fitofarmaci, fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.

Via Nomentana, 299 - ROMA

Officina di Produzione: ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - AVENZA (MASSA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 1

5571

IV CLASSE

SILTIOCARB

(GRANULARE)
ERBICIDA SELETTIVO PER LA LOTTA CONTRO IL GIAVONE DELLE RISAIE

Registrazione Ministero Sanità n. 5571 **del** 16.12.83

® Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Benthiocarb puro	g. 7
— Coformulanti	q.b. a g. 100

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini.
Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione.
Ossigeno-terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni:
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE

Erbicida selettivo ad azione antigerminello, per contatto e per assorbimento radicale su infestanti ai primi stadi vegetativi. Il prodotto non è volatile nè fotolabile e possiede azione residuale.

Infestanti combattute: Giavone (Echinochloa Panicum), Setaria, Digitaria, Cyperus difformis, Eleocharis.

Colture protette: riso seminato o trapiantato.

Dosi d'impiego: Kg. 45-60/ha., impiegare la dose più bassa nei terreni leggeri e viceversa.

Epoche d'impiego: il SILTIOCARB si può impiegare:

1 - prima della semina su terreno asciuto od umido ben affinato e pronto per l'allagamento. Questo può essere effettuato subito dopo il trattamento o qualche giorno appresso;

2 - in post-emergenza del riso a partire da quando questo ha emesso almeno la prima foglia e mezza e fino alla terza foglia del giavone.

MODALITA' DI IMPIEGO

Nel caso di trattamento pre-semina non occorre interrare il prodotto se l'allagamento avviene 1-2 giorni dopo l'applicazione. In ogni caso, distribuire il prodotto uniformemente su tutta la superficie mediante apposita attrezzatura per lo spargimento di granuli.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico al riso con una sola foglia, sopratutto se le pianticelle sono sommerse completamente di acqua stagnante e calda.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con i fungicidi, insetticidi e fertilizzanti comunemente usati in risaia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO **KG. 25**

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

5572

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SILCLOR

(SOLUZIONE EMULSIONABILE)
DISERBANTE PER COLTURE DI CEREALI

Registrazione Ministero Sanità n. 5572 del 16.12.83

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Acido 3,6-dicloropicolinico puro	g. 1,6
— Mecoprop puro	g. 30,5
— Coformulanti	q.b. a g. 100,0

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

N.B. Usate guanti ed occhiali nella preparazione ed impiego della soluzione erbicida.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione striale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: E' sconsigliata la digitale.

CARATTERISTICHE

Il SILCLOR è selettivo per frumento, orzo, segale ed avena. Combatte efficacemente le infestanti dicotiledoni quali: Matricaria, Polygonum, Bifora, Galium, Veronica, Stellaria, Papaver, Cirsium, Chenopodium, Sonchus, Anagallis.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il SILCLOR va impiegato alla dose di 4-5 lt/Ha. Il prodotto va sciolto in 500-600 litri di acqua per ettaro. Il trattamento si esegue dalla fase di accestimento fino alla fase di botticella dei cereali osservando le caratteristiche di impiego del prodotto da miscelare. Operare in assenza di vento.

Al termine delle operazioni lavare accuratamente con acqua e soda tutti i recipienti e gli utensili agricoli adoperati per l'impiego e la diluizione del prodotto. Se possibile impiegare una pompa esclusivamente per il diserbo.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto può essere miscelato con gli erbicidi fenossiacetici per ampliare lo spettro di azione.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per la maggior parte delle colture dicotiledoni.

In particolare il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: vite, alberi da frutta, ortaggi e floreali in genere. Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO KG. 0,500

SILIA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SIAPA S.p.A. - San Vincenzo di Galliera (Bologna)

5573

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabile dopo l'uso con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
Informazione per il medico:
Sintomi d'intossicazione: violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte coagulato), shock, midriasi, ipotermia, obnubilazione del sensorio.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) - Riscaldare il paziente - Cardiotonici -fleboai clorurate e glucosate con noradrenalina - Diuretici -barbiturici -neuroplegici - Anfetamina e derivati in caso di torpore.

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Intervallo da rispettare dall'ultimo trattamento
e la raccolta: 20 giorni.

Officina di produzione propria sede
Via Lion, 9 - Maserà Padova

Registrazione Ministero della Sanità n. 5573 del 15 11. 83

«Da non vendersi sfuso»

PESO PREDETERMINATO
MECCANICAMENTE
AL CONFEZIONAMENTO
Gr. 500 NETTI

LUMAKIDIN 3G

Esca a base di metaldeide per la lotta contro le Lumache e Limace.

CLASSE III'

COMPOSIZIONE:
100 gr. di prodotto contengono: Metaldeide acetica pura gr. 2,9. Supporti, sostanze attrattive e ausiliari q.b. a gr. 100.

Modalità d'impiego:
Il LUMAKIDIN 3G è un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi (limacee-lumache) nocivi alla ortofrutticola a arboricoltura in genere. La sua natura glomerulare lo rende proprio per l'uso nello spargimento.
Il LUMAKIDIN 3G agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto né reso inefficiente dalla pioggia.
Orticoltura: negli orti, nei letti caldi e nelle serre, il LUMAKIDIN 3G va distribuito a mucchietti nella porporzione di circa 10/15 granuli per mq.
Colture in pieno campo: i granuli dell'insetticida vanno sparsi su di una striscia (larga mt. 1,5-2) lungo il perimetro del campo onde formare degli sbarramenti protettivi. Nell'interno del campo è consigliabile collocare il LUMAKIDIN 3G in mucchietti vicini alle piante da proteggere. In tutto occorrono circa 70/100 grammi di prodotto per ogni 100 metri quadri.
«Da non applicare con mezzi aerei»
Compatibilità:
Il LUMAKIDIN 3G è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezione fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività:
Il prodotto è nocivo per i pesci, gli animali domestici ed il bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

industrialchimica
di CASTELLO BRUNO
Stabilimento Via Lion 5 Tel 049 645295
MASERA' (PD)

5574

Natura del rischio:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Norme precauzionali:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabile dopo l'uso con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad es. interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
Informazione per il medico:
Sintomi d'intossicazione: violenti dolori addominali, diarrea, vomito biancastro (aspetto di latte coagulato), shock, midriasi, ipotermia, obnubilazione del sensorio.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio (gr. 5 per litro di acqua) - Riscaldare il paziente - Cardiotonici -flebosi clorurate e glucosate con noradrenalina - Diuretici -barbiturici -neuroplegici - Anfetamina e derivati in caso di torpore.

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Intervallo da rispettare dall'ultimo trattamento
e la raccolta: 20 giorni.

Officina di produzione propria sede
Via Lion, 9 - Maserà Padova

Registrazione Ministero della Sanità n. 5574 del 15 11 83

«Da non vendersi sfuso»

PESO PREDETERMINATO
MECCANICAMENTE
AL CONFEZIONAMENTO
Gr. 500 NETTI

LUMAKIDIN 5G

Esca a base di metaldeide per la lotta contro le Lumache e Limace.

CLASSE III'

COMPOSIZIONE:
100 gr. di prodotto contengono: metaldeide acetica pura gr. 4,9. Supporti, sostanze attrative e ausiliari q.b. a gr. 100.

Modalità d'impiego:
Il LUMAKIDIN 5G è un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi (limacee-lumache) nocivi alla ortofrutticola a arboricoltura in genere. La sua natura glomerulare lo rende proprio per l'uso nello spargimento.
Il LUMAKIDIN 5G agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto né reso inefficiente dalla pioggia.
Orticoltura: negli orti, nei letti caldi e nelle serre, il LUMAKIDIN 5G va distribuito a mucchietti nella porporzione di circa 10/15 granuli per mq.
Colture in pieno campo: i granuli dell'insetticida vanno sparsi su di una striscia (larga mt. 1,5-2) lungo il perimetro del campo onde formare degli sbarramenti protettivi. Nell'interno del campo è consigliabile collocare il LUMAKIDIN 5G in mucchietti vicini alle piante da proteggere. In tutto occorrono circa 70/100 grammi di prodotto per ogni 100 metri quadri.
«Da non applicare con mezzi aerei»
Compatibilità:
Il LUMAKIDIN 5G è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezione fatta per quelli a reazione alcalina.
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività:
Il prodotto è nocivo per i pesci, gli animali domestici ed il bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

industrialchimica
Stabilimento Via Lion 9 Tel 049 645295
MASERA (PD)

5575

PRINTAN 22 L

Diserbante selettivo di post-emergenza specifico per le colture di frumento, orzo e segale (dispersione acquosa)

COMPOSIZIONE: g 100 di prodotto contengono: Mecoprop (sale amminico) puro g 17,8, Clortoluron puro g 18,25, coformulanti quanto basta a 100.
Contiene glicole etilenico.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

— conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— conservare la confezione ben chiusa;
— non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— non operare contro vento;
— evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole - aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.
Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.

20100 Milano - Casella Postale 1847
Officine di produzione CIFA - Caravaggio (Bergamo)

Registrazione n. ... **del** ... **del Ministero della Sanità**

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Cereali: 6-8 kg/ha in 400-600 lt d'acqua. La dose più elevata è da impiegare nei terreni argillosi o ricchi di sostanza organica, soprattutto in presenza di forte infestazione di avena.
Si consiglia di effettuare il trattamento nei primi stadi di sviluppo delle infestanti e comunque all'inizio o durante la fase di accestimento della coltura. Evitare di impiegare il prodotto su vegetazione sofferente per eccesso di acqua o per gelo.
Al momento del trattamento la temperatura non deve essere inferiore ai 10/15 °C o superiore ai 25 °C.
Per la preparazione della poltiglia, agitare anzitutto il contenitore del prodotto e versare il quantitativo previsto nel volume d'acqua finale, agitando.

CARATTERISTICHE

Printan 22 L è un diserbante selettivo di post-emergenza, specifico per il diserbo di frumento, orzo e segale. Esplica la sua azione sia per via radicale che per via fogliare. E' attivo contro la maggior parte delle infestanti annuali sia graminacee che a foglia larga.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

Printan 22 L non è miscibile con altri antiparassitari.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare sulle varietà di frumento Demar 4 e Kid. Si raccomanda di non impiegare il prodotto nelle vicinanze di vigneti, anche se posti ad una certa distanza, ma ubicati sotto vento e soggetti alle correnti d'aria dominanti nella zona. Non trattare nelle vicinanze di altre colture sensibili agli erbicidi ormonici quali colture ortive, floreali, ornamentali e leguminose, barbabietola, colza, lino, tabacco, alberi fruttiferi ecc.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.683

kg 1

5576

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO KG. 20

Registrazione del Ministero della Sanità
n. 5570 del 28 · 12 · 83

KOLLANT
INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
sede: PADOVA, via Euganea, 52
Officina di produzione propria
VIGONOVO (VE)
via C. Colombo, 7-7/A
Tel. (049) 502.855 - 655.300
Telex 430813 KIC

EMULSIONE A BASE DI OLIO MINERALE

COMPOSIZIONE:
100 gr. di prodotto contengono:

— olio minerale (U.R. 95%)	gr. 80
— coformulanti q. b. a	gr. 100

CLASSE III°

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

KOLLANT

KOLLANT Industrie Chimiche S.p.A.

MODALITA' D'IMPIEGO:
KOLFLOR OLIO B. combatte efficacemente le cocciniglie delle piante ornamentali e arbustive, svolge inoltre una certa azione contro le uova degli acari. Il trattamento va eseguito a fine inverno (rigonfiamento delle gemme) e in primavera - estate.

Dosi e modi d'impiego:
Per la difesa delle piante ornamentali e arbustive: kg. 1 - 2 per 100 litri di acqua. (gr. 100 - 200 per 10 litri di acqua) con pompe a volume normale.
Si consiglia di effettuare trattamenti nelle ore più fresche della giornata nel periodo estivo.
Sciogliere il prodotto in poca acqua e versare poi la soluzione ottenuta nella rimanente acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA:
KOLFLOR OLIO B. può essere miscelato con i più comuni insetticidi e acaricidi ad esclusione di:
Polisolfuri, Captan, zolfi e altri antioidici. Qualora siano stati eseguiti trattamenti con questi ultimi prodotti, attendere 15 giorni prima di applicare KOLFLOR OLIO B.

AVVERTENZA:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
INTERVALLO DI SICUREZZA DALLA RACCOLTA: 20 giorni.

ATTENZIONE:
Da impiegare nelle colture floricole e nelle arbustive in campo o in serra. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

5577

FENADOR(R) MIX

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa del melo, della vite, del frumento e dell'orzo.

Si impiega in trattamenti liquidi contro la Ticchiolatura e l'Oidio del melo e la Peronospora e l'Oidio della vite e le malattie della parte aerea dei cereali.

COMPOSIZIONE

– Fenarimol puro	g	1,6
– Tiofanato metile puro	g	14
Mancozeb puro	g	60
– Coadiuvanti, Inerti: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

CLASSE III

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 5577 del 15.11.83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose : lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega contro le crittogame e alle dosi di seguito indicate per 100 litri di acqua. Irrorati con pompe a volume normale ripetendo i trattamenti ad opportuni intervalli.

MELO: contro Ticchiolatura e Oidio : **g 200-250**

VITE: contro Peronospora e Oidio : **g 200-300**

FRUMENTO e ORZO: contro malattie dell'apparato aereo del frumento (trattamenti in levata o spigatura) e dell'orzo (trattamenti in botticella) distribuire una dose di **2-2,5 Kg/ha** in sufficiente quantità di miscela acquosa.

Preparazione della poltiglia: stemperare accuratamente in poca acqua la prestabilita dose di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Da non impiegare in serra

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità: il prodotto non è compatibile in miscela con sostanze alcaline, come Polisolfuri, Poltiglia bordolese, Calce. E' miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo . Devono essere inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per le api.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5578

BAYCOR TIRAM

FUNGICIDA ORGANICO

per trattamenti liquidi su pomacee, drupacee ed alcuni ortaggi

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Baycor Tiram contengono:
g 6 di bitertanolo puro;
g 40 di Tiram puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati: alcool, olii, grassi.

Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pomacee (melo e pero): contro ticchiolatura con azione collaterale contro mal bianco del melo: 0,15-0,3% (150-300 g in 100 lt d'acqua) eseguendo gli interventi ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-noce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni in dipendenza dell'andamento climatico. Il prodotto è particolarmente indicato per frutteti misti.

Drupacee (pesco, susino, albicocco e mandorlo): contro monilia: 0,15-0,3% (150-300 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti, prima, durante e dopo la fioritura, ripetendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni impiegando la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia. Contro oidio con buona azione collaterale contro bolla, corineo, fusicoccum e cytospora: 0,15-0,25% (150-250 g in 100 lt d'acqua) effettuando trattamenti preventivi con inizio alla fase della scamiciatura dei frutti alla cadenza di 7-10 giorni circa; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose allo 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua).

Ortaggi (fagiolo, zucchino, cetriolo): contro antracnosi, mal bianco, ruggine e peronospora: 0,25% (250 g in 100 lt d'acqua) effettuando 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni, effettuando il primo all'inizio dell'attacco.

N.B. - Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale. Diluire il prodotto in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il Baycor Tiram è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra, ad eccezione di Morestan e prodotti a base di rame ed oli minerali. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per ortaggi e 21 giorni prima del raccolto per pomacee e drupacee.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 5578 **del** 15 11.83

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare all'asciutto

g 500

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5579

Graminon® 50 WP

Diserbante selettivo dei cereali (frumento tenero e orzo)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Isoproturon puro g 50
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione:
manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano s/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità .... **del** ....
® marchio depositato

Caratteristiche
Agisce sulle infestanti per contatto fogliare e per assorbimento radicale.
È particolarmente efficace contro le più importanti infestanti graminacee, quali Avena selvatica, Alopecurus, Lolium, Poe, Apera e contro alcune infestanti dicotiledoni quali Matricaria e Stellaria.
È moderatamente efficace contro Phalaris spp. Numerose infestanti dicotiledoni, invece, quali Papavero, Vicia, Sinapis, Raphanus, Veronica, Fumaria, Poligoni sono scarsamente sensibili.

Indicazioni
È indicato nelle applicazioni di post-emergenza per il diserbo chimico selettivo del frumento tenero e dell'orzo.

Dosi e modalità d'impiego
kg 2,5 - 3 per ettaro, nella generalità dei casi
kg 4 per ettaro, in caso di notevoli infestazioni di Avena.
Il prodotto va diluito in un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una uniforme distribuzione (normalmente 400 litri o più per ettaro).
Il trattamento si effettua in post-emergenza ossia nel periodo compreso tra la 3ª-4ª foglia e l'accestimento della coltura.
I trattamenti precoci, ossia quando le infestanti sono nei primi stadi di sviluppo, sono più efficaci.
In presenza di infestanti scarsamente sensibili, cioè la maggior parte delle dicotiledoni, è consigliabile la miscela con derivati ormonici (es. STAROX alla dose di 2,5-3 kg per ettaro).
Evitare superdosaggi ed accumuli della miscela erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con altri derivati ureici (es. Dicuran) e con derivati ormonici.
« AVERTENZA »: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
I grani duri sono normalmente sensibili e pertanto se ne sconsiglia l'impiego.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

5580

Graminon® MCPP

Diserbante selettivo dei cereali (frumento tenero e orzo)

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Isoproturon puro g 29
MCPP a.e. puro g 20
q.b. a 100 g coformulanti

CLASSE III
Attenzione: manipolare con prudenza

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali
Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico
Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione
Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso
Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni
È sconsigliata la digitale.

CIBA-GEIGY S.p.A., Origgio (VA)

Officina di produzione: SIPCAM, Salerano s/Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. .... **del** ....

® marchio depositato

Caratteristiche
Deriva dall'associazione di un derivato ureico con un ormonico e agisce pertanto sia per assorbimento radicale (in specie contro le infestanti graminacee), sia per assorbimento fogliare.
È particolarmente indicato per controllare le infestazioni miste (graminacee e dicotiledoni), quali Alopecurus, Apera, Lolium, Poa, Capsella, Centaurea, Cerastium, Chenopodium, Galeopsis, Lamium, Matricaria, Papaver, Polygonum, Raphanus, Sinapis, Vicia, Veronica, Stellaria, Ranuncoli, comprese specie perennanti come: Convolvolo, Romice, Stoppione, Artemisia.
L'avena selvatica è sensibile solo se colpita nelle prime fasi di sviluppo (non oltre le due foglie).

Dosi e modalità d'impiego
Kg 4,5-6 per ettaro, riservando le dosi maggiori nei casi di più forti infestazioni di graminacee o nei terreni pesanti. Il prodotto va diluito in un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare un'uniforme distribuzione (normalmente 400 litri o più per ettaro).
Il trattamento si effettua durante il periodo di accestimento della coltura.
Evitare superdosaggi ed accumuli della miscela erbicida.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità
Non è prevista la miscela con altri prodotti antiparassitari.

Fitotossicità
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, gli alberi da frutto, gli ortaggi.
Evitare pertanto che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO **Kg**

5582

ORTHENE (R) L

Insetticida-aficida in pasta liquida emulsionabile in acqua per il controllo di alcuni insetti dei fruttiferi, della vite, di ortaggi, fiori in pieno campo, fragola, colture forestali.

Si impiega contro Afidi, Tripidi, Tortrici, Tignole, Lepidotteri vari e Mosche minatrici.

Caratteristiche : il prodotto è un insetticida organico che agisce per contatto e per azione sistemica locale. Il prodotto è molto rapido nell'azione contro gli Afidi, ma può, verso alcuni insetti (es. Larve ricamatrici protette dalle foglie), mostrare tutta la sua efficacia dopo qualche giorno dall'applicazione.

COMPOSIZIONE

- Acefate puro ....g 25
- Coadiuvanti e solventi: quanto basta a ....g 100
  - contiene Cloruro di metilene

(R) Marchio registrato Chevron Chem. Co. - USA

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici
e per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. 5582 del 15.11.83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione:

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.

Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' DI IMPIEGO

Colture ammesse all'impiego:

Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Mandarancio); **Pomacee** (Melo e Pero); **Drupacee** (Pesco, Ciliegio, Albicocco, Susino, Mandorlo); **Vite; Olivo; Ortaggi** (escluso asparago e ortaggi a bulbo); **Patata; Mais; Barbabietola da zucchero; Tabacco; Colture floreali in pieno campo; Colture ornamentali; Colture forestali, fragola.**

DOSI DI IMPIEGO

— **per 100 litri di acqua** irrorati con pompe a volume normale:

- 120-200 g contro Afidi in genere (escluso Afide rosa del melo e del pero), Orgya antiqua, Tignole, Cicaline, Cavolaia, Tripidi, Aleurodidi, Mosca e Tignola dell'olivo.
- 200-250 g : contro Carpocapsa delle pomacee, Ricamatrici della frutta (Capua, Cacoecia, Eulia, Pandemis), Anarsia, Nottue, Tortrici della fragola, Nottuidi delle colture orticole, Mosche minatrici, Baga Verde del garofano (Cacoecimorpha pronubana).
- 150-250 g : contro Cocciniglie degli Agrumi e dell'Olivo.

— **per ettaro** :

- 1,2-2 Kg : Afide verde del Tabacco, Afide verde della Patata, Afide verde e Mosca della Barbabietola da zucchero.
- 2-2,5 Kg : Mamestra della Barbabietola da zucchero
- 2,5-3 Kg : Piralide del Mais

  Il prodotto non è attivo contro l'Afide Nero delle leguminose e delle bietole.

Preparazione della poltiglia : diluire il prodotto direttamente nel totale quantitativo di acqua agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità : Il prodotto è miscibile con le comuni poltiglie antiparassitarie di impiego primaverile-estivo, escluse quelle alcaline come Poltiglia Bordolese e Polisolfuri.

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: su colture fruttifere evitare di effettuare trattamenti con intervallo inferiore ai 15 giorni; su pesco interrompere gli interventi nei mesi estivi ed eseguire preventivamente saggi varietali su piccola scala nel periodo antecedente all'indurimento del nocciolo, per accertare eventuali sensibilità non dipendenti dall'andamento stagionale.

Rischi di nocività: non impiegare in fioritura perchè tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta sulle colture indicate, ad eccezione delle pomacee ed olivo per le quali va rispettato un intervallo di 30 giorni.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

SIPCAM

5583

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

COPERAL F

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8,4 di Cimoxanil puro.
Gr. 63,99 di Folpet puro.
Sostanze inerti e colorante q.b. a 100.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia:
Lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il **COPERAL F** è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.

Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micello nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.

Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

ANTIPARASSITARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. [illegible] **Ministero della Sanità del** [illegible]

2/83

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150 gr. di prodotto ogni 100 lt. di acqua
Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.
Peronospora della patata e del pomodoro: usare 150 gr. di prodotto per 100 lt. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco

Avvertenza:
I trattamenti devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e polisolfuri
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola, patata, pomodoro, e 40 giorni sulle uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5584

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

COPERAL RB

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 4,20 di Cimoxanil puro.
Gr. 39,75 di rame metallico (sotto forma di ossicloruro tetraramico).
Sostanze inerti q.b. a 100.

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il **COPERAL RB** è un fungicida in polvere bagnabile, efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Per evitare interferenze nella fecondazione o rallentamenti dello sviluppo vegetativo, si consiglia di non applicare il prodotto in concomitanza con la fioritura.

ANTIPARASSITARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento Ravit Paganica (Aq)

Reg. n. [illegible] **Ministero della Sanità del**

2 '83

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE:
Contro peronospora: usare gr. 300 di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Iniziare i trattamenti quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino al persistere delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Non trattare durante il periodo della fioritura.

PATATA e POMODORO:
Contro peronospora: usare gr. 300 di prodotto ogni 100 litri di acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con: Benlate; Dithane M 45; Karathane WD e LC; Iprodial; Sulfosol; Gutene; Dimetoil; Drinfos; Lannate 25 e L; Delfos; Tortrin; Fitofos; Ovotek; Sumifos; Emmaton; Zolone PB e L; Azofol L.

Si sconsiglia di usare il prodotto in associazione ad antiparassitari a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5585

TIOWETTING 60

Fungicida polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

Zolfo puro (esente da selenio)	gr. 59,70
Sospensivanti, adesivanti	q.b. a gr. 100

CLASSE TOSSICOLOGICA IV

NORME PRECAUZIONALI:
— conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)

Il TIOWETTING 60 è uno zolfo in polvere bagnabile che può essere impiegato a dosi elevate senza creare problemi di fitotossicità, alle alte temperature.

Pomacee: melo, pero, contro l'oidio e azione complementare contro la ticchiolatura gr. 300-400.

Drupacee: pesco, albicocco, susino, mandorlo, contro l'oidio gr. 200-400.

Vite: uve da tavola e da vino contro l'oidio gr. 300-400 nei primi trattamenti, gr. 200 con l'aumentare della temperatura.

Ortaggi a frutto: cucurbitacee, melone, zucchino, cetriolo, contro l'Oidio gr. 200-300, solanacee, pomodoro gr. 200, legumi, pisello gr. 200.

Cereali: frumento, orzo, avena, segale contro l'Oidio Kg. 6-8 ad Ha.

Floricoltura: in pieno campo contro l'Oidio della rosa, ortensia, crisantemo gr. 200-300.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: non è compatibile con polisolfuri, poltiglia bordolese, con oli minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacryl, Diclofluanide. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate, le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

Pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Oliver de Serres, William, Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese.

Cucurbitacee: può essere fitotossico.

INTERVALLO: sospendere i trattamenti 5 gg. prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

S.C.A.M. srl MODENA
Officina di Produzione: SCAM - MODENA
Reg. Ministero Sanità n. 5585 del 15-11-83

DA NON VENDERSI SFUSO.

Peso Netto Kg. 0,100

SCAM MODENA
CONCIMI BIOCHIMICI
CONCIMI FOGLIARI
ANTIPARASSITARI
Stabilimento e uffici S. MARIA DI MUGNANO - Tel. 30.91.31

5586

FOLPET RAMATO BAYER

FUNGICIDA CUPRO ORGANICO

per irrorazioni su vite, ortaggi, piante ornamentali e da fiore in pieno campo

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Folpet ramato Bayer contengono:
g 15 di Folpet puro
g 30 di rame metallo (sotto forma di ossicloruro)
sospensivanti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro di acqua) e digitale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Vite: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) contro la peronospora.
Avvertenza: sospendere i trattamenti su uve da vino almeno 40 giorni prima della vendemmia per non ostacolare la fermentazione dei mosti.
Ortaggi: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) - **pomodoro:** contro peronospora, alternariosi e ticchiolatura; **cocomero, melone, zucchine e cetriolo:** contro peronospora ed antracnosi; **sedano:** contro spetoriosi; **patata:** contro peronospora ed alternariosi; **cipolla:** contro peronospora; **fagiolo e pisello:** contro antracnosi; **insalata** (lattuga): contro peronospora; **fragola:** contro vaiolatura.
Piante ornamentali e da fiore: 0,3% (300 g in 100 lt d'acqua) contro ticchiolatura e septoriosi del crisantemo in pieno campo.
N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il Folpet ramato Bayer è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra. Non è miscibile con poltiglia bordolese e con oli minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: si possono verificare fenomeni di fitotossicità se il trattamento viene eseguito a meno di 3 settimane da uno precedente con oli minerali, o polisolfuri. Non si deve trattare durante la fioritura.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto e 40 giorni prima della vendemmia delle uve da vinificare.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 5586 **del** 15.11.83

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5588

BORDAGRO

POLTIGLIA BORDOLESE ESSICCATA

COMPOSIZIONE

Rame Metallo (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrossido) g. 25
Coadiuvanti e solventi q.b. a 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

La diluizione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze. Basta versare la polvere nel totale quantitativo di acqua ed agitare. La BORDAGRO viene distribuita mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume le dosi prescritte saranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.

USO E DOSI DI IMPIEGO

La BORDAGRO consiste in una preparazione industriale di Poltiglia Bordolese essiccata assolutamente neutra. Viene impiegata alle seguenti dosi in 100 litri di acqua:

— **Vite:** contro Peronospera kg. 0,7-1,2 (in trattamenti primaverili-estivi quando gli acini sono ben formati).
— **Melo:** contro Marciume bruno o Muffa a circoli, Ticchiolatura, kg. 1 (nella fase gemma rigonfia).
— **Pero:** contro Ticchiolatura kg. 1 (nella fase gemma rigonfia).
— **Pesco:** contro Bolla e Corineo kg. 3 (in trattamenti invernali sul secco).
— **Ciliegio:** contro Marciume bruno e muffa a circoli, Nebbia o seccume fogliare, Vaiolo o gommosi kg. 2 (nella fase gemma d'inverno).
— **Olivo:** contro Occhio di Pavone kg. 1,5-2 (nella ripresa vegetativa e verso l'invaiatura).
— **Agrumi:** contro Gommosi o Marciume del colletto: kg. 2-3 (da gennaio a fine maggio) e all'invaiatura (novembre-dicembre) con trattamenti al colletto, tronchi e grosse branche. Cancro gommoso: kg. 2-3 (da gennaio a fine marzo e all'invaiatura con trattamenti al tronco e grosse branche).
— **Barbabietola:** contro Peronospora, Cercospora, Vaiolatura: kg. 2 (nel periodo di pieno accrescimento e verso la raccolta).
— **Pomodoro:** contro Alternariosi, Peronospora kg. 1,5-2 (all'accestimento e alla fioritura); contro Mal del Piede, moria delle piantine: kg. 0,5 (al trapianto).
— **Fragola:** contro Vaiolatura rossa (vegetazione autunnale) kg. 1.
— **Fagiolo:** contro antracnosi kg. 1.
— **Sedano, Carota, Prezzemolo:** contro Septoriosi kg. 1 (in funzione del periodo di sviluppo delle malattie crittogamiche).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

BORDAGRO è compatibile con i più comuni fungicidi ed insetticidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco e varietà di melo quali Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicius, Gravenstein Jonathan, Home Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winecap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, e di pero quali Abate Fetel, Buona Luisa d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, R.C. William, dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.
— Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
— Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
— Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Registrazione Ministero della Sanità n. 5588 del 15.11.83

S.p.A. - BOLOGNA

Prodotto nello stabilimento « DIACHEM S.p.A. » di Albano S. Alessandro (BG)

DA NON VENDERSI SFUSO

Sacchi da kg. 25

5589

BAYLETON TOTAL PR BLU

FUNGICIDA SISTEMICO SPECIFICO

per la lotta contro peronospora e oidio della vite

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Bayleton Total PR Blu contengono:
g 1,5 di Triadimefon puro;
g 10 di Metalaxil puro;
g 40 di Propineb puro;
coformulanti quanto basta a 100.

Caratteristiche: il Bayleton Total PR Blu è un fungicida specifico per la lotta combinata contro le due principali malattie della vite: peronospora ed oidio.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari

— *Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.*
— *Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dalla umidità e dal calore.*
— *In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.*
— *Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicati: alcool, olii, grassi e latte. Nei casi gravi, ricovero urgente in centro di rianimazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Per la distribuzione del prodotto impiegare un quantitativo di acqua sufficiente ad assicurare una buona copertura della vegetazione (normalmente 10 hl d'acqua/ha).
0,2-0,25% (200-250 g/100 lt d'acqua) fino ad allegagione avvenuta eseguendo i trattamenti ad intervallo di 14-15 giorni.
0,25-0,3% (250-300 g/100 lt d'acqua) dopo l'allegagione ampliando l'intervallo fra i singoli trattamenti a 16-18 giorni.
Mantenere la cadenza più stretta (14-15 giorni) qualora perdurassero delle condizioni ambientali particolarmente favorevoli allo sviluppo delle malattie sopraindicate.

Divieti d'impiego

— Divieto d'impiego in serra.
— Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con gli insetticidi e gli anticrittogamici a reazione neutra di più comune impiego. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 5589 **del** 15-11-83

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 25

BAYER

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5590

TERREX®

Liquido fumigante per la disinfestazione fungicida, nematocida ed erbicida del terreno e per reimpianti di vite, pesco ed agrumi.

Si impiega su terreno nudo destinato a colture di ortaggi, fiori, piante ornamentali, vivai, fruttiferi.

COMPOSIZIONE

- **Metilisotiocianato puro** ....g 18,8
- DD puro ....g 80,0

(R) Marchio registrato SIPCAM - Milano

CLASSE II

NOCIVO

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (Milano)

Registrazione n. 5540 del 15.11.83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua; evitare di respirarne i vapori; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone; rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (p.es. interrando in fosse profonde più di un metro cospargendo con calce viva); in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Attenzione: il prodotto è infiammabile. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato, lontano da fiamme o scintille; non fumare; non gettare i residui nelle fognature.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle. Veleno neurotropo: provoca lesioni encefaliche di tipo paralitico - Tempo di latenza: anche parecchie ore.

Sintomi neurologici: cefalea, vertigini, sonnolenza, stato di ebbrezza con disturbi della deambulazione, disturbi della parola, iperacusia dolorosa, ambliopia.
I disturbi neurologici sono tardivi e costituiscono prognosi grave.

Sintomi a carico dell'apparato digerente e del fegato: dolori addominali, vomito, diarrea, epatomegalia, ittero da epatite tossica.

Sintomi a carico dell'apparato respiratorio: dispnea, tosse, congestione ed edema polmonare.

Sintomi a carico degli occhi e della pelle: congiuntivite irritativa, irritazione cutanea, eritemi ed edemi localizzati.
Sono possibili lesioni renali tossiche e conseguente coma uremico.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Rimuovere immediatamente i vestiti contaminati e lavare pelle e capelli con acqua e sapone.
Può essere utile l'applicazione cutanea di creme a base di cortisonici. Lavare gli occhi con bicarbonato di sodio al 5% e trattamento con idrocortisone.
In caso di ingestione, e se non è presente vomito, praticare lavanda gastrica (dopo intubazione se il paziente è in stato di incoscienza) seguita da instillazione di 3-4 cucchiai di carbone medicinale attivato e 30 g di solfato di sodio o di magnesio.
Terapia sintomatica.
In caso di inalazione: terapia sintomatica: aminofillina (250 mg) contro spasmi bronchiali, somministrata per via rettale o endovena, cortisonici, ossigeno se necessario; se è presente edema polmonare somministrare diuretici (tiazide).
Nei casi gravi o sospetti gravi è indispensabile il ricovero in Centro di rianimazione.

Controindicazioni: Non somministrare sedativi a base di bromo, oppiacei, adrenalina per via parenterale, alcool, sostanze lipidiche come latte e olio.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è valido per la disinfestazione di semenzai, cassoni, letti caldi, terricciati e terreni da diversi parassiti fungini, quali Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phoma, Fusarium, Verticillium, Alternaria, causa di marciumi del fittone ed altri patogeni che provocano cancri, necrosi delle radici e malattie vascolari.
Il prodotto agisce efficacemente anche contro Anguillule o Nematodi, liberi o galligeni e formanti cisti parassiti delle diverse colture.
All'azione fungicida e namtaocida il prodotto associa la proprietà di devitalizzare i semi delle infestanti agendo in tal modo da erbicida oltre che essere attivo contro tutti i fitofagi che si annidano nel terreno.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega nei confronti dei funghi parassiti, nematodi, fitofagi ed erbe infestanti:

- nella disinfezione diretta dei terreni alla dose di **50-70 cc/mq**
- nella disinfezione di terricciati per trapianti in vaso alla dose di cc **250-300/mc.**

Il prodotto deve essere distribuito tal quale senza previa diluizione su terreno nudo e ben affinato per mezzo di appositi iniettori o per spargimento entro solchi, mantenendo una distanza minima fra le iniezioni e fra i solchi, di circa 20 cm.

Da non applicare con mezzi aerei.

Da non applicare in serra ed in ambienti chiusi

Compatibilità il prodotto si usa da solo

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per insetti utili, animali domestici e bestiame.

Intervallo di agibilità dell'appezzamento trattato : 48 ore.
Avvertenza: chi utilizza il prodotto deve provvedere, in modo idoneo, a vietare l'accesso negli appezzamenti trattati alle persone non adeguatamente protette per tutto l'intervallo di agibilità (48 ore).

Intervallo tra il trattamento e la semina o il trapianto : 40 giorni

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5591

2-4 DISERBIN PASTA

Diserbante ormonico selettivo in pasta

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
Acido 2,4-D puro . . . . g 35,63
(sotto forma di Estere Isopropilico)
Contiene Glicole Etilenico
Acqua e coformulanti . . . . q. b. a g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: *astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto; senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi. Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.*

CAFFARO S.P.A. - MILANO

Stabilimento di ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione Ministero della Sanità n. 1 del

CARATTERISTICHE
Il 2-4 DISERBIN PASTA è un diserbante ormonico selettivo a base di esteri pesanti del 2-4 D, efficace contro le malerbe a foglia larga, annuali e perenni che infestano frumento duro e tenero, orzo e segale.
La formulazione in pasta fluida (esente quindi da xilolo o altri solventi organici) consente una maggior adesività del prodotto, aumentandone quindi l'efficacia. Il 2,4 DISERBIN PASTA agisce infatti per assorbimento fogliare, raggiungendo e distruggendo anche le radici e gli organi sotterranei delle infestanti colpite.
L'assorbimento da parte delle infestanti è immediato, per cui eventuali piogge che intercorrono qualche ora dopo il trattamento non ne pregiudicano l'effetto.

DOSI E MODALITA D'IMPIEGO
Per la preparazione dell'emulsione si versa il prodotto in un recipiente contenente acqua, indi si mescola e si aggiunge altro liquido fino al volume desiderato.
Le dosi di impiego variano (in relazione alla temperatura ambientale e alla specie e diffusione delle malerbe) da un minimo di kg 0,450 ad un massimo di kg 1,300 per ettaro, da distribuire in 400-600 litri d'acqua a seconda del tipo di pompa impiegata.
L'epoca più indicata per eseguire il trattamento sul grano è quella che intercorre tra la fine dell'accestimento (emissione della quarta, quinta fogliolina sul culmo principale) e l'inizio della fase di botticella (rigonfiamento della spiga nella guaina fogliare).

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA
il 2-4 DISERBIN PASTA è miscibile con gli altri prodotti per l'impiego agricolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo; devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA
il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Inoltre può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi ecc. Evitare pertanto che giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

NOCIVITA
il preparato è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nella epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO
PESO NETTO Kg 10

5592

Attenzione manipolare con prudenza **classe terza**

Ostacola la cascola pre-raccolta

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

NAA puro	gr. 8
Diluenti ed Emulsionanti q.b. a	100

NATURA DEL RISCHIO: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Registrazione N° 5592 del Ministero della Sanità del 28.12.83

Il RUBRUM, preparato a base di fitoregolatori, è caratterizzato da pronta efficacia, lunga durata dell'azione anticascola (due settimane) estesa ad un vasto numero di varietà di pero e melo.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Melo e Pero: gr. 50 per 100 litri di acqua.
Eseguire il trattamento al momento della cascola dei primi frutti.
Sulle varietà molto soggette alla cascola è opportuno ripetere il trattamento dopo 15 giorni.
È consigliabile bagnare foglie e frutti come per un normale trattamento antiparassitario, ed aggiungere il bagnante TECNIL IRREVERSIBILE.
Si consiglia di eseguire il trattamento solo su piante sane nelle ore del tardo pomeriggio.

« Da non applicare con mezzi aerei ».

COMPATIBILITÀ: È compatibile con i normali esteri fosforici.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.

« **Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».

ANTIPARASSITARI FERTILIZZANTI IDROSOLUBILI

TECNITERRA s.r.l.
Uffici: MILANO - Via N. Bixio, 34

Sede Leg. e Stab.: SEGRATE

Peso Kg. 0,250
DA NON VENDERSI SFUSO

5594

GIBRELEX POLVERE

Fitoregolatore

COMPOSIZIONE:

Acido Gibberellico puro . . . . gr 1
Coformulanti q.b. a . . . . gr 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il GIBRELEX POLVERE esplica la sua attività stimolando e accelerando il metabolismo e la riproduzione cellulare nei tessuti vegetali ed i suoi effetti si manifestano su tutti gli organi della pianta, in relazione allo stato di sviluppo della stessa, dalla germinazione dei semi alla maturazione dei frutti, ed in maniera diversa per ciascuna specie.

MODALITA' D'IMPIEGO

PERO
gr 100-150/hl usando 1.000 litri d'acqua/ettaro. Per stimolare l'allegagione delle varietà di difficile impollinazione. Si consiglia d'intervenire con il 20-30% dei fiori aperti e con l'aggiunta di gr 100/hl di Bagnante adesivo.
gr 100/hl usando 1.000 litri d'acqua/ettaro, per favorire l'allegagione di: William, Coscia, Buona Luisa d'Avranches, Spadona, Spadoncina, Passacrassana, Butirra Giffard, Gentilona, Kaiser, Madernassa e Trionfo di Vienna. Intervenire nel pieno della fioritura rispettando il dosaggio per non favorire la produzione di frutti deformati o la riduzione nella produzione dell'anno successivo.
gr 150-250/hl usando 1.500 litri d'acqua/ettaro, per limitare i danni da gelo in fioritura. Intervenire entro le 48 ore dall'inizio della gelata. Aggiungere gr 100/hl di Bagnante adesivo.

CARCIOFO
gr 50-100/hl usando circa 500 litri d'acqua/ettaro, per concentrare e e anticipare la produzione sulle varietà: Carciofo di Nola, Carciofo di ogni mese, Violetto di Provenza e Spinoso sardo. Intervenire con un primo trattamento al momento della formazione del primo capolino quindi con un secondo, alla dose minima, dopo la prima raccolta. In colture non forzate i due trattamenti vanno distanziati di circa venti giorni uno dall'altro con il primo due mesi prima della raccolta del carciofo. Aggiungere gr 100/hl di Bagnante adesivo.

FRAGOLA
gr 50-100/hl usando 600-800 litri d'acqua/ettaro, per incrementare la produzione delle varietà: Surprise des Halles, Red Gautlet, Cambridge, Gorella, Aliso, Poca Hontas e Favourite; intervenire 30-40 giorni prima della fioritura con l'aggiunta di gr 100/hl di Bagnante adesivo.

VITE
gr 100-150/hl in 1.000 litri d'acqua/ettaro, per favorire l'allegagione delle uve da tavola: Regina, Cardinal, Chasselas, Moscato d'Amburgo e altri, Pizzutello e Italia; intervenendo con il 20-30% dei fiori aperti e con l'aggiunta di gr 100/hl di Bagnante adesivo.

AGRUMI
gr 100-150/hl usando 1.500 litri d'acqua/ettaro all'inizio dell-invaiatura per migliorare la colorazione della buccia.

PATATA
gr 50-100/hl per interrompere la quiescenza dei tuberi da seme e stimolare lo sviluppo dei germogli. Immergere per circa 10 minuti i tuberi interi o sezionati in una soluzione alla dose indicata. Usare la dose minima per i tuberi sezionati.

CONDIZIONI GENERALI D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato in assenza di vento e almeno otto ore prima dell'inizio della eventuale pioggia. Affinchè le colture trattate rispondano in pieno alle sollecitazioni del prodotto sarà necessario che siano effettuate tutte le pratiche colturali, le concimazioni, gli interventi antiparassitari e che il terreno sia sufficientemente umido.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con tutti i più comuni antiparassitari purchè la reazione della soluzione non superi il valore di pH 7.

AVVERTENZA

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto è fitotossico per la cultivar di pero Decana del Comizio. Per le varietà di pero, fragola, vite, carciofo, patata e agrumi non citate nel testo dell'etichetta, effettuare prove preliminari su di una piccola superficie.
Intervallo che deve essere rispettato tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 20 giorni.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Biolchim
Biolchim s.r.l. - Via S. Carlo, 2130
Tel. (051) 850.150 - Medicina (BO)
Telex 222054 GZARCH I

Officina di produzione: BIOLCHIM s.r.l. - Medicina (Bo)

Reg. Ministero Sanità n. .... del ....

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto gr. 100**

5595

BIOMITE

Acaricida

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

Propargil puro	gr 30
Fenson puro	gr 25
Coformulanti qb. a	gr 100
(contiene XILOLO)	

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Evitare di respirarne i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo. **Sintomi di intossicazione acuta:** vomito, diarrea, parestesia diffusa, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici - **Intossicazione acuta:** lavanda gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (25 gr di solfato di sodio). Per la liposolubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perchè aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 gr) contro i tremori muscolari - Fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocleremia. Dieta priva di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedina.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il BIOMITE è un acaricida completo in grado di controllare uova, larve e adulti di numerosi acari parassiti delle colture agricole.

DOSI D'IMPIEGO

gr 150/hl in tutti i casi ma soprattutto nelle prime fasi dell'attacco.
gr 200/hl in presenza di attacchi massicci e di acari resistenti.
Per avere il massimo del risultato il trattamento con BIOMITE bagnare abbondantemente la coltura da proteggere. I migliori risultati si ottengono quando la temperatura supera i 18°C.

Il BIOMITE è indicato per combattere:

Vite (solo post-fioritura): contro ragnetto giallo e ragnetto rosso comune.

Melo (escluso Golden Delicious): contro ragnetto rosso dei fruttiferi o europeo, ragnetto rosso comune e tetranychus lennensis.

Agrumi: contro panonychus citri e ragnetto rosso dei fruttiferi.

Pesco e Susino: contro ragnetto rosso dei fruttiferi o europeo e eotetranychus pruni.

Melanzana, Pomodoro, Peperone: contro ragnetto rosso comune.

Garofano e Crisantemo (in pieno campo): contro ragnetto rosso comune.

Fagiolo, Prezzemolo: contro ragnetto rosso dei fruttiferi o europeo e ragnetto rosso comune.

Vivai di Tiglio, Ippocastano, Acero, Nocciolo, Biancospino e Salice: contro eotetranychus tiliarius.

Piante ornamentali di conifere dei generi Picea, Pinus, Larix, Abies, Cedrus, Sequoia, Pseudotsuga, Thuja e Juniperus: oligonychus ununguis.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il BIOMITE è compatibile con la generalità dei fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina come poltiglia bordolese e polisolfuri.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto procura fitotossicità sulle seguenti colture: Pero, Rosa, Fragola, Golden Delicious, Cucurbitacee. Sulla Vite il BIOMITE può essere impiegato solamente dopo la fioritura. Dopo un trattamento con olii minerali bianchi fare passare almeno un mese di tempo prima di intervenire con BIOMITE.
Rischio di nocività: il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Biolchim

Biolchim s.r.l. - Via S. Carlo, 2130
Tel. (051) 850.150 - Medicina (BO)
Telex 222054 GZARCH I

Officina di produzione:
SARIAF S.p.A. - Via S. Silvestro, 1 - 48018 FAENZA (RA)

Reg. Ministero Sanità n. .... del ....

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg. 0,1**

5596

BIOLFID

Aficida selettivo a rapida azione
Attivo anche contro gli afidi resistenti

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

Pirimicarb puro . . . . gr 23,75
Disperdenti, Bagnanti q.b. a . . . . . . gr 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialarrea, dispea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: Le ossine (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE

Il BIOLFID è un aficida adatto alla lotta contro gli afidi anche quelli più resistenti. E' di rapido effetto ha una buona azione traslaminare e fumigante, non ha odori sgradevoli e colpisce anche gli afidi nascosti e protetti dalle foglie accartocciate.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

Gr. 100-150 ogni cento litri d'acqua contro:
Pero-Melo: Afide cenerognolo, Afide verde, Afide verde migratore, Afide bruno.
Pesco, Susino, Ciliegio, contro: Afide verde, Afide nero, del ciliegio, Afide farinoso.
Carota, Cavolo, Cavolfiore, Cetriolo, Cipolla, Lattuga, Fagiolo, Patata, Pomodoro, contro: Afide dello scalogno, Afide della lattuga, Afide del cardo e del carciofo, Afide del cavolo, Afide del pisello, Afide delle ombrellifere, Afide nero della fava, Afide verde del pesco, Afide della patata, Afide dei getti delle patate.
Floricoltura di pieno campo: (Crisantemo, Garofano, Geranio, Gladiolo, Oleandro, Rosa) contro: Afide della rosa, Afide dei bulbi, Afide del Tulipano, Afide bruno del crisantemo, Afide del giglio, Afide dell'edera, Afide verde del crisantemo, Afide del geranio.
Fragola: Afide della fragola.
Frumento e cereali in genere: Afide verde scuro della avena, Afide del mais, Afide del frumento, Afide grande dell'avena.
Larice, Ribes, Olmo, Abete, Ligustro, Ontano, Faggio, Pino, Abete rosso, Salice, contro: Cherme del larice, Afide della spina cervina, Afide del ribes, Pidocchio delle galle piriformi, dell'olmo, Cherme dell'abete, Afide dell'abete bianco, Afide del ligustro, Afide larigero dell'ontano, Afide del faggio, Cherme larigero del pino, Cherme dell'abete rosso, Afide del salice

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il BIOLFID è compatibile con i comuni antiparassitari fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili: è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Biolchim
Biolchim s.r.l. - Via S. Carlo, 2130
Tel. (051) 850.150 - Medicina (BO)
Telex 222054 GZARCH I

Officina di produzione:
SARIAF S.p.A. - Via S. Silvestro, 1 - 48018 FAENZA (RA)
Reg. Ministero Sanità n. [illegible] del [illegible]

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg. 1**

5597

ANTICASCOLA BIOLCHIM

Fitormone Liquido

COMPOSIZIONE:

NAA puro	gr. 2,45
Diluenti e disperdenti q.b. a . .	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:

L'Anticascola Biolchim è un fitoregolatore in formulazione liquida appositamente studiato per prevenire la cascola prematura dei frutti. In condizioni ottimali di temperatura ed umidità manifesta la sua azione entro poche ore dal suo impiego.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Pero - Cotogno - Varietà precoci: 70 cc. per 100 litri di acqua, 7 giorni prima della raccolta.
Varietà estive: 80 cc. per 100 litri d'acqua, 7-10 giorni prima della raccolta.
Varietà autunnali: 100 cc. per 100 litri d'acqua, 10 giorni prima della raccolta.
Varietà invernali: 100 cc. per 100 litri d'acqua, 1° trattamento fine agosto, 2° trattamento dopo 15 giorni circa.

Melo - Varietà precocissime: 40-60 cc. per 100 litri di acqua, 8-15 giorni prima della raccolta.
Varietà precoci: 60-70 cc. per 100 litri d'acqua, 10-18 giorni prima della raccolta.
Varietà normali: 70-85 cc. per 100 litri d'acqua, 10-20 giorni prima della raccolta.
Varietà tardive: 85-100 cc. per 100 litri d'acqua, 10-20 giorni prima della raccolta.
Irrorare la vegetazione preferibilmente verso sera bagnando uniformemente l'intera chioma della pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Da non miscelare con altri antiparassitari.
« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».
Sospendere i trattamenti almeno 5 giorni prima della raccolta.

Biolchim

Biolchim s.r.l.
Via S. Carlo 2130
40059 Medicina (BO)
Tel. (051) 850.150
Telex 222054 GZARCH I

Officina di produzione: BIOLCHIM S.r.l. Medicina (Bo)

Reg. Ministero Sanità n. .... del ....

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg. 0,500**

5598

SEBIOL 5P

Insetticida in polvere secca

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

Carbaryl puro (esente da beta-naftolo) . . gr. 5
Coformulanti . . . . gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirarne i vapori.

INFORMAZIONI MEDICHE

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialarrea, dispea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.
Controindicazioni: Le ossine (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE

Il SEBIOL 5 P è un insetticida efficace contro vari insetti che si evolvono sulle colture. Il SEBIOL 5 P si impiega contro: Cydia del pesco; Carpocapsa del pero e melo; Tignola e Tignoletta della vite; Tignola dell'olivo; Tignola degli Agrumi; Cacoccia, Pandemis, Eulia, Orgya del melo e del pero; Lavilaio dei cavoli; Dirifora della patata; Bega verde del garofano (solo in pieno campo); Altica, cassida, mamestra della Barbabietola da zucchero; Piralide e sesamica del mais; Fitonomo, misurino e apicon delle colture foraggere.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il SEBIOL 5 P si impiega alla dose di 30-35 Kg/ha impolverando uniformemente, con apposita apparecchiatura impolveratrice, la vegetazione delle colture da proteggere.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il SEBIOL 5 P è compatibile con le generalità dei fitofarmaci di più comune impiego ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lunga. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischio di nocività: L'impiego del SEBIOL 5 P è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, i pesci e per gli insetti utili. Non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 10 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Biolchim

Biolchim s.r.l.
Via S. Carlo, 2130
40059 MEDICINA (BO)
Tel. (051) 850.150
Telex 222054 GZARCH I

Officina di produzione:
SARIAF S.p.A. - Via S. Silvestro, 1 - 48018 FAENZA (RA)

Reg. Ministero Sanità n. .... del ....

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg. 1

5599

CLASSE IV

MICRODIFOLTAN-STI

Anticrittogamico micronizzato, formulato in polvere bagnabile, particolarmente indicato per combattere peronospore e muffa grigia.

COMPOSIZIONE 100 gr. di prodotto contengono:

FOLPET puro	56 gr.
CAPTAFOL puro	20 gr.
Bagnanti, disperdenti ed inerti	q.b. a 100 gr.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.
- Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polveri nel maneggio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: Azione irritante sul tratto gastrointestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea. Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.

Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (g. 30 per litro di acqua) e digitale.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

IL MICRODIFOLTAN-STI si impiega alle seguenti dosi per ettolitro d'acqua:

Vite: contro Peronospora: 120-150 gr/hl; contro Muffa grigia (Botrytis Cinerea): 120-150 gr/hl, iniziando i trattamenti dalla fase degli acini formati e ripetendoli ogni 12-15 giorni fino in prossimità della raccolta; per le uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per non ostacolare la fermentazione dei mosti; contro Escoriosi (Phomopsis Viticola): 200-250 gr/hl, in due trattamenti precoci partendo dallo stadio dei germogli con 3-4 foglioline e prima dei trattamenti antiperonosporici che seguiranno poi normalmente; contro Antracnosi e marciume nero dell'uva: 200-250 gr/hl.

Fragola: contro Muffa grigia: 120-150 gr/hl, eseguendo tre trattamenti: uno quando circa il 10% dei fiori è sbocciato, uno a metà fioritura e l'altro verso la fine. Bagnare abbondantemente le piante ed il suolo circostante; contro Violatura: 100-150 gr/hl.

Pomodoro: contro Alternariosi, Peronospora, Septoriosi e Ticchiolatura: 100-150 gr/hl.

Patata: contro Peronospora ed Alternariosi: 100-150 gr/hl.

Lattuga: contro Peronospora: 100-150 gr/hl.

Cipolla: contro Peronospora ed Alternariosi: 150-200 gr/hl.

Sedano: contro Septoriosi e Cercospora: 150-200 gr/hl.

Fagiolo: contro Antracnosi: 150-200 gr/hl.

Tabacco: contro Botrytis: 150-200 gr/hl.

Cocomero e Melone: contro Peronospora ed Antracnosi: 100-150 gr/hl.

Rosa in pieno campo: contro Ticchiolatura e Peronospora: 100-150 gr/hl.

Tulipano e Gladiolo in pieno campo: contro Botrite: 100-150 gr/hl.

Crisantemo in pieno campo: contro Botrite: 150-200 gr/hl; contro Septoriosi: 100-150 gr/hl.

Per la preparazione della miscela stemperare l'opportuna dose di prodotto in poca acqua, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida ed omogenea, aggiungere quindi il rimanente quantitativo d'acqua necessario a raggiungere la diluizione richiesta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': IL MICRODIFOLTAN-STI è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o debolmente acida, non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Avvertenza: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione con olii minerali e polisolfuri. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta. Sulle uve da vino, sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.

Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA

Stabilimento di produzione: V.le De Gasperi, 4 - 48010 COTIGNOLA (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5599 **del** 16-12-83

Peso netto: Kg. 1

5600

ZOCOLD 80

Fungicida polvere bagnabile

COMPOSIZIONE:

Zolfo puro (esente da selenio)	gr. 80
Sospensivanti, adesivanti	q.b. a gr. 100

CLASSI TOSSICOLOGICA IV

NORME PRECAUZIONALI:
- conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO: (dosi per 100 litri d'acqua)

Lo ZOCOLD 80 è uno zolfo colloidale. La formulazione colloidale assicura elevata attività contro l'Oidio o Mal Bianco delle colture sotto indicate:

Pomacee: melo e pero contro l'Oidio gr. 80-100.

Drupacee: pesco, albicocco, susino, mandorlo contro l'Oidio gr. 80-100.

Vite: uve da vino e da tavola contro l'Oidio gr. 80-100.

Ortaggi a frutto: Cucurbitacee: melone, zucchino, cetriolo, contro l'Oidio gr. 80-100.

Cereali: Frumento, segale, orzo, avena, contro l'Oidio Kg. 5 ad Ha.

Floricoltura: in pieno campo contro l'Oidio della rosa, ortensia, e crisantemo gr. 80-100.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI.

Compatibilità: non è compatibile con polisolfuri, poltiglia bordolese, oli minerali, captano, DDVP, Binapacril, Dicofluanide, deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

Pere: Buona Luisa d'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

Vite: Sangiovese.

Cucurbitacee: può essere fitotossico.

INTERVALLO: sospendere i trattamenti 5 gg. prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto dlle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

S.C.A.M. srl MODENA
Officina di Produzione: SCAM - MODENA
Reg. Ministero Sanità n. 5600 del 15-11-83

DA NON VENDERSI SFUSO.

Peso Netto Kg. 0,100

SCAM MODENA
CONCIMI BIOCHIMICI
CONCIMI FOGLIARI
ANTIPARASSITARI
Stabilimento e uffici: S. MARIA DI MUGNANO - Tel. 30.91.31

5601

Caratteristiche: aficida ad azione per contatto ed ingestione, dotato di marcata attività translaminare che gli consente di colpire anche i fitofagi presenti sulla pagina fogliare non direttamente raggiunta dal trattamento.

Parassiti combattuti: afidi in genere quali ad esempio: Myzus persicae, Aphis fabae, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae, Brachycaudus persicae-niger, Aphis pomi, Eriosoma lanigerum

Colture protette e dosi d'impiego:

Colture arboree da frutto (pero, melo, pesco, albicocco, ciliegio, susino) . . . gr. 150-200/hl

Colture ortive: patata, pomodoro, peperone, cetriolo, fagiolo, fava, cipolla, fragola . . . gr. 150-200/hl

indivia, lattuga carota . . . gr. 150/hl

cavoli, rapa, broccolo . . . gr. 200/hl

Cereali (grano, orzo, avena) . . . kg. 1-1,5/Ha

Barbabietola da zucchero . . . kg. 1-1,5/Ha

Pianta da fibra (canapa, lino) . . . kg. 1-1,5/Ha

Colture industriali di piante ornamentali, da fiore e piante forestali gr. 150-200/hl

Si consiglia di usare non meno di 10 hl/Ha di poltiglia antiparassitaria e di usare la dose massima di prodotto in caso di forte infestazione o di vegetazione molto fitta.

Epoche d'impiego: alla prima comparsa dei parassiti o ad ogni eventuale reinfestazione.

Modalità d'impiego: bagnare bene ed uniformemente la chioma delle piante avendo cura di trattare le parti nascoste della vegetazione da proteggere. Vuotare il prodotto direttamente nel serbatoio ed agitare energicamente. E' consigliabile aggiungere gr. 100 di bagnante ASTROL ogni 100 litri di acqua.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è miscibile con la maggior parte dei fitofarmaci a reazione neutra. Non è miscibile con arseniato di calcio, polisolfuri e poltiglia bordolese. Si consiglia comunque di eseguire sempre una prova preventiva per assicurarsi che non esistano incompatibilità. Il cambiamento di colore o la flocculazione durante una miscela rendono questa sconsigliabile. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Sospendere i trattamenti 14 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurarsi l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERPHOS®

AFICIDA SELETTIVO

II CLASSE

NOCIVO

Composizione:

PIRIMICARB puro . . . . gr. 25

Coformulanti . . . q.b. a gr. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 799.461/2 - Telex I 511046

Registrazione N.
del
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 0,500

NATURA DEL RISCHIO: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Evitare di respirarne i vapori ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti ● Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone ● Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva ● In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi d'intossicazione: *nausea - vomito - diarrea - scialorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.*

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio; lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente ai bambini. Ossigenoterapia se vi è cianosi.

Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero in Centro di rianimazione.

Controindicazioni: *le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.*

5602

ERBITAN LIQUIDO

ERBICIDA TOTALE

Composizione: g 100 di prodotto contengono:
— DIQUAT puro . . . . g 10
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi di acqua. Evitare di respirare i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili, dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (trattare le stesse con soluzioni di soda caustica). Interrarle in fosse profonde più di metri 1, cospargendole con calce viva. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: i sintomi di intossicazione, qualunque sia la via di somministrazione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata). L'introduzione nell'organismo anche di poche gocce del prodotto può essere fatale: non attendere la comparsa dei sintomi per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perché sia praticata la emodialisi. Nel frattempo, nel caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni faringee) e somministrare una sostanza assorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra ✓ fallone, la terra di Fuller, ecc.
Intossicazione per ingestione e per inalazione: i primi sintomi sono: epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare con positività del test di funzionalità respiratoria. Dopo 2-3 giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato-renali. L'edema polmonare evolve verso una fibrosi polmonare grave, sino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di diquat nel sangue.
Intossicazione per contatto: occhi: forte irritazione della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore). Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole. **Unghie:** macchie bianche con lesioni trasversali e caduta. Terapia: sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.

Caratteristiche: erbicida totale per infestanti monocotiledoni e dicotiledoni. Si impiega per il diserbo di strade, banchine, guard-rails, reti di protezione, aiuole spartitraffico, fossi, canali, piazzole di sosta, aeroporti, depositi militari, aree industriali e civili, linee ferroviarie alla dose di 2-10 g per litro d'acqua per metro quadro. Distribuire il prodotto uniformemente e irrorare abbondantemente se non è prevista una pioggia imminente.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: il prodotto va impiegato da solo.
Fitotossicità: trattandosi di un diserbante disseccante, il prodotto può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora ben lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto usare con precauzione. Le pompe e gli utensili usati per il trattamento diserbante non devono essere impiegati per gli altri trattamenti antiparassitari se non sono stati ripetutamente lavati con acqua calda e soda.
Rischio di nocività: il prodotto, a seguito dei trattamenti, è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.
Attenzione: da non usare su terreni destinati a colture alimentari perché pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Reg. Ministero Sanità n. 5602 del 28.12.83

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso Netto g 100**

BIMEX S.p.A.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
TELEFONI N.: (0444) 55.81.69 - 55.81.99

officina di produzione DIACHEM S.p.A.
ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

5603

URONIL

DISERBANTE PER L'ERBA MEDICA

COMPOSIZIONE

— Diuron puro . .	gr. 41
— Propyzamide pura .	gr. 26
— Inerti e coadiuvanti .	q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'URONIL è un diserbante selettivo che viene impiegato su erba medica dopo l'anno di impianto. E' attivo per assorbimento radicale ed è consigliato per eliminare avventizie mono e dicotiledoni in via di germinazione per periodi sufficientemente prolungati. Su graminacee quali Alopecurus, Poa, Lolium, Agrostis agisce anche su piante sviluppate perchè il prodotto in presenza di pioggia viene trasferito in quella parte di terreno dove sono le radici delle infestanti. Effettuare il trattamento in novembre - dicembre in quanto è in questo periodo che il terreno è maggiormente umido; si impiegano Kg. 3 di URONIL per ettaro. Non trattare a fine inverno perchè nel caso mancasse l'umidità il prodotto non esplica a pieno la propria azione. Usare 500 - 700 litri di acqua per ettaro curando l'uniformità della distribuzione. Non trattare su medica a ripresa vegetativa.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli olii minerali bianchi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato"

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione n. . del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto Kg. 1

5604

CLORTAN-M

DISERBANTE SELETTIVO DEL GRANO E CEREALI MINORI PER TRATTAMENTI DI POST-EMERGENZA

COMPOSIZIONE

— Clortoluron puro	gr. 30
— Mecoprop (CMPP) puro . . . . (sotto forma di sale dimetilamminico)	gr. 30
— Coformulanti	q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi d'intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.

Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Il CLORTAN-M è un diserbante consigliato per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni annue che infestano il grano, segale e orzo. Si impiega in post-emergenza dei cereali dall'inizio alla metà dell'accestimento per combattere: Avene selvatiche, Lolium, Poa, Apera spica-venti, Coda di volpe, Ranuncolo, Veronica, Veccia, Fior di grano, Capsella, Senape, Rafano, Camomilla, Fiordaliso, Papavero, Cerastio, Geranio, Galeopsis, Lamio.

Il CLORTAN-M si usa alle dosi di:

— Kg. 4-5 per ettaro nei normali impieghi;

— Kg. 6-7 per ettaro quando si operi su terreni mediamente argillosi e contro le Avene selvatiche purchè non abbiano superato il primo culmo dell'accestimento.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: il prodotto va impiegato da solo.

Fitotossicità: da non impiegare con temperature inferiori agli 8-10 °C e superiori ai 21 °C. Non trattare i cereali con trasemina di leguminose. Non trattare varietà di grano tenero DEMAR 4 e varietà di grano duro KID. Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: alberi da frutto, vite, ortaggi ecc. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

"Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta".

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (Bo)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. [illegible] del [illegible] del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 1

5605

BOLD

AFICIDA - ACARICIDA

COMPOSIZIONE

— Butocarboxim puro .	. gr. 23
— Coadiuvanti, solventi	q. b. a gr. 100

CLASSE I

VELENO

NATURA DEI RISCHI D'INTOSSICAZIONE

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione: Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.

Consigli terapeutici: Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno terapia se vi è cianosi.

Controindicazioni: Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

MODALITA' D'IMPIEGO

— gr. 200-300/ql. acqua contro gli **Afidi** del: **Melo - Susino - Pesco - Pomodoro - Barbabietola da zucchero - Cavolo - Cavolfiore - Fagiolo - Insalata; Rosa - Garofano - Gladiolo - Cineraria e Cipresso in pieno campo.**

— gr. 300-400/ql. acqua contro gli **Acari** del: **Melo - Pesco - Susino - Pomodoro - Fagiolo - Rosa in pieno campo.**

Per completare l'azione acaricida del prodotto è consigliabile aggiungere un prodotto ad attività ovicida.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con i comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame. Non trattare in fioritura in quanto il prodotto è tossico nei confronti delle api.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione N. [illegible] del [illegible] del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO
Peso netto kg. 1

5606

VIREM 50

FUNGICIDA ORGANICO DI CONTATTO

COMPOSIZIONE

— Vinclozolin puro .	gr. 50
— Coformulanti	q. b. a gr. 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua: dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il VIREM 50 è un fungicida di copertura che esplica un'azione di tipo preventiva impedendo la germinazione delle spore. Inoltre possiede una azione bloccante sulle spore germinate. Risulta particolarmente efficace per il controllo di: Botrite o Muffa grigia, Sclerotinia e Moniliosi. Sulla vite non interferisce sulla fermentazione dei mosti nè sul processo d'invecchiamento dei vini.

Vite: gr. 150-200/hl impiegare almeno Kg. 1,5-2 di prodotto per ettaro. Per il controllo della Botrytis cinerea effettuare almeno 4 trattamenti, curando la bagnatura dei grappoli, nelle seguenti fasi: fine fioritura, prechiusura del grappolo, invaiatura e 3-4 settimane prima dell'inizio della vendemmia.

Drupacee (Pesco, Susino, Ciliegio, Mandorlo e Albicocco): gr. 150-200/hl per il controllo della Monilia intervenire nelle seguenti fasi vegetative: inizio e durante la fioritura, 5 e 3 settimane prima dell'inizio della raccolta.

Fragola: gr. 150-200/hl per il controllo della **Botrytis cinerea** intervenendo in pre-fioritura, piena fioritura, fine fioritura e 3 settimane prima della raccolta.

Insalate (Lattuga, Indivia, Radicchio, Cicoria, Scarola): gr. 150-200/hl acqua per il controllo di Botrytis e Sclerotinia iniziare i trattamenti dopo la crisi del trapianto. Di norma si consigliano 3-5 trattamenti avendo cura di impiegare Kg. 1,5-2 per ettaro, di prodotto.

Aglio, Cipolla, Gladiolo, Tulipano in pieno campo: Contro la Botrytis e il Marciume bianco si interviene secondo due diverse metodologie:

1) **trattamento ai bulbi in pre-semina:** eseguire una concia a secco dei bulbilli impiegando gr. 800 di prodotto per quintale di seme.
2) **trattamento di post-trapianto o dopo la semina:** eseguire 4 irrorazioni impiegando Kg. 1,5 di prodotto per ettaro, nelle seguenti epoche: con coltura a 5-6 foglie, ingrossamento dei bulbi, 40 giorni prima della raccolta e 3 settimane prima della raccolta.

Floricoltura in pieno campo (Gerbera, Ciclamino, Geranio, Rosa): gr. 150-200/hl acqua, contro la Botrytis con trattamenti preventivi.

"Da non applicare con mezzi aerei"

Compatibilità: il prodotto è miscibile con tutti gli antiparassitari in commercio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Registrazione n. del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. 1

5608

POLVERE TIPO BORDOLESE BLÛ

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
— RAME METALLICO (sotto forma di Solfato di rame) g 20,2
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: la **POLVERE TIPO BORDOLESE BLU'** è essiccata e preparata con procedimento industriale e formulata in polvere bagnabile pronta per l'uso. La **POLVERE TIPO BORDOLESE BLU'** pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce« Il contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto una azione fungicida, contro le seguenti malattie crittogamiche sensibili al rame come sotto specificato.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
VITE: contro Peronospora: g 700-1200/hl d'acqua; applicare secondo i tradizioali calendari di lotta, specialmente nel periodo di « chiusura ».
POMACEE: contro Ticchiolatura e Cancri: g 1000-1500/hl d'acqua nei trattamenti «eradicanti» alla caduta delle foglie.
DRUPACEE: contro Bolla, Corineo, Sclerotinia, Marciume bruno del mandorlo: g 1200-2000/hl d'acqua nei trattamenti autunnali e invernali « al bruno ».
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine: g 1000-1500/hl d'acqua nei trattamenti primaverili ed autunnali.
AGRUMI: contro Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal Secco: g 800-1500-3000/hl d'acqua.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercosporiosi: kg 7,5-10 ad ettaro con 5-8/hl d'acqua.
PATATA, POMODORO e COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo: contro Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora: g 700-1200/hl d'acqua.
Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': la **POLVERE TIPO BORDOLESE BLU'** è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabile e colloidale, con i fertilizzanti foglieri. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cupro-sensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego.
(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza (« Belfort ») - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rame Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - Renetta del Canadà - Rosa mantovana.
(**) Peri cupro-sensibili: Abate feltel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Claigeau - Passa - Crassana - B.C. William - Dottor Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione:

CAFFARO S.p.A. ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO KG 10

5609

POLVERE TIPO BORDOLESE BIANCA

COMPOSIZIONE (riferita a g 100):
— RAME METALLICO (sotto forma di Solfato di rame) . . . . g 20,2
— Coformulanti q.b. a . . . . g 100

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: la **POLVERE TIPO BORDOLESE BIANCA** è essiccata e preparata con procedimento industriale e formulata in polvere bagnabile pronta per l'uso. La **POLVERE TIPO BORDOLESE BIANCA** pertanto si impiega sospendendola direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce. Il suo contenuto in rame metallo attivo conferisce al prodotto una azione fungicida, contro le seguenti malattie crittogamiche sensibili al rame come sotto specificato.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
VITE: contro Peronospora: g 700-1200/hl d'acqua; applicare secondo i tradizioali calendari di lotta, specialmente nel periodo di « chiusura ».
POMACEE: contro Ticchiolatura e Cancri: g 1000-1500/hl d'acqua nei trattamenti «eradicanti» alla caduta delle foglie.
DRUPACEE: contro Bolla, Corineo, Sclerotinia, Marciume bruno del mandorlo: g 1200-2000/hl d'acqua nei trattamenti autunnali e invernali « al bruno ».
OLIVO: contro Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine: g 1000-1500/hl d'acqua nei trattamenti primaverili ed autunnali.
AGRUMI: contro Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal Secco: g 800-1500-3000/hl d'acqua.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercosporiosi: kg 7,5-10 ad ettaro con 5-8/hl d'acqua.
PATATA, POMODORO e COLTURE ORNAMENTALI in pieno campo: contro Alternariosi, Septoriosi, Antracnosi, Peronospora: g 700-1200/hl d'acqua.
Sospendere in poca acqua la dose di prodotto, mescolare sino ad ottenere una poltiglia fluida, aggiungere altra acqua e versare nel totale quantitativo d'acqua richiesto.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': la **POLVERE TIPO BORDOLESE BIANCA** è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabile e colloidale, con i fertilizzanti foglieri. Sono sconsigliabili le miscele con i prodotti a base di Maneb.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e varietà di melo (*) e di pero (**) cupro-sensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego.
(*) Meli cupro-sensibili: Abbondanza (« Belfort ») - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rame Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - Renetta del Canadà - Rosa mantovana.
(**) Peri cupro-sensibili: Abate feltel - Buona Luigia d'Avranches - Butirra Claigeau - Passa - Crassana - B.C. William - Dottor Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard.

NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TERRANALISI s.n.c.
Via Donizetti, 2/a — CENTO (Ferrara) — Tel. 906207

Stabilimento di produzione:

CAFFARO S.p.A. ADRIA - Cavanella Po (Rovigo)

Registrazione n. 5609 del 6-12-83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO PESO NETTO KG 10

5610

FLORVITA (R)

FUNGICIDA

Fungicida in polvere bagnabile per la difesa antiparassitaria della rosa e del garofano in pieno campo.

COMPOSIZIONE

– Zineb puro	g	32
– Zolfo puro (esente da selenio)	g	39,6
– Coadiuvanti,Coloranti,Inerti:quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

SIPCAM - Soc.It.Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

Registrazione n. 5610 del 16.12.83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

Prescrizioni particolari:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchiti. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia:

In caso di ingestione, provocare il vomito; lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso di ingestione del prodotto può manifestarsi solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un antiparassitario ad azione fungicida per la difesa delle colture di rosa e garofano in pieno campo da Peronospore, Ticchiolature, Septoriosi, Alternarie, Ruggini, Oidio o Mal Bianco.

Dose d'impiego : 4-5 g per ogni litro di acqua (40-50 g per 10 litri di acqua) distribuiti sulle piante con pompe irroratrici a volume normale in modo da bagnare bene la vegetazione, evitando però sgocciolamenti delle foglie irrorate.
Il prodotto si impiega non appena si nota uno stato anomalo delle piante dovuto alle malattie fungine indicate; i trattamenti vanno ripetuti ad intervalli, secondo necessità, per tutta la durata delle infezioni delle malattie.

Preparazione della poltiglia: stemperare la quantità di prodotto necessaria in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua, mescolando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Divieto d'impiego in serra

Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione dei prodotti alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, calce), olii minerali, Captano, DDVP, Binapacril, Diclofluanide. Inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Fitotossicità: A causa del numero particolarmente elevato di varietà di garofano e rosa con diverse caratteristiche di sensibilità, si consiglia di effettuare una prova su limitata superficie, prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5611

FRUMIDOR® C

Fungicida organico in polvere bagnabile per la difesa del frumento e dell'orzo.
Si impiega in trattamenti liquidi come specifico contro le malattie tardive del frumento e dell'orzo (Oidio,Ruggini,Fusariosi,Septoriosi).

COMPOSIZIONE

–Captafol puro	g	10
–Mancozeb puro	g	20
–Zolfo puro (selenio assente)	g	50
–Coadiuvanti, inerti:quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato SIPCAM-Milano

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano- SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano
Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n 5611 del 16.12.83 Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Prescrizioni particolari:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto.
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da umidità e calore.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:

L'ingestione provoca: bruciori esofagei, nausea, conati di vomito, coliche addominali, diarrea, apatia, irritazione nervosa, aritmia,cianosi, collasso cardiocircolatorio.
A contatto con la cute e con le mucose provoca irritazione locale, dermatite, fotodermatosi, congiuntivite, faringite, ecc.

Terapia:

In caso di ingestione: provocare il vomito; lavanda gastrica con magnesia usta (g 30 per litro d'acqua); il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se esistono lesioni gastroesofagee; se il paziente vomita spontaneamente non praticare nessuna metodica evacuativa. Inoltre, se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione.
Digitale, purganti salini, cure sintomatiche.
Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggi, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.
Controindicazioni: alcool, olii, grassi.

MODALITA' DI IMPIEGO

Per la lotta contro le malattie tardive: che colpiscono le foglie, il culmo e la spiga del frumento e dell'orzo (Oidio, Ruggini, Fusariosi, Septoriosi) e che riducono sensibilmente la produzione, effettuare almeno un'irrorazione al termine della spigatura su frumento ed in fase di "botticella" su orzo, impiegando una dose di 8 Kg/ha di prodotto,elevabile a 10 Kg/ha in caso di forti attacchi fungini, distribuiti in 400-600 lt di acqua. Nel caso vi sia una precoce comparsa delle malattie potrebbe essere utile effettuare anche un trattamento durante la levata dei cereali, su frumento all'emissione delle ultime foglie e su orzo alla prima comparsa delle malattie, sempre alla stessa dose.

Preparazione della poltiglia: impastare il prodotto in poca acqua a parte, indi versare la miscela così ottenuta nel totale quantitativo di acqua,mescolando accuratamente.

Da non applicare con mezzi aerei

Da non impiegare in serra

Da non impiegare su colture diverse da quelle indicate

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari di impiego primaverile-estivo ad eccezione dei prodotti alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, calce), olii minerali, Captano, DDVP, Binapacril, Diclofluanide. Inoltre deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso Kg. 1

5614

ZINEB BLU

FUNGICIDA

Composizione:

ZINEB puro . . . g. 70
Coformulanti q.b. a g. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi d'intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).
Terapia: in caso d'ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato d'incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.
In caso d'ingestione lo Zineb può provocare solfoemoglobinemia, formazione di corpi di Heinz e anemia emolitica acuta in soggetti con deficit enzimatico della glucosio-6-fosfodeidrogenasi. In tale evenienza, ricoverare il paziente in centro di rianimazione e praticare trasfusioni di sangue.

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche: attivo per contatto con possibilità di assorbimento fogliare e di spostamenti citotropici.

Campi d'impiego e dosi:
— **vite:** g. 300/hl contro peronospora;
— **pomacee:** g. 280-300/hl contro ticchiolatura;
— **pomodoro,** solo fino alla prima fioritura: g. 300-400/hl contro peronospora, alternariosi, septoriosi e cladosporiosi;
— **pioppo:** g. 350/hl contro marsonnina e ticchiolatura;
— **cereali** in campo: 3-3,5/ha contro ruggine e septoriosi;
— **tabacco:** g. 200/hl in semenzaio e g. 300/hl in pieno campo contro peronospora tabacina;
— **garofano** in pieno campo: g. 250-300/hl contro ruggine.

Epoche d'impiego: per trattamenti preventivi secondo i normali calendari adottati, ripetendo pertanto ad opportuni intervalli in funzione dell'infezione e a seconda dell'andamento stagionale.

Metodi d'impiego: distribuire il prodotto nella quantità sufficiente e in modo da coprire uniformemente la vegetazione. Si consiglia d'aggiungere g. 100 di Bagnante Agrico per ogni ettolitro di miscela.

Da non applicare con mezzi aerei.

Divieto d'impiego in serra.

Divieto d'impiego su colture diverse da quelle indicate.

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni antiparassitari, salvo quelli a reazione alcalina. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: si sconsiglia l'impiego del prodotto sulle varietà di pero sensibili allo Zineb quali ad esempio: Abate Fêtel, Armella, Butirra precoce, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spina Carpi, Zucchermanna. Sulle nuove varietà e sulle varietà locali di pero, prima dell'applicazione a pieno campo, saggiare la selettività del formulato su alcune piante.

Sospendere i trattamenti 28 GIORNI prima del raccolto.

Attenzione! da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

kg. 1

AGRICO **s.r.l.**

Viale Masini, 20 - BOLOGNA

Stabilimento produttore: SARIAF s.p.a., via S. Silvestro, 1 - Faenza

Registrazione Ministero della Sanità n. del

5616

ALPEL

INSETTICIDA EMULSIONABILE

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

— Diazinone puro . . . . gr. 20
— Coformulanti . . . . . . q.b.a gr. 100
"Contiene xilolo„

CLASSE III

ATTENZIONE: Manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione, e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Evitare di respirare i vapori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

SINTOMI DI INTOSSICAZIONE:
scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, lacrimazione, miosi, bradicardia, ipotensione fibrillazione muscolare, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti, 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

CONTROINDICAZIONI:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE:
l'ALPEL è un insetticida emulsionabile che agisce per contatto, ingestione ed asfissia. Inoltre penetra nei tessuti vegetali (effetto citotropico) ed uccide gli insetti nell'interno dei frutti (mosca delle olive e delle ciliege) o riparati negli accartocciamenti fogliari (afidi, cecidomie) o ditteri nell'interno delle foglie (minatori).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO:
l'ALPEL in trattamenti ad alto volume e per 100 litri di acqua si impiega alle seguenti dosi:

Olivicoltura:
contro la mosca gr. 200/hl quando si incominciano a vedere le prime ovodeposizioni sui frutti.
Contro le tignole gr. 125-150/hl da marzo a giugno.

Frutticoltura:
sul ciliegio contro la mosca gr. 150-200/hl.
Sul pero e melo contro la psilla, gli afidi, tripidi, tentredini, maggiolini e cecidomia gr. 125-150/hl quando compaiono le prime infestazioni.
Su albicocco contro la mosca della frutta gr. 100-125/hl.
Su pesco contro la mosca della frutta gr. 150/hl prima dell'inizio della maturazione.

Orticoltura:
Su carciofo contro la depressaria gr. 100/hl.
Su bietola, spinacio, asparago e sedano contro la mosca gr. 100-125/hl quando compaiono le prime infestazioni.

Agrumicoltura.
contro la mosca degli agrumi gr. 150/hl quando inizi la deposizione delle uova.
Contro le cocciniglie gr. 200/hl.
Quando si effettuano i trattamenti a medio e basso volume le dosi per ettolitro vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto. Si consiglia inoltre, di usare un comune adesivo bagnante alla dose consigliata dalla ditta produttrice.
L'emulsione si prepara versando l'ALPEL lentamente nell'acqua e agitando energicamente.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':
l'ALPEL è compatibile con i più comuni fitofarmaci ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri e poltiglia bordolese).

AVVERTENZE:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

NOCIVITA':
l'ALPEL è nocivo per gli animali domestici, il bestiame, la selvaggina, gli insetti utili e i pesci. Non trattare durante la fioritura perchè il prodotto è tossico per le api.

Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE:
da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

---

field farm s. r. l.
Via S. Pietro, 2
66010 TOLLO (Chieti)

Officina produzione:
SARIAF S.p.A. - 48018 FAENZA (RA)
Via S. Silvestro, 1

Reg. N. .... del ....
del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO NETTO KG. 1

5619

DELTAZINA

Erbicida selettivo per il diserbo del mais e del sorgo

Composizione: g. 100 di prodotto contengono:

ATRAZINA pura	g. 47,5
Bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a	g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Modalità d'impiego: il prodotto agisce per contatto e per assorbimento radicale contro le più dannose malerbe annuali quali: Giavone, Erba morella, Borsa pastore, Amaranto, Poa, Farinello, Persicaria, Stellaria.
Sono resistenti: Vilucchio, Gramigna, Sorgo selvatico e Digitaria

Dose di impiego: 4 Kg. per ettaro in 600-1000 litri di acqua. Effettuare il trattamento in pre-emergenza e subito dopo la semina. Una razionale sistemazione del terreno ed un buon tenore di umidità facilitano l'azione diserbante. Non effettuare il diserbo sui terreni torbosi o comunque ricchi di sostanze organiche

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è miscibile con i più comuni diserbanti, ma non deve essere miscelato con insetticidi, fungicidi e concimi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri diserbanti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verifichino casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Fitotossicità: il prodotto è fitotossico per arboree, fruttiferi e viti e pertanto non contaminare tali colture. Le pompe e gli utensili impiegati per il diserbo non devono essere usati per altri trattamenti antiparassitari se non siano stati preventivamente lavati con acqua e sapone.

Nocività: non contaminare fiumi, laghi e canali.

Avvertenza: dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per le altre colture. Far trascorrere 7 mesi per le ripetizioni del trattamento.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DELTA s.r.l.
Via Aurelio Saffi, 15 - Milano

Stabilimento di produzione: SARIAF S.p.A. - FAENZA (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 1

5620

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

EPARGOL

Prodotto ad azione fisiologica contro la rugginosità delle mele Golden Delicious

Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 60 Zolfo puro (esente da selenio).
Sostanze ad azione fisiologica, eccipienti, coadiuvanti ed inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

L'EPARGOL è un prodotto formulato in polvere bagnabile che va sciolto in acqua e irrorato sulle piante per combattere la rugginosità delle mele Golden Delicious.

L'EPARGOL contenendo zolfo, possiede anche azione antioidica.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Iniziare i trattamenti a partire dall'apertura dei mazzetti florali.

Ripeterli ogni 8-10 giorni fino a cinque settimane dopo la caduta dei petali.

L'EPARGOL non è dannoso per le api e pertanto può essere impiegato anche durante la fioritura.

Dosi: kg. 1/hl.

Quando la temperatura è superiore a 20 gradi abbassare la dose a gr. 500-700/hl.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilim.: Quassolo (To)

Reg. n. .... del Ministero della Sanità del ....

3/82

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire l'EPARGOL in un volume doppio o triplo d'acqua. Indi versare la poltiglia così ottenuta nell'irroratrice riempita per metà e portare a volume agitando.

Tenere la poltiglia in agitazione durante il trattamento.

Preparare la miscela al momento dell'impiego.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Si consiglia di impiegare il prodotto da solo onde facilitarne l'azione. E' comunque compatibile con: Dithane M 45, Zirasan 90, Metilsan, Kilval, Sodirodia, Lorzene Flow e Zolone 25.

Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano, con DDVP, con Binapacril, diclofluanide.

Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alle seguenti cultivar di **Mele:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap: alla Golden Delicious se usato in periodi diversi da quello indicato al paragrafo « Dosi e modalità d'impiego ».

Sospendere i trattamenti cinque giorni prima del raccolto.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 0.5

5621

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

FOLMANCAP

Fungicida organico per la lotta contro la Peronospora della vite e contro altre malattie delle colture indicate in etichetta
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 30 Maneb puro
Gr. 15 Folpet puro
Gr. 9 Captafol puro
Coformulanti q.b. a 100.

Natura del rischio:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Durante la manipolazione e l'impiego usare guanti ed occhiali protettivi.
- Evitare il contatto diretto con il prodotto puro o diluito ed anche di sollevare polveri durante la sua manipolazione.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
- *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
- *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
- *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

L'ingestione provoca:
nausea - irritazione del tratto gastrointestinale - conati di vomito - bruciori gastrici con dolori addominali - turbe nervose e diarrea - possibilità di collasso cardiocircolatorio.
Il contatto con la cute e le mucose provoca:
irritazioni delle mucose - eczemi cutanei da fotosensibilizzazioni resistenti alle terapie.

CONSIGLI TERAPEUTICI DI PRIMO INTERVENTO

In caso di ingestione:
- *provocare il vomito*
- *lavanda gastrica con carbone attivo (25 gr/litro di acqua)*
- *cure sintomatiche*

Per il contatto con cute e mucose:
- *lavaggi con acqua semplice, pomate oftalmiche, pomate cortisoniche per le forme eczematose.*

Controindicazioni:
Olii - Grassi - Alcool.
In casi gravi ricovero in centro di rianimazione.

ANTIPARASSITARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento: Ravit Quassolo (TO)

Reg. n. ...... **Ministero della Sanità del**

12 / 1982

CARATTERISTICHE

Il **FOLMANCAP** è un fungicida organico nel quale sono presenti tre principi attivi per la lotta contro la Peronospora della vite.
Possiede inoltre una qualche azione frenante sullo sviluppo della Botrite.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite
— contro la Peronospora: gr. 400/hl.
Pomodoro solo fino alla prima fioritura.
— contro Peronospora, Alternaria, Septoriosi: gr. 400/hl.
Rosa in pieno campo
— contro la Peronospora: gr. 400/hl.
Tabacco
— contro la Peronospora: gr. 400/hl.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO D'IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'

E' compatibile con i prodotti della nostra gamma. Non è compatibile con Poltiglia Bordolese, Polisolfuri e Olio bianco.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Da una applicazione con olii minerali e polisolfuri, devono trascorrere 20 giorni.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta
Sulle uve da vino sospendere i trattamenti 40 giorni prima della vendemmia, per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5622

AGERPAX 50

Diserbante contro Digitaria, Panico, Setaria e Dicotiledoni annuali nelle coltivazioni di mais.

Composizione

AMETRIN puro	gr. 50
Coadiuvanti e bagnanti q.b. a	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti, dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni Mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità d'impiego: Effettuare i trattamenti quando non c'è vento per evitare la contaminazione delle colture vicine o quelle trattate. Controllare prima e dopo il trattamento il funzionamento dell'apparecchio irroratore facendolo funzionare con acqua.

Non trattare i mais da seme.

Se l'AGERPAX è usato in post-emergenza l'irrorazione deve coprire tutta la superficie del campo compresi i solchi di semina, ma senza toccare le foglie superiori e senza entrare nel cono del mais. Il getto della barra irroratrice deve essere inclinato di circa 45° rispetto al suolo per permettere di passare più facilmente sotto il cono e di avere, nonostante la limitata altezza (20 cm.) una superficie di lavoro sufficiente. Il trattamento deve essere eseguito nell'interfile con ugelli schermati, in modo da evitare l'irrorazione sulle foglie della coltura.

L'AGERPAX è assorbito in modo particolare dalle parti aeree delle foglie delle malerbe, pertanto effettuare una abbondante irrorazione per trattare tutta la vegetazione da distruggere.

Il trattamento deve essere effettuato a bassa pressione e la velocità di avanzamento medio deve essere di 4-5 Km/ora.

Dosi di impiego: Kg. 3-4/ha in terreni leggeri o scarsamente infestati; Kg. 5-6/ha in terreni duri o fortemente infestati. La quantità di acqua deve essere 800 litri/ha.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: Si consiglia di impiegare l'AGERPAX da solo. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Fitotossicità: Il prodotto è fitotossico per arboree, fruttiferi e viti e pertanto non contaminare tali colture. Le pompe e gli utensili impiegati per il diserbo non devono essere usati per altri trattamenti antiparassitari se non sono stati preventivamente lavati con acqua e soda.

Nocività. Il prodotto è nocivo per i pesci e pertanto non impiegarlo come diserbante acquatico e non contaminare fiumi, laghi e canali.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 30 giorni.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.

Via Nomentana, 299 - ROMA

Officine di produzione: ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - STABILIMENTO DI CARRARA AVENZA (MS)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 5

5623

EUPIR

AFICIDA SELETTIVO A RAPIDA AZIONE - ATTIVO ANCHE CONTRO GLI AFIDI RESISTENTI

Composizione: Gr. 100 di prodotto contengono:
— Pirimicarb puro . . . . . gr. 23,75
— Disperdenti e bagnanti . q.b. a gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: *Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterosi).*
Sintomi di intossicazione: *nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi e sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigenoterapia se vi è cianosi.*
Controindicazioni: *le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.*

CARATTERISTICHE: l'EUPIR è un aficida a base di Pirimicarb, adatto alla lotta contro tutte le specie di afidi, anche contro quelli resistenti agli esteri fosforici. E' a rapido effetto, ha una buona azione traslaminare (si trasferisce da una pagina all'altra della foglia) e fumigante, ma senza odori sgradevoli e colpisce anche gli afidi nascosti e protetti nelle foglie accartocciate.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: (per 100 litri di acqua)
Frutticoltura: melo, pero, pesco, albicocco, susino e agrumi. 100-150 gr.
Orticoltura: pomodoro, melanzana, peperone, patata, fave, fagioli. 100-150 gr.
Floricoltura (in serra e in pieno campo): 100-150 gr. contro tutte le specie di afidi e in particolare contro afide verde del pesco (Myzus persicae) afide farinoso del pesco e del susino (Ryalonterius pruni), afide nero della fava (Aphis Phalae). E' consigliabile distribuire non meno di 100 litri di soluzione per ettaro. Per ottenere i migliori risultati si raccomanda di curare molto bene l'irrorazione, cercando di bagnare anche la vegetazione nascosta. Si può impiegare qualsiasi irroratrice ma, in caso di atomizzazione si consiglia di impiegare la dose di 150 gr/hl di soluzione. Con macchine a spalla o a moto munite di lancia a mano si potranno impiegare 100 gr/hl nelle infestazioni normali e agli inizi della vegetazione, 150 gr/hl per forti infestazioni o con colture molto fitte.

NOTA BENE: quando si ricorre agli atomizzatori è consigliabile proteggersi il volto con una comune maschera.

DA NON USARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': l'EUPIR è compatibile con tutti gli anticrittogamici ed insetticidi di uso comune. Si consiglia però di eseguire una prova preventiva di miscelazione per accertare l'effettiva compatibilità dei coformulanti. Non è miscibile con arseniato di calcio, polisolfuri e poltiglia bordolese.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per gli insetti utili, è nocivo per gli animali domestici, per i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

EUROZOLFI S.p.A. - 14ª STRADA - ZONA INDUSTRIALE - 95030 CATANIA - Tel. (095) 592014

Officina di produzione: **SARIAF S.p.A.** - Via S. Silvestro, 1 - - FAENZA (RA)
Registrazione n. 5623 del 29.11.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

5624

LASSO® GD
27/8

Diserbante in pasta liquida selettivo per il mais, distrugge anche le infestanti resistenti e non lascia residui dannosi per le colture successive.

CARATTERISTICHE: il prodotto agisce sulla maggior parte delle infestanti annuali, provenienti da seme, sia a foglia larga che a foglia stretta, comprese Digitaria, Setarie e Giavone americano resistenti alle triazine. Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in via di germinazione.

COMPOSIZIONE

– Alaclor puro	g	27
– Atrazina pura	g	8
– Coadiuvanti, solventi: quanto basta a	g	100

(R) Marchio registrato MONSANTO Co.

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici e per l'Agricoltura Milano - SpA
Viale Gian Galeazzo, 3 Milano

Officina di produzione:
Salerano sul Lambro (MI)

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Registrazione n. ...... del .... Ministero della Sanità

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni mediche:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il diserbo si effettua su tutta la superficie del campo oppure in forma localizzata a bande larghe 20-25 cm. lungo le file; in questo ultimo caso la dose di impiego va rapportata alla effettiva superficie trattata.

- Preparare accuratamente il terreno affinché non rimangano zolle e zollette.
- Impiegare il prodotto subito dopo la semina o qualche giorno dopo, ma prima della nascita delle infestanti a dosi di 5-7 Kg/Ha; impiegare la dose più elevata quando predominano le infestanti resistenti alle Triazine.
- Diluire il prodotto in 4-5 o più ettolitri di acqua e distribuire la poltiglia uniformemente a mezzo delle comuni irroratrici a mano o meccaniche.
- Perché il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm. cada entro 2 settimane dal trattamento, altrimenti provvedere ad un'irrigazione a pioggia superficiale.
- Le eventuali sarchiature che vengono effettuate dopo il trattamento per rompere la crosta o per arieggiare il terreno, devono essere molto superficiali per non portare in superficie terreno con semi non contenente l'erbicida.

Preparazione della poltiglia: diluire in poca acqua a parte la prestabilita quantità di prodotto e versare nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Avvertenze: le coltivazioni di mais trattate con il prodotto non possono essere consociate ad altre colture. Non effettuare il diserbo nei terreni torbosi in quanto la sostanza organica decompone il prodotto e quindi ne riduce l'efficacia. Il letame eventualmente distribuito antesemina deve essere ben interrato per non ridurre l'azione del prodotto, tale azione viene pure ridotta od annullata dallo spargimento di liquame.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili, successive al mais, occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di 10 mesi per altre colture (es. bietola, tabacco). Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi. Si proceda ad una buona aratura prima della semina.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto si usa da solo.

Fitotossicità: evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine perché fitotossico. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione prima di utilizzarli per altri trattamenti.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5626

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

COPERAL FB

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8,4 di Cimoxanil puro
Gr. 63,99 di Folpet puro.
Sostanze inerti q.b. a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali, bruciori gastro-esofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardio-circolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia: lavanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro d'acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

Il **COPERAL FB** è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.
Agisce sia penentrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.
Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

ANTIPARASSIDARI B.P.D.
BIOCHIMICI PESTICIDI DISERBANTI S.p.A.
Direzione: 00195 - ROMA
Via Rodi, 24 - Tel. 35.80.404/5
Stabilimento: Ravit Quassolo (TO)

Reg. n. ...... Ministero della Sanità del ......

2 83

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150 gr. di prodotto ogni 100 lt. di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.

Peronospora della patata e del pomodoro: usare 150 gr. di prodotto per 100 lt. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri, e olio bianco. I trattamenti devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e polisolfuri.

Avvertenze: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili e per i pesci.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola, patata, pomodoro, e 40 giorni sulle uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto netto kg.

5627

Caratteristiche: insetticida citotropico ad azione per contatto ed ingestione.

Parassiti combattuti: afidi, psille, cicaline, larve di lepidotteri in genere (ad esempio tignole, minatrici, ricamatrici, nottue), larve ed adulti di coleotteri (ad esempio cleono, lixus, altica, maggiolino, apion, meligete, dorifora), larve ed adulti di ditteri, cocciniglie.

Colture protette e dosi d'impiego:

Vite	gr. 200-250/hl
Olivo	gr. 300/hl
Pomacee (melo, pero)	gr. 250-300/hl
Drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo) trattare solo prima della ripresa vegetativa	gr. 250-300/hl
Agrumi (arancio, mandarancio, limone, pompelmo, mandarino)	gr. 250-300/hl
Barbabietola da zucchero	gr. 300/hl = Kg. 2-2,5/Ha
Colture ortive (patata, pomodoro, carciofo, asparago)	gr. 250/hl

Epoche d'impiego: alla prima comparsa dei parassiti e ad ogni eventuale reinfestazione.
Sulle drupacee il prodotto deve essere usato solo per trattamenti invernali e di fine inverno, comunque prima dell'apertura delle gemme.

Modalità d'impiego: bagnare abbondantemente ed uniformemente tutte le parti della vegetazione da proteggere avendo cura di raggiungere con il getto irrorante anche gli insetti più nascosti nella chioma.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina. **AVVERTENZA**: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività a seguito del trattamento: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PLANIZIN® 20 L.E.

INSETTICIDA FOSFORGANICO POLIVALENTE

I CLASSE

Composizione:

METHIDATHION puro . . . . gr. 19

Coformulanti . . . . . . q.b. a gr. 100

• Contiene xilolo •

VELENO

ATTENZIONE! data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3-8-1968 N. 1255

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Registrazione N.
del
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
SILIA S.p.A. - Aprilia (Latina)
su formula e procedimento originale della
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.

Conservare il prodotto chiuso
nel contenitore originale,
in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici ● Conservare la confezione ben chiusa ● Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto ● Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua ● Evitare di respirarne i vapori ● Non operare contro vento ● Evitare il contatto con la pelle e gli occhi ● Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi ● Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone ● Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più d'un metro e cospargendo di calce viva) ● In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi d'intossicazione: *lacrimazione - miosi - scialorrea - vomito - dolori addominali - diarrea - spasmi bronchiali - dispnea - bradicardia - ipotensione - fibrillazioni muscolari - convulsioni - edema polmonare.*
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: *In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale, controllata od assistita ed ossigenoterapia.* **Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.** *Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti e 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossima metilsolfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo, lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.*
Controindicazioni: *morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.*

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 10

5629

Caratteristiche: acaricida uovo-larvo-adulticida persistente ad azione per contatto ed ingestione.

Parassiti combattuti: uova, larve ed adulti di acari (ragni rossi, gialli, eriofidi, tarsonemidi).

Colture protette e dosi d'impiego:

Vite	gr. 150-200/hl
Melo	gr. 150-200/hl
Pesco	gr. 150-200/hl
Agrumi (arancio, mandarancio, limone, pompelmo, mandarino)	gr. 130-150/hl
Pomodoro, peperone, melanzana	gr. 150-200/hl
Colture industriali di piante ornamentali e da fiore	gr. 100-200/hl

Epoche d'impiego: in primavera-estate, alla prima comparsa dei parassiti.

Modalità d'impiego: versare la dose stabilita di MITAN nel totale quantitativo d'acqua, agitare energicamente e distribuire la miscela così ottenuta uniformemente ed in abbondanza su tutte le superfici vegetali da proteggere.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: Il MITAN è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari ad eccezione di quelli a reazione alcalina e degli olii minerali. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Il prodotto è fitotossico su fragola, rosa, pero; sulla vite il prodotto è fitotossico prima della fioritura. Sulle colture ortive, da fiore ed ornamentali, dato l'elevato numero di varietà, eseguire un trattamento di prova su poche piante prima di trattare l'intera coltivazione.

Nocività a seguito del trattamento: Il prodotto è tossico per i pesci: non contaminare corsi o specchi d'acqua.

Sospendere i trattamenti 15 GIORNI prima del raccolto

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

MITAN®

ACARICIDA

III CLASSE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione:

BENZOMATE puro		gr. 15
PROPARGYL puro		gr. 30
Coformulanti	q.b. a	gr. 100

• Contiene XILOLO •

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61 - 79.94.62
Telex 511046

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione N.
del
del Ministero della Sanità

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NATURA DEL RISCHIO: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Conservare la confezione ben chiusa • Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Non operare contro vento • Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

VERCHIM ASTERIAS

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg.1

5630

ANTICASCOLA L

Fitormone liquido per mele e pere

COMPOSIZIONE:

NAA puro	gr. 2,45
Diluenti e disperdenti q.b. a .	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:

L'ANTICASCOLA L è un fitoregolatore in formulazione liquida appositamente studiato per prevenire la cascola prematura delle mele e pere. In condizioni ottimali di temperatura ed umidità manifesta la sua azione entro poche ore dal suo impiego.

MODALITA' D'IMPIEGO:

Pero - - Varietà precoci: 70 cc. per 100 litri di acqua, 7 giorni prima della raccolta.
Varietà estive 80 cc. per 100 litri d'acqua, 7-10 giorni prima della raccolta.
Varietà autunnali 100 cc. per 100 litri d'acqua, 10 giorni prima della raccolta.
Varietà invernali 100-130 cc. per 100 litri d'acqua, 1° trattamento fine agosto, 2° trattamento dopo 15 giorni circa.

Melo - Varietà precocissime: 40-60 cc. per 100 litri di acqua, 8-15 giorni prima della raccolta.
Varietà precoci 60-70 cc. per 100 litri d'acqua, 10-18 giorni prima della raccolta.
Varietà normali 70-85 cc. per 100 litri d'acqua, 10-20 giorni prima della raccolta.
Varietà tardive 85-100 cc. per 100 litri d'acqua, 10-20 giorni prima della raccolta.
Irrorare la vegetazione preferibilmente verso sera bagnando uniformemente l'intera chioma delle piante.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA':

Da non miscelare con altri antiparassitari.
Sospendere i trattamenti almeno 5 giorni prima della raccolta.
« Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso ».
« Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato ».
« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

AGRIMARK s.a.s.
Via S. Carlo, 2132 - Medicina (Bo)

Officina di produzione: BIOLCHIM S.r.l. Medicina (Bo)

Reg. Ministero Sanità n. .... del ....

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso netto Kg. 0,500**

5631

FUNGIL®

FUNGICIDA SISTEMICO POLIVALENTE

Composizione: **IV CLASSE**

BENOMYL puro . . gr. 50

Coformulanti . . . . q.b. a gr. 100

Tipo di formulazione: polvere bagnabile

CARATTERISTICHE: fungicida sistemico polivalente ad azione preventiva, curativa ed eradicante contro malattie crittogamiche dei fruttiferi, della vite, del frumento e delle colture ornamentali. E' pure efficace per la difesa delle malattie della frutta in genere.

COLTURE PROTETTE, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO:

VITE:

Botrytis: usare gr. 60/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti subito prima della fioritura per le varietà sensibili alla Botrytis del peduncolo od in caso di andamento stagionale piovoso, oppure subito dopo la fioritura. Effettuare 5 o 6 trattamenti fino non oltre 15 giorni dalla raccolta. Usare non meno di 1.500 lt d'acqua/Ha, bagnando accuratamente i grappoli. Il FUNGIL non ha effetti nocivi sulla fermentazione.

Oidio: usare gr. 60/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti nella fase di gemma mossa a 3-4 cm e continuare per tutta la stagione secondo il normale calendario antioidico.

MELO, PERO:

Ticchiolatura ed Oidio: usare gr. 45-60/hl d'acqua ad intervalli fissi, iniziando all'apparizione dei mazzetti fiorali. Alla dose superiore il FUNGIL svolge azione curativa ed eradicante contro la ticchiolatura. Si consiglia l'associazione con Mancozeb 80% gr. 150, Dodina gr. 60 o Captano gr. 150 per ogni 100 litri d'acqua.

Gloeosporium: usare gr. 60/hl d'acqua in un unico trattamento pre-raccolta, all'inizio di settembre. Nel caso di varietà particolarmente sensibili, si consiglia di aumentare la dose a gr. 100/hl d'acqua.

PESCHE, SUSINE, ALBICOCCHE:

Moniliosi, Ticchiolatura e Oidio: usare gr. 60/hl d'acqua. Trattare prima e dopo la fioritura. Ripetere se necessario prima della raccolta (questo trattamento è indicato soprattutto per prevenire le malattie da conservazione (Botrytis e Monilia) sulle pesche da industria). Per la Ticchiolatura e l'Oidio continuare i trattamenti secondo le condizioni atmosferiche.

ROSE:

Oidio e «Blak Spot»: usare gr. 60-80/hl d'acqua. Iniziare i trattamenti ai primi sintomi della malattia e ripeterli ogni 7-12 giorni. Usare la dose più alta e l'intervallo più ravvicinato in caso di andamento stagionale sfavorevole.

BULBI (Tulipani, Gladioli, Gigli, Fresie):

Marciumi da Fusarium, Botrytis, Penicillium, Sclerotinia: immergere i bulbi per la durata di 15-20 minuti in una soluzione di gr. 200 di FUNGIL per 100 lt di acqua.

GAROFANO:

Phialophora Cinerascens: effettuare un trattamento al terreno con gr. 0,5-1 di FUNGIL in 10 lt d'acqua/mq. Ripetere le applicazioni ogni 15 giorni per la durata del ciclo vegetativo come trattamento preventivo. In caso di infezione già in atto, effettuare al primo apparire della malattia un trattamento al terreno con gr. 4 di FUNGIL in 10 lt d'acqua/mq facendolo seguire da trattamenti ogni 15 giorni con la dose di gr. 0,5-1 in 10 lt d'acqua/mq.

Fusarium: gr. 2/mq. di FUNGIL con le stesse modalità applicative descritte per la Phialophora.

CRISANTEMO:

Botrytis e Septoria: gr. 60/hl di FUNGIL. Effettuare trattamenti ogni 15 giorni sulla vegetazione.

Tracheomicosi (Verticillosi e Fusariosi): gr. 2-3/mq di FUNGIL. Innaffiare il terreno 3 settimane dopo l'impianto, effettuando 2-3 trattamenti alla cadenza di 10-15 giorni.

FRUMENTO:

Oidio, Mal del Piede, Septoriosi, Fusariosi: Irrorare la coltura con gr. 400-500/Ha di FUNGIL distribuiti con 5-8 hl d'acqua intervenendo all'inizio della levata e all'apparizione della spiga. Per aumentare la polivalenza d'azione, in particolare contro la Ruggine, si consiglia l'aggiunta di Kg. 2/Ha di Maneb o Mancozeb.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Per la preparazione della poltiglia, formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di FUNGIL in poca acqua, indi portare a volume aggiungendo la rimanente acqua, tenendo la miscela in costante agitazione. Fatta eccezione per il Melo, si consiglia l'aggiunta di un bagnante per i trattamenti a pianta di difficile bagnatura.

AVVERTENZA: l'impiego del prodotto è consentito solo in campo e per le colture indicate in etichetta.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: il prodotto è compatibile con i più comuni antiparassitari. **AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 60 GIORNI prima del raccolto per il frumento e 15 GIORNI prima per le altre colture.

ATTENZIONE: non lasciare che il FUNGIL diventi umido durante l'immagazzinamento: ciò può provocare alcune trasformazioni chimiche che riducono l'efficacia fungicida del prodotto. Tenere la confezione ben chiusa quando il prodotto non è impiegato. Bruciare la confezione dopo l'uso.

Se il trattamento con il FUNGIL, effettuato secondo le istruzioni riportate in etichetta, non è efficace, può essere che ci si trovi in presenza di un ceppo di fungo resistente. L'impiego immediato di altro fungicida adeguato è consigliabile.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

VERCHIM ASTERIAS S.p.A. Fitofarmaci
Via Tolara di Sotto, 85
40064 OZZANO EMILIA
(Bologna)
Tel. 79.94.61/2 - Telex 511046

Registrazione N.
del
del Ministero della Sanità

Stabilimento produttore:
VERCHIM ASTERIAS S.p.A.
OZZANO EMILIA (Bologna)

Conservare il prodotto chiuso nel contenitore originale, in luogo asciutto e fresco.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici • Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua • Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

VERCHIM ASTERIAS

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

5632

I CLASSE

FENODRIN

VELENO

Questo prodotto associa la nota azione insetticida del piretroide **fenvalerate** (Sumicidin), che agisce per contatto ed ingestione, a quella del fosforganico **monocrotofos** (Azodrin) dotato di azione insetticida ed acaricida ed attivo anche per via citotropica.
Il FENODRIN appare particolarmente utile per queste diverse proprietà dei suoi componenti nella lotta contro insetti difficili da combattere, senza che si instauri una insorgenza successiva di acari.

COMPOSIZIONE

pp.aa.:

— fenvalerate, p.a. puro		g 3,0
— monocrotofos, p.a. puro		g 13,0
— coadiuvanti e solventi	q.b. a	g 100,0

CONTIENE XILOLO

FENODRIN è un marchio Shell
AZODRIN è un marchio Shell
SUMICIDIN è un marchio registrato dalla SUMITOMO CHEMICAL CO Ltd Osaka (Giappone)

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'Art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici;
- Conservare la confezione ben chiusa;
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- Evitare di respirarne i vapori;
- Non operare contro vento;
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi;
- Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- Rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per es. interrandole in fosse profonde più di 1 metro e cospargendo con calce viva);
- In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;
- In caso di contaminazione degli indumenti togliere immediatamente quelli molto contaminati, lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- Lavare accuratamente i guanti dopo l'impiego, specialmente l'interno;
- Non immagazzinare per lunghi periodi a temperatura inferiore a 5°C o superiore a 30°C.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione, contatto cutaneo

Sintomi di intossicazione:

Sintomi immediati (entro 30-60 minuti): sudorazione, scialorrea, lacrimazione, astenia, vertigini, miosi, spasmo dell'accomodazione, dolori addominali, vomito, diarrea, bradicardia, ipotensione, dispnea, tremori, convulsioni, angoscia.

Sintomi successivi: midriasi, tachicardia, ipertensione, edema polmonare, coma. Nelle forme da contatto cutaneo molto frequente la paralisi dei muscoli respiratori.

Consigli terapeutici

Trattare dispnea e cianosi con ossigenoterapia mediante respirazione artificiale controllata o assistita. Mantenere pervie le vie respiratorie. Somministrare il più presto possibile, e per via endovenosa, l'antidoto solfato di atropina (2-4 mg per gli adulti e 0,04-0,08 mg/kg per i bambini) ogni 3-10 minuti sino alla comparsa di segni di atropinizzazione (regolarizzazione del diametro pupillare, cessazione dell'ipersecrezione congiuntivale e nasale ecc.). L'atropina non deve essere usata finchè è presente la cianosi. Se l'atropina viene somministrata per via intramuscolare è facile provocare sovradosaggi (l'antidoto di elezione della atropina è l'isostigmina salicilato). Se disponibile, associare pralidossima-metil-solfato (Contrathion): 400 mg - 1 g endovena, lentamente; se necessario ripetere 200 mg dopo 30 minuti, e poi ogni 6 ore, fino ad un massimo di 1-2 g nelle 24 ore. Per sedare il paziente e/o trattare le convulsioni: benzodiazepine per via endovenosa. In caso di ingestione: somministrare soluzione di sodio bicarbonato al 3%-5% e provocare il vomito o procedere a lavanda gastrica con la stessa soluzione (il vomito e la lavanda gastrica sono controindicati se il paziente è in stato di incoscienza). In caso di contatto cutaneo: allontanare gli abiti, lavare con abbondante acqua e sapone o soluzione al 5% di sodio bicarbonato e, se necessario, ricorrere alle stesse misure terapeutiche. Telefonare ad un Centro Antiveleni e trasferire il più rapidamente possibile il paziente in un ospedale provvisto di centro di rianimazione.

Controindicazioni: morfina ed altri oppioidi, teofillinici, nikotamide, latte, olio

SHELL ITALIA S.p.A.
Via Londonio, 2 - 20154 MILANO

Stabilimento:

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5632 del 16-12-83

MODALITA' DI IMPIEGO

Il modo specifico di azione per contatto ed ingestione e per via citotropica prevede che le irrorazioni siano effettuate con cura per bagnare bene le parti vegetative della coltura infestata.

Dosi di applicazione

Colture	Parassiti combattuti	Dosi di impiego (cc per 100 litri d'acqua di soluzione)
Pesco	Afide verde (*Myzus persicae*)	50
	Nota - applicazioni all'inizio delle infestazioni quando le foglie non sono accartocciate	
	Tignola orientale (*Grapholita molesta*)	75-100
Pero	Psilla (*Psylla piri*)	300-400
Melo	Carpocapsa (*Carpocapsa pomonella*)	100
Arancio	Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*)	50
	Ceroplaste (*Ceroplastes rusci*)	50
	Aleurode (*Dialeurodes citri*)	200
Vite	Tignole (*Lobesia botrana, Clysia ambiguella*)	50-75

Modalità di applicazione

Diluire la quantità precisata occorrente di Fenodrin in poca acqua, e, agitando continuamente, aggiungere la restante quantità d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il FENODRIN è compatibile con i normali antiparassitari usati per impieghi contro altri parassiti eventualmente presenti sulla vegetazione delle colture citate; non deve però essere miscelato con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Non impiegare su varietà di melo del gruppo Red Delicious.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci, gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti:
- 75 giorni, prima della raccolta degli aranci
- 30 giorni, prima della raccolta delle altre colture indicate in etichetta.

«**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso».
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
«Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali».

«DA NON VENDERSI SFUSO»

Contenuto:

5633

III CLASSE TOSSICOLOGICA

ATTENZIONE
MANIPOLARE
CON PRUDENZA

VITAL M

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
gr. 8 di Cimoxanil puro
gr. 68,6 di Mancozeb puro
Sostanze inerti q.b. a 100

Natura del rischio
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
— Conservare la confezione ben chiusa.
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
— Non operare contro vento.
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— *una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto;*
— *conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore;*
— *in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta;*
— *durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).*

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione
L'ingestione provoca nausea, conati di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia
In caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per l'irritazione della cute e delle mucose: lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicazioni
Alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
V.le degli Ammiragli, 91 - Tel. 63.78.041 (5 linee)
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
Stabilimento: Paganica (Aq)

Reg. n. [illegible] **del Ministero della Sanità del** [illegible]

3/ 82

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la Peronospora della vite e del pomodoro.
Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo che le zoospore germinanti. Sulla vite può essere usato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
I trattamenti devono essere iniziati quando la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguiti fino a che persistono le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Peronospora del pomodoro, solo fino alla prima fioritura: usare 150-160 gr. di prodotto ogni 100 litri di acqua.
Usare la dose di 200 gr. ogni 100 litri di acqua in presenza di attacchi di Peronospora e di Alternaria.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua: indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

Da non applicare con mezzi aerei
Non impiegare in serra
Non impiegare su colture diverse da quelle indicate

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con Benlate, Dacostar, Dithane M 45, Karathane PB, Karathane LC, Rovral, Sofril 80, Azifene, Dafene, Fosfene, Lannate 25, Lannate L, Lorzene Flow, Motilon 20, Naftil Micronizzato, Parafene Rosso, Spintox, Sumifene 50 E, Zitiol E, Zolone P.B. 25, Zolone Liquido 25, Folgreen L.
Avvertenza:
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg.

5634

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

SIMAVIT P.B.

Erbicida di pre-emergenza delle infestanti per colture di vite, melo, pero, agrumi, olivo, asparago e rose in pieno campo
Polvere Bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono
Gr. 50 di Simazina pura
Coformulanti q.b. a 100

Norme precauzionali:

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il SIMAVIT P.B. è un diserbante selettivo per colture di vite, melo, pero, agrumi, olivo, asparago e rose in pieno campo contro le infestanti annuali.

Agisce per assorbimento radicale.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

Vite, melo, pero, agrumi, olivo

Il trattamento deve essere effettuato prima dell'emergenza delle infestanti, alla fine dell'inverno, dopo le consuete lavorazioni, su terreno ben preparato, sminuzzato, pulito da infestanti e umido, alla dose per ettaro di:

— terreni leggeri: kg. 3;
— terreni di medio impasto: kg. 4,5;
— terreni pesanti: kg. 6; distribuiti in 500-1.000 litri d'acqua.

Sul pero innestato su cotogno non superare la dose di kg. 4/ha.

Asparago (di almeno 3 anni)

Effettuare il trattamento in primavera, subito dopo la rincalzatura, prima che emergano i turioni, alla dose di kg. 4/ha., oppure dopo la raccolta dei turioni, su terreno privo di infestanti alla dose di kg. 2/ha.

Rose in pieno campo (di almeno 3 anni)

Si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici prima di effettuare l'applicazione.

Trattare in primavera dopo la lavorazione del terreno, in pre-emergenza delle infestanti, alla dose di kg. 3-4/ha.

La dose bassa è indicata per i terreni leggeri.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Diluire la dose di prodotto in poca acqua; versare nell'irroratrice e portare a volume agitando.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture successive a quelle indicate in etichetta occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.

Trattare in assenza di vento per evitare che l'erbicida venga trasportato su colture vicine.

AVVERTENZE

— Non impiegare il prodotto sui terreni torbosi perché viene da essi inattivato.
— Non trattare su terreni siccitosi perché il prodotto non esplica la sua attività.
— Dopo il trattamento si consiglia di non lavorare il terreno.
— Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione:

Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40136 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.: Paganica (L'Aquila)

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. .... Ministero della Sanità del

Peso netto kg.

12 / 1982

5635

® PROCIBELLINNE

fitoregolatore in polvere cristallina idrosolubile

COMPOSIZIONE: acido gibberellico puro g 9,45, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

- conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- non contaminare alimenti, bevande e corsi d'acqua;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847

Officina di formulazione PROCIDA S.A.
Saint-Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
Officina di confezionamento SICOPA Snc
Pianello Val Tidone (PC)

Registrazione n. 5635 **del** 28-12-83 **del Ministero della Sanità**

® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

PROCIBELLINNE è facilmente solubile in acqua. Si consiglia di sciogliere accuratamente il prodotto in poca acqua e versare quindi la soluzione ottenuta nel serbatoio della pompa, portando poi a volume.
Consigliamo di aggiungere sempre un bagnante non ionico (10-20 cc/hl di Bagnante Adesivo Emelfa) e di bagnare molto accuratamente tutta la vegetazione.
PROCIBELLINNE è un ormone che influenza positivamente la vegetazione e quindi occorre sempre concimare od irrigare adeguatamente i vegetali trattati. Particolarmente consigliabili sono le concimazioni con nitrato di potassio.

CARATTERISTICHE: PROCIBELLINNE è un fitoregolatore a base di acido gibberellico, un regolatore di crescita presente naturalmente nei vegetali.
PROCIBELLINNE ha numerosi impieghi quali aumentare l'allegagione, anticipare la produzione, uniformare la pezzatura dei frutti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': PROCIBELLINNE è miscibile con fertilizzanti fogliari. Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI ACCLUSO.

1.483 **6 g**

® PROCIBELLINNE

FITOREGOLATORE IN POLVERE CRISTALLINA IDROSOLUBILE

COMPOSIZIONE: acido gibberellico puro g 9,45, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE IV

NORME PRECAUZIONALI

- conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

FRUTTICOLTURA:

Clementini: 10-15 g/hl d'acqua da distribuire in piena fioritura, impiegando circa 7 litri di miscela per albero.
Se durante il previsto periodo di trattamento piovesse, ritardare il trattamento stesso di 48 ore. Impiegando PROCIBELLINNE si assicura migliore allegagione e riduzione della cascola con aumento di rendimento talvolta considerevole, azione favorevole sull'uniformità della qualità e della pezzatura dei frutti, nessun inconveniente anche dopo numerosi trattamenti.
Si consiglia di:
- irrorare la soluzione molto finemente;
- trattare preferibilmente alberi in buono stato e ben vigorosi;
- evitare scompensi idrici, assicurando una buona irrigazione;
- effettuare concimazioni supplementari, aumentando di 1/3 le dosi della concimazione di base (evitando ogni concimazione al terreno tra il trattamento ed il periodo della cascola).

E' inoltre raccomandabile effettuare una concimazione fogliare con nitrato di potassio al 2% (distribuendo 20 l di soluzione per albero) in piena fioritura (2-3 giorni dopo il trattamento con PROCIBELLINNE) e 15-20 giorni dopo la prima applicazione.
Aranci «Navel» e Clementini: 10 g/hl d'acqua da distribuirsi impiegando circa 10 litri di miscela per albero.
Per ottenere i migliori risultati occorre intervenire imperativamente nel periodo in cui i frutti presentano il colore «commerciale». Non trattare assolutamente al di fuori di tale periodo.
PROCIBELLINNE consente così di ritardare la raccolta mantenendo i frutti sull'albero senza che la qualità possa in alcun modo risentirne.
Limone: 10 g/hl d'acqua, per aumentare le dimensioni dei frutti e mantenerli più a lungo verdi, dilazionando così la raccolta. Il trattamento deve essere effettuato prima della invaiatura, ossia prima che i frutti da verdi inizino a divenire gialli.
Pero: 10-20 g/hl d'acqua, all'inizio della fioritura, così da aumentare la produzione delle varietà a difficile impollinazione quali: William, Giffard, Passacrassana, Trionfo di Vienna, Spadona, Gentilona, Spadoncina, Buona Luisa d'Avranches, Favorita di Clapp, Butirra Hardy, Conférence, Trevoux. Assicurarsi che la miscela venga distribuita con una irrorazione molto fine ed omogenea.
PROCIBELLINNE consente inoltre su tutte le varietà di ridurre i danni delle gelate durante la fioritura. L'intervento deve avvenire entro 48 ore dalla gelata nelle ore più calde, impiegando 15-25 g/hl d'acqua.

ORTICOLTURA

Carciofo: 15-20 g/hl d'acqua, alla quarta-sesta foglia per carciofaie di più di un anno e alla ottava-dodicesima foglia per carciofaie di un anno. Per ottenere i migliori risultati occorre eseguire altri due trattamenti con 10-15 g/hl, intervallati di 15-20 giorni. E' possibile in tal modo incrementare e anticipare la produzione. E' indispensabile irrigare abbondantemente prima o subito dopo il trattamento ed aumentare del 30% la concimazione. Effettuare l'irrorazione di preferenza nel tardo pomeriggio, evitando comunque le ore calde.
Patate: per interrompere la quiescenza dei tuberi, stimolare la crescita dei germogli ed uniformare la pezzatura:
- Tuberi tagliati: immergerli per 10 minuti in una soluzione contenente 1 g di PROCIBELLINNE/hl d'acqua.
- Tuberi interi: immergerli per 10 minuti in una soluzione contenente 5 g di PROCIBELLINNE/hl d'acqua.

Fragola: 25-40 g/hl d'acqua, 4-6 settimane prima della fioritura, per anticipare la produzione. Rispondono positivamente: Gorella, Pocahontas, Red Gauntlet, Cambridge Favourite, Surprise des Halles.
VITE: 10-20 g/hl d'acqua, distribuendo 300-1000 litri di acqua per ettaro, secondo lo sviluppo vegetativo delle viti, ad epoche diverse secondo il risultato che si vuole ottenere.
PROCIBELLINNE previene l'acinellatura e provoca l'allungamento del rachide permettendo di ottenere un grappolo meno serrato: consente così una lotta indiretta alla Botrytis.
Sensibili all'azione di PROCIBELLINNE sono le seguenti cultivars: Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Regina delle Puglie, Regina d'Abruzzo, Pergolone, Lambrusco, Cardinal, Primus, Regina di Firenze; mediamente sensibili: Italia e Taranto.

L'acido gibberellico può dare risultati diversi a secondo dell'epoca d'impiego ed in rapporto allo stadio vegetativo. Sembra tuttavia di doverne escludere l'impiego durante la piena fioritura. Non è ancora ben noto se siano preferibili i trattamenti subito prima o subito dopo la fioritura. Sappiamo per ora che l'applicazione all'inizio della fioritura ha un effetto positivo sulla precocità, mentre quella a fine fioritura influisce sull'ingrossamento uniforme degli acini. Se le piante sono carenti di sostanze nutritive e quindi con scarso vigore, non sempre reagiscono allo stimolo del fitormone.
Si consiglia quindi di operare su piante vigorose o comunque concimate ed irrigate.
L'azione di PROCIBELLINNE sarà ridotta se applicata in periodo freddo o troppo caldo.

COLTURE FLOREALI: 10-20 g/hl d'acqua.

Molte colture da fiore reagiscono favorevolmente all'azione di PROCIBELLINNE con anticipo ed aumento della fioritura e molte volte portando alla formazione di fiori più grossi.
I trattamenti a dosi basse possono essere ripetuti a distanza di 20-30 giorni, iniziando dalla comparsa dei primi boccioli. Risultati positivi si sono ottenuti su: Ortensie, Ciclamini, Cactus, Anemoni, Crisantemi.
PROCIBELLINNE è facilmente solubile in acqua. Si consiglia di sciogliere accuratamente il prodotto in poca acqua e versare quindi la soluzione ottenuta nel serbatoio della pompa portando poi a volume.
Consigliamo di aggiungere sempre un bagnante non ionico (10-20 cc/hl di Bagnante Adesivo Emelfa) e di bagnare molto accuratamente tutta la vegetazione.
PROCIBELLINNE è un ormone che influenza positivamente la vegetazione e quindi occorre sempre concimare ed irrigare adeguatamente i vegetali trattati. Particolarmente consigliabili sono le concimazioni con nitrato di potassio.

CARATTERISTICHE

PROCIBELLINNE è un fitoregolatore a base di acido gibberellico, un regolatore di crescita presente naturalmente nei vegetali.
PROCIBELLINNE ha numerosi impieghi quali aumentare l'allegagione, anticipare la produzione, uniformare la pezzatura dei frutti.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITA'

PROCIBELLINNE è miscibile con fertilizzanti fogliari. Non si consiglia la miscela con antiparassitari.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO.

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA NELLE EPOCHE E PER GLI USI CONSENTITI: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

1.483

20100 Milano - Casella Postale 1847

Officina di formulazione PROCIDA S.A.
Saint-Marcel - 13367 Marsiglia (Francia)
Officina di confezionamento SICOPA Snc
Pianello Val Tidone (PC)

Registrazione n. **del** **del Ministero della Sanità**

® Marchio registrato della Procida S.A. - Marsiglia

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s. Meno

5636

AGER ACAR KT 18 L

Acaricida selettivo ad azione immediata e di lunga persistenza

COMPOSIZIONE: gr. 100 di prodotto contengono:

DICOFOL puro . . .	gr 18
Coadiuvanti ed inerti q.b. a . . .	gr. 100

« Contiene metil-glicole e cicloesanone »

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del preparato. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare controvento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi d'intossicazione: vomito, diarrea, parestesie diffuse, cefalea, vertigini, astenia intensa, convulsioni.

Consigli terapeutici: intossicazione acuta, lavando gastrica abbondante - somministrazione di purganti salini (g 25 di solfato di sodio). Per la liposubilità di questi insetticidi hanno controindicazione assoluta il latte, l'olio di ricino, i grassi in genere perché aggraverebbero la situazione facilitando l'assorbimento del tossico. Barbiturici (luminal 0,1-0,2 g) contro i tremori e le contrazioni muscolari fleboclisi di soluzione fisiologica contro l'ipocloremia. Dieta privo di grassi per lungo tempo fino ad eliminazione completa del tossico.

Controindicazioni: la morfina e l'alcool e, per evitare la fibrillazione ventricolare, l'adrenalina, l'efedrina.

L'AGER ACAR KT 18 L è efficace nel controllo di vari acari che attaccano i fruttiferi e le colture agrarie in genere. Esso ha potere abbattente ed un lungo effetto residuo. L'AGER ACAR KT 18 L è un acaricida selettivo che rispetta la maggior parte dei predatori degli acari. E' efficace contro tutti i ragnetti rossi, gialli, allungati. Possiede azione citotropica che gli consente di agire anche su acari situati nelle pagine inferiori delle foglie; esso trova impiego in frutticoltura (meli, peri, peschi, albicocchi, susini, ciliegi) in agrumicoltura (aranci, mandarini, mandaranci, limoni) in floricoltura in pieno campo (rose, azalee, garofano, astri, ciclamini, crisantemi) in orticoltura (fragole, pomodoro, lattuga, cetriolo, melone, patata, carciofo, cipolla e cavolo).

DOSI DI IMPIEGO PER 100 LT. DI ACQUA:

All'inizio della stagione per controllare gli acari gr. 150-250 (trattare prima e dopo la fioritura) quando la maggior parte delle uova si sono schiuse e gli acari diventano numerosi. Trattare accuratamente le piante in modo da assicurarsi una completa copertura a tutte le foglie.
Sugli alberi che non portano frutta usare la stessa dose facendo numerose irrorazioni quando gli acari diventano numerosi.
Piante ornamenatli in pieno campo: per il controllo degli acari sulle rose, azalee, astri, ciclamini, crisantemi, garofani usare gr. 150-200.
In caso di forti infestazioni si consiglia di ricorrere a due trattamenti distanziati di 4-5 giorni con l'impiego delle dosi massime indicate.

Modalità d'impiego: versare la dose necessaria di prodotto in poca acqua e mescolare bene. Aggiungere poi la mscela ottenuta alla rimanente quantità di acqua continuando a mescolare.

Compatibilità: L'AGER ACAR KT 18 L è miscibile con la maggior parte degli insetticidi e fungicidi e può essere usato solo o in combinazione con Parthane, Parathion, Malathion, Toxafene, Captan, Karatane, Zolfo ed olii.
Non deve essere usato con materiali fortemente alcalini come calce e polisolfuro di calcio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto è fitotossico per la melanzana.
Il prodotto è tossico per gli insetti utili.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 15 GIORNI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per evitare danni alle persone, alle cose ed agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.
Via Nomentana, 299 - ROMA

Officina di Produzione: ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA AVENZA (MS)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO

5637

DELTAMAL

Concentrato emulsionabile insetticida

Composizione	
MA[illegible]	g 54,5
Emulsion anti e [illegible]	g 100
Contiene XILOLO	

C L A S S E I I I

A[illegible]ENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDEN[illegible]A

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa, per ingestione per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali [illegible] prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici [illegible] ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare [illegible] e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronch[illegible]li, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionali al caso: in caso sia evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata, o assistita e ossigenoterapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg. per gli adulti; 0,2-1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa dei fenomeni di spic[illegible]ata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere contin[illegible]ata per 24-48 ore.
Associare pralidossin[illegible] metil solfato Contrathion) somministrata per iniezione [illegible]ndovenosa le[illegible]a.
Non somimnistrare [illegible]tropina finché [illegible] presente la cianosi.
Se vi è stato contat[illegible] cutaneo lav[illegible] la cute con sapone e soluzioni acquos[illegible] d[illegible] bicarbona[illegible] d[illegible] sodio.

Controindicazioni: m[illegible]rfina, teofilli[illegible] aminofillina, coramina, latte, olio e gra[illegible]si

Modalità d'impiego: insetticida emulsionabile che agisce per ingestione, contatto ed asfissia. Il [illegible]ELTAMAL si impiega sulle seguenti colture:

AGRUMI: contro afidi.
POMACEE: contro afidi, antonomi e tingidi
DRUPACEE: contro afidi
VITE: contro afidi, tignola, tingidi
OLIVO: contro la mosca
FRAGOLA: contro afidi e tripidi
CAVOLI E CARCIOFI: contro afidi
ORTAGGI A FOGLIA (insalata, sedano e prezzemolo): contro afidi
ORTAGGI A FRUTTO (cucurbitacee, solanacee, legumi): contro afidi
ORTAGGI A RADICE (carote): contro afidi
CEREALI (frumento e mais): contro afidi
PIANTE FLOREALI ED ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO: contro afidi

Dosi di impiego: g. 100-200 per 100 litri di acqua. Versare la dose di prodotto in poca acqua e mescolare[illegible].
Aggiungere la rimanente quantità di acqua sempre continuando a mescolare.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è compatibile con tutti i comuni fitofarmaci fatta eccezione per quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Non trattare pertanto durante la fioritura e non far pascolare e non alimentare il bestiame con prodotti trattati direttamente o accidentalmente prima che siano passati almeno 20 giorni dal trattamento.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DELTA s.r.l.
Via Aurelio Saffi, 15 - MILANO

Officina di produzione: SARIAF S.p.A. - FAENZA (Ravenna)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5637 del 28.12.83

DA NON VENDERSI SFUSO

5638

DELTAQUAT

Diserbante disseccante liquido

Composizione:
PARAQUAT puro (sotto forma di cloruro) . g. 17,86
Bagnanti e diluenti q.b. a . g. 100
Contiene: CICLOESANONE

ATTENZIONE: DATA L'ELEVATA TOSSICITA' DEL PRODOTTO IL SUO IMPIEGO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE QUALIFICATO MUNITO DEL PATENTINO DI CUI ALL'ART. 33 DEL D.P.R. 3 AGOSTO 1968 N. 1255.

I CLASSE

VELENO

Natura del rischio: rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. In caso di contaminazione togliere subito gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (ad es., interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Attenzione: i sintomi dell'intossicazione, qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono non comparire subito, ma manifestarsi anche dopo alcuni giorni (latenza prolungata). L'introduzione nell'organismo **anche di poche gocce del prodotto** può essere fatale: **non attendere la comparsa dei sintomi** per procedere al ricovero in ospedale dotato di reparto di rianimazione perchè sia praticata l'emodialisi. Nel frattempo, in caso di ingestione, provocare il vomito (attenzione ad eventuali lesioni esofagee) e somministrare una sostanza adsorbente come il carbone attivo, il trisilicato di magnesio, la bentonite, il caolino, la terra a follone, la terra di Fuller, ecc.

Intossicazione per ingestione ed inalazione: i primi sintomi sono: epistassi, vomito, dolori addominali, diarrea, difficoltà della deglutizione, dolori nella bocca e nella gola. Nei primi giorni si può avere assenza clinica di danno polmonare, con positività dei tests di funzionalità respiratoria.
Dopo due-tre giorni possono comparire dispnea ed edema polmonare con segni di lesioni epato-renali. L'edema polmonare volve verso una fibrosi polmonare **grave**, fino alla morte per insufficienza respiratoria. L'emodialisi deve essere intrapresa il più precocemente possibile, non appena si abbia il sospetto della presenza di Paraquat nel sangue.

Intossicazione per contatto.
Occhi: forti irritazioni della cornea e della congiuntiva con possibili striature (comparsa in 12-24 ore).
Cute: irritazione con comparsa, anche molto tardiva, di vescicole.
Unghie: macchie bianche con lesioni trasversali e caduta.
Terapia sintomatica, da praticarsi esclusivamente dal medico.
In ogni caso ulteriori informazioni sulla tossicologia del Paraquat e sulla terapia possono essere richieste **direttamente** alla società produttrice di questo Presidio Sanitario.

Il DELTAQUAT è un formulato liquido a base di Paraquat ed esplica un'azione diserbante e dessiccante distruggendo rapidamente le parti verdi delle piante trattate; non lascia residui fitotossici nel terreno perchè a contatto del suolo viene completamente disattivato; non agisce sulla parte legnosa della pianta.
Il DELTAQUAT può essere usato sia su terreno bagnato che su terreno secco; resiste alle piogge che possono cadere dopo il trattamento e può essere applicato in qualsiasi periodo dell'anno a qualsiasi temperatura.

Modalità d'impiego: il trattamento con il DELTAQUAT deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante e con attrezzatura dotata di getto controllato ed uniforme. Sciogliere la dose in 200-250 litri di acqua ed anche più in proporzione allo sviluppo delle infestanti e distribuirla su un ettaro di terreno. Diluire il DELTAQUAT in acqua pulita perchè in presenza di acqua torbida il prodotto si disattiva.

Campi e dosi di impiego (per 1 ettaro di terreno):
— Kg. 2-4 per diserbo totale e parziale di vigneto, agrumeto, frutteto e colture arboree in genere, per la preparazione ed il mantenimento di piazzole dell'uliveto, nel diserbo interfilare ed interparcellare delle colture industriali, floreali ed orticole e nel diserbo delle asparagiaie.
— Kg. 2,5-3 per il diserbo primaverile dell'erba medica (escluso l'anno di impianto).
— Kg. 3-5 per il diserbo dei vivai di presemina, pretrapianti, pre-emergenza, e per la lotta contro la cuscuta.
— Kg. 5-10 nel diserbo delle sponde dei canali.
Le dosi elevate devono essere usate nelle prime applicazioni ed in caso di abbondanti infestanti.

DIVIETO D'IMPIEGO SUI FORAGGI

Il DELTAQUAT deve essere usato con l'aggiunta di un bagnante alla dose di g. 700-800 per ogni 100 litri di soluzione. Il bagnante non occorre in caso di diserbo della vegetazione sommersa dei canali.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: non effettuare miscele con insetticidi e fungicidi. Per effettuare miscele con erbicidi consultare il tecnico di fiducia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: trattandosi di un erbicida, impiegarlo sulle colture consigliate, evitare che vengano colpite le colture limitrofe e comunque sensibili.

Rischi di nocività: il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile; perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di impiego in zona di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DELTA s.r.l.
Via Aurelio Saffi, 15 - MILANO

Officina di produzione: VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5638 del 28-12-83

DA NON VENDERSI SFUSO

5639

DELTAZEB

Fungicida a base di mancozeb

Composizione: g 100 di prodotto contengono:

MANCOZEB puro	g. 81
Bagnanti, sospensivanti ed inerti q.b. a . . .	g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

— Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto.
— Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
— In caso di malessere, ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
— Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: l'ingestione provoca nausea, conato di vomito, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (dermatite, congiuntivite, faringite, ecc.).

Terapia: in caso di ingestione, provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente. Se il paziente è in stato di incoscienza la lavanda gastrica va praticata previa intubazione. Purganti salini. Cure sintomatiche. Per la irritazione della cute e delle mucose, lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti. Controindicati alcool, oli, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

Modalità e dosi di impiego: Deltazeb è un fungicida in polvere bagnabile a largo raggio di azione e si impiega alle seguenti dosi per 100 litri d'acqua:

VITE: contro peronospora ed escoriosi g. 250-350
MELO E PERO: contro ticchiolatura g. 300
POMODORO (solo fino alla prima fioritura): contro peronospora, septoriosi, alternariosi, ticchiolatura g. 300-400
GAROFANO IN PIENO CAMPO: contro ruggine, vaiolo ed alternariosi g. 200-300
ROSE IN PIENO CAMPO: contro ruggine, peronospora e Black Spot g. 200-300
TABACCHICOLTURA: contro peronospora g. 150-200

DIVIETO DI IMPIEGO

— Divieto di impiego in serra.
— Divieto di impiego su culture diverse da quelle indicate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: il prodotto è incompatibile con il permanganato di potassio, con le poltiglie bordolesi e solfocalciche e con le miscele oleose. E' compatibile con gli altri antiparassitari e con gli zolfi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: Deltazeb può produrre fenomeni di fitotossicità notevoli sulle seguenti varietà di pere sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armella Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipione, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinascarpi, Zecchermanna.

INTERVALLO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 28 GIORNI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DELTA s.r.l.
Via Aurelio Saffi, 15 - Milano

Officina di produzione: VERCHIM ASTERIAS S.p.A. - OZZANO EMILIA (Bologna)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 5639 del 28-12-83

DA NON VENDERSI SFUSO

PESO KG. 5

5640

THIRPET P.B.

ANTICRITTOGAMICO POLICOMPOSTO ORGANICO PER LA DIFESA DELLE COLTURE FLOREALI IN PIENO CAMPO O IN SERRE A PREVALENTE AZIONE ANTIBOTRITICA

FOLPET PURO g 46 - THIRAM PURO g 23 - BAGNANTI, DISPERDENTI, INERTI QUANTO BASTA A g 100

CLASSE III

ATTENZIONE : manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- **conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici**
- **conservare la confezione ben chiusa a chiave**
- **non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto**
- **non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua**
- **non operare contro vento**
- **evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti**
- **dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: *l'ingestione provoca nausea, conati di vomito con dolori addominali, bruciori gastroesofagei e diarrea, sonnolenza, turbe nervose, bronchite. Il contatto con la cute e le mucose provoca irritazione locale (congiuntivite, faringite), eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie. Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi e aritmia.*

Terapia: *in caso di ingestione provocare il vomito, lavanda gastrica se il paziente è cosciente.*

Se il paziente è incosciente la lavanda gastrica va praticata previa intubazione (magnesia usta gr 30 per litro di acqua). Purganti salini - Digitale - Cure sintomatiche - Per l'irritazione della cute e delle mucose, lavaggio, pomate oftalmiche, cure generiche delle dermatiti.

Controindicati alcool, olii, grassi. Nei casi gravi ricovero urgente in centro di rianimazione.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il THIRPET P.B. trova impiego sulle diverse colture floreali, sia in pieno campo che in serra, alla dose di 200-250 g per 100 litri di acqua, dose valida per trattamenti a volume normale (con volume ridotto aumentarle adeguatamente).

Il THIRPET P.B. è impiegato sulle seguenti colture floreali, per la difesa delle crittogame indicate:

- Geranio: muffa grigia, ruggine
- Ciclamino: gloeosporium, septoria, muffa grigia
- Azalea: exobasidium, septoria
- Poinsettia: muffa grigia (trattare prima della fiorlutra)
- Anthurium: gloeosporium, septoria, pestalozzia, glomerella, phyllosticta, colletotrichum
- Orchidee: ruggine, pestalozzia, colletotrichum, gloeosporium
- Sanseveria: colletotrichum (perforazione fogliare)
- Philodendrom: antracnosi, phyllosticta
- Ficus: gloeosporium
- Dracaena: gloeosporium, colletotrichum, septoria
- Garofano: alternaria, ruggine, carbone
- Rosa: ruggine, ticchiolatura, peronospora, muffa grigia
- Gladiolo: sclerotinia, muffa grigia, fusariosi, ruggine, haterosporium, septoria, curvularia
- Gerbera: muffa grigia
- Crisantemo:ruggine, septoria, vaiolatura, cladosporium, muffa grigia.

Il THIRPET P.B. deve essere stemperato in poca acqua a parte e poi versato nel serbatoio dello irroratore vuoto o ripieno circa a metà, aggiungendo acqua ed agitando.
Ove le condizioni del trattamento lo consigliassero è utile l'aggiunta del BAGNANTE ADESIVO S.

Il THIRPET PP.B. è generalmente usato in miscela con gli integratori fogliari CF-1, o FITO FEED o FOLIARMICRO, o con gli integratori fogliari specifici per microcarenze.

Da non applicare con mezzi aerei

Miscibile con i più noti antiparassitari in commercio e con tutti quelli di nostra produzione, esclusi i polisolfuri e tutti quelli fortemente alcalini, o a base di calcio. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in floricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOCIETÀ ITALIANA VETERINARIA AGRICOLA MILANO - S.p.A.
VIA SCARLATTI 30 • 20124 MILANO • TEL. 270.451 • Telex 320379 SIVAM I
Officina di produzione: Diachem s.p.a. - Albano S. Alessandro (BG)

Registrazione n. 5640 del Ministero della Sanità del 28.12.83

PESO: kg 1

5641

OFTANOL CONCIA SECCA

INSETTICIDA

CLASSE II

NOCIVO

per la concia delle sementi di mais, grano ed orzo

COMPOSIZIONE

g 100 di Oftanol concia secca contengono:
g 20 di isofenfos puro;
coadiuvanti ed inerti quanto basta a 100.

Natura del rischio: intossicazione grave per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto schiacciandole e poi interrando in fosse profonde circa 1 metro. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti; 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

Avvertenza: i semi trattati con Oftanol concia secca e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana e del bestiame.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi d'impiego:
— **grano ed orzo:** 200 g/ql di semente;
— **mais:** 400-500 g/ql di semente.

Modo d'impiego: miscelare intimamente l'Oftanol concia secca con la semente facendo uso di un apparecchio esistente in commercio.
Compatibilità: l'Oftanol concia secca può essere miscelato con i fungicidi impiegati per la difesa delle sementi. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Nocività: il prodotto è nocivo per animali domestici, bestiame e pesci.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO
Officina di produzione: Garbagnate Milanese
Registrazione Ministero Sanità n. 5641 **del** 16-12-83

DA NON VENDERSI SFUSO
Conservare all'asciutto

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5642

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

BENTIONIL

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
DISERBANTE PER LA LOTTA
CONTRO LE INFESTANTI NELLE RISAIE

Registrazione Ministero Sanità n. 5642 del 28.12.83

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:

— Benthiocarb puro	g. 36
— Propanil puro	g. 18
— Coformulanti *	q.b. a g. 100

* contiene CICLOESANONE e XILOLO

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione o contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).
Sintomi di intossicazione:
Nausea, vomito, diarrea, scialorrea, dispnea, lacrimazione, tremori, convulsioni, miosi, bradicardia, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio, lavaggio cutaneo se vi è stato contatto. Atropina solfato (mg 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare, da ripetersi secondo il bisogno. Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina specialmente nei bambini. Nei casi gravi o sospetti gravi, ricovero al centro di rianimazione. Ossigeno-terapia se vi è cianosi.
Controindicazioni:
Le ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE
La formulazione è un concentrato emulsionabile da usare in post-emergenza per il diserbo del riso. Il prodotto, grazie all'azione congiunta dei due principi attivi si dimostra particolarmente attivo contro il Giavone, le Cyperacee ed Alismatacee nate da seme e che si trovano ai primi stadi di sviluppo.
L'intervento anticipato è reso possibile dalla combinazione Benthiocarb + Propanil, che libera dall'influenza della temperatura; si ottengono infatti eccellenti risultati anche con temperature basse.
Infestanti controllate: Giavone, Scirpus maritimus, Scirpus mucronatus, Alisma plantago nate da seme.
Colture protette: Riso.
Epoca di intervento: il trattamento deve essere effettuato quando il Giavone si trova nella fase vegetativa compresa fra la 1ª e la 3ª foglia. Per ottenere la massima contemporaneità nella nascita delle infestanti si consiglia, dopo la semina del riso, di tenere l'acqua ad un livello molto basso: 8-10 cm. In questo modo, al momento del trattamento, tutto il Giavone o quasi, si troverà nello stesso stadio di sviluppo e si potranno così eliminare quasi totalmente successive nascite dell'infestante.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alla dose di 8-10 Kg./ha usando la dose più bassa contro il Giavone giovane e quella più elevata se predomina il Giavone invecchiato a 3-4 foglie.
Il formulato va diluito in un quantitativo di acqua variabile a seconda del mezzo di distribuzione impiegato: con motopompe a barra (8 m. e con ugelli da 1 mm.): 300-400 lt./ha; con pompe a spalla: 400-500 lt./ha. Quando si impiegano le dosi massime (inizio accestimento), è consigliabile aumentare il quantitativo di acqua a 600-700 lt./ha.
La barra di distribuzione deve essere tenuta più bassa possibile e, cioè, a circa 50 cm. da terra. L'applicazione del prodotto deve essere effettuata irrorando uniformemente la miscela erbicida, in modo da consentire una perfetta copertura di tutta la superficie fogliare e della guaina delle infestanti.
La distribuzione dell'erbicida va eseguita con la risaia in asciutta; è sufficiente pertanto togliere l'acqua dalle camere 24-26 ore prima del trattamento avendo cura che le infestanti siano asciutte.
La risaia deve rimanere tale almeno per 24 ore, dopo di che, si dovrà ripristinare il livello dell'acqua, mantendolo il più alto possibile per 6-8 giorni. Quindi si riporterà l'acqua ad un livello più basso. Nel caso di riso trapiantato, effettuare la distribuzione del prodotto tenendo gli spruzzatori molto bassi, quasi al livello degli apici delle foglie di riso per colpire meglio le infestanti che possono essere protette dalla vegetazione di riso, già abbastanza espansa.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo. Inoltre, non deve essere distribuito 5 giorni prima o dopo l'impiego di fertilizzanti, insetticidi od altri antiparassitari altrimenti il riso potrebbe subire delle bruciature.

FITOTOSSICITA'
Alle dosi di impiego più elevate il prodotto, in particolari condizioni, può causare parziali necrosi od ingiallimenti degli apici delle foglie del riso che si risolvono però nello spazio di 6-7 giorni al massimo, senza pregiudicare lo sviluppo delle giovani piantine di riso.

NON ESEGUIRE L'INTERVENTO NEL CASO IN CUI SI PREVEDA UNA PIOGGIA A DISTANZA DI 3-6 ORE. EFFETTUARE IL TRATTAMENTO IN GIORNATE PRIVE DI VENTO, ONDE EVITARE CHE LA NUBE IRRORANTE POSSA ESSERE TRASPORTATA SU COLTURE LIMITROFE SENSIBILI: MEDICA, TRIFOGLIO, PISELLO, FAGIOLO, FRUTTETI, VIGNETI OD ALTRE.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO KG. 5

SIAPA — SOCIETÀ ITALO AMERICANA PRODOTTI ANTIPARASSITARI

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

5643

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

ROKAR XL

(LIQUIDO SOLUBILE IN ACQUA)
DISERBANTE TOTALE PER LE AREE NON COLTIVATE

Registrazione Ministero Sanità n. **del**
marchio depositato n.

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono	
— Bromacile puro	g. 22
— Coformulanti *	q.b. a g. 100
* Contiene Glicole etilenico.	

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non contaminare acque di uso domestico.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Tenere lontano dal calore e dal fuoco.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il **ROKAR XL** è un erbicida a base di Bromacile per il diserbo delle aree non coltivate. E' efficace sia per il decespugliamento, sia per il controllo di numerose infestanti annuali e perenni, fra queste ultime è particolarmente attivo contro le graminacee.
Gli effetti sono lenti a manifestarsi ed è possibile che essi non si evidenzino fino a quando il prodotto non viene traslocato dall'umidità nella zona di terreno esplorata dalle radici delle infestanti.
L'efficacia e la durata dell'effetto erbicida variano a seconda della quantità di prodotto usato, del tipo di terreno e del regime pluviometrico.
Dopo la sua miscelazione con l'acqua, il **ROKAR XL** non è volatile, infiammabile e corrosivo per i metalli eccetto l'alluminio.
ATTENZIONE: liquido infiammabile.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Irrorare il **ROKAR XL** poco prima o durante il periodo di crescita attiva delle infestanti da controllare. In casi di vegetazione particolarmente densa, i migliori risultati si ottengono con una preliminare eliminazione delle erbe infestanti.
Evitare di trattare con terreno gelato.
Prima dell'applicazione è opportuno controllare il funzionamento degli ugelli per determinare la quantità di acqua necessaria per un'uniforme copertura della superficie da trattare.
Calcolare la quantità di **ROKAR XL**, versarla nell'acqua e miscelarla con cura. Usare attrezzature a motore con barre adeguatamente predisposte per una distribuzione costante ed uniforme del prodotto.
Se la distribuzione viene effettuata con un erogatore provvisto di lancia a mano, si dovranno usare almeno 1800 litri di miscela per ettaro.
Sciacquare il serbatoio, la pompa, i tubi e gli ugelli con molta acqua dopo aver usato il prodotto.
Non destinare i recipienti che contenevano il prodotto ad altri usi, ma distruggerli o sotterrarli.

DISERBO
Per un diserbo ad azione prolungata su superfici non coltivate come ferrovie, banchine stradali, aree industriali, usare:

a) litri 14-28 per ettaro di **ROKAR XL** per il controllo di malerbe annuali a foglia larga e graminacee come Setaria spp. (Setàrie), Lolium spp. (Logli), Avena spp. (Avene selvatiche), Digitaria sanguinalis (Sanguinella), Bromus spp. (Forasacco), Ambrosia maritima (Ambrosia), Chenopodium spp. (Chenopodi), Tribulus terrestris (Tribolo), Dactylis glomerata (Erba mazzolina).
Applicazioni a dosi basse come litri 7 per ettaro poco prima o subito dopo l'emergenza delle infestanti annuali, consentono di controllare malerbe annuali dicotiledoni e graminacee in zone poco piovose mentre in zone umide il controllo delle infestanti è limitato ad un periodo più breve.
b) Litri 28-56 per ettaro di **ROKAR XL** per controllare infestanti perenni e graminacee come Paspalum notatum (Paspalo), Poa spp. (Poe), Apèra spica-venti (Spica venti), Taraxacum spp. (Soffione), Antemis arvensis (Camomilla inodore), Solidago virga-aurea (Verga aurea), Plantago spp. (Plantaggini), Daùcus carota (Carota).
Tali quantitativi possono essere ridotti a 20 litri per ettaro in zone con scarse precipitazioni.
c) Litri 55-110 per ettaro di **ROKAR XL** per controllare il Sorghum halepense (Sorghetta); usare le stesse dosi per infestanti perenni e graminacee difficili da eliminare come Cynodon dactylon (Gramigna), Cyperus spp. (Ciperi), Saponaria officinalis (Saponaria), Pteridium spp. (Felci), Equisetum spp. (Coda cavallina).
Se le precipitazioni sono scarse durante il periodo di crescita attiva, il **ROKAR XL**, non fornisce risultati soddisfacenti su infestanti perenni con radici profonde come Sorghum halepense.

In caso di reinfestazioni su appezzamenti già trattati usare da 7 a 28 litri per ettaro di **ROKAR XL** contro malerbe annuali graminacee e dicotiledoni.
Impiegare i dosaggi maggiori su terreni a forte potere assorbente (normalmente ricchi di argilla e di sostanza organica).

DECESPUGLIAMENTO
Per il controllo di piante legnose su superfici non coltivate come ferrovie, banchine stradali, aree industriali, fossi di scolo, eseguire le applicazioni in primavera o in estate sia su tutta la superficie che in forma localizzata. Su fossi di scolo applicare il prodotto localizzato. Per evitare danni alle colture utili non trattare la vegetazione acquatica e non usare l'acqua dei fossi di drenaggio trattati per l'irrigazione.
a) Trattamenti su tutta la superficie
Usare litri 20-45 per ettaro per controllare querce, salici, pini; litri 55-110 per ettaro per il controllo di olmi, bagolari, pioppi. Impiegare le dosi maggiori su terreni con alto contenuto di sostanza organica.
b) Trattamenti localizzati
Miscelare 20 litri di prodotto in 100 litri di acqua ed applicare 30-60 grammi di miscela per pianta con un diametro di 5-10 cm. alla base. Bagnare la base del tronco fino allo scorrimento. Il trattamento controlla piante legnose come pioppi, olmi, salici, bagolari.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo. Evitare il contatto con fertilizzanti, insetticidi, fungicidi e sementi.

FITOTOSSICITA'
Evitare il contatto con le foglie e i frutti degli agrumi, inoltre evitare il contatto con le piante vicine (in modo particolare con le radici) può essere fitotossico se non usato secondo le norme e su colture non indicate in etichetta.
Non usare il prodotto su prati, viali, campi da tennis e luoghi similari.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' tossico per i pesci; tenere lontani, durante i trattamenti, persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO LT. 1

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza, 172 - Roma

5644

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

SILATIN 50 SC

(SOSPENSIONE ACQUOSA)
ACARICIDA IN SOSPENSIONE ACQUOSA

Registrazione Ministero Sanità n. del

COMPOSIZIONE	
100 grammi di prodotto contengono:	
— Neostanox	g. 50
— Coformulanti *	q.b. a g. 100
* Contiene glicole etilenico.	

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione:

cefalea occipitale continua o parossistica, ronzii auricolari, iperacusia, vertigini, rachialgia, dolori addominali riferiti alla fossa iliaca destra, ritenzione urinaria, insufficienza respiratoria e di circolo, interessamento del sistema nervoso centrale (nevralgie e paralisi), dermatosi.

Consigli terapeutici:
allontamento della sostanza nociva con la massima efficacia e rapidità, effettuando, in relazione alla via di contaminazione, abluzioni cutanee, lavanda gastrica, somministrando purgante salino non violento e carbone medicinale in abbondanza. Eventualmente somministrazione di ossigeno e respirazione artificiale.

Terapia sintomatica.

CARATTERISTICHE

Il SILATIN 50 SC è un acaricida di superficie attivo nei confronti delle forme mobili degli acari (Metatetranychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpinis, F. vitis, E. pomi), che infestano pero, melo, pesco, susino, albicocco, ciliegio, vite, agrumi nonché le colture floreali ed ornamentali in pieno campo pomodori e cetrioli.
L'attività acaricida del SILATIN 50 SC aumenta progressivamente dopo il trattamento e mantiene valori elevati per un periodo di 4-6 settimane. Nei trattamenti di estate inoltrata si previene quindi, in buona misura, con conseguente minor infestazione nella primavera successiva, la deposizione delle uova d'inverno che ha luogo verso la fine stagione da parte delle femmine di P. ulmi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il SILATIN 50 SC nei trattamenti a volume normale, si impiega alla dose di 100 grammi ogni 100 litri di acqua. L'intervento va effettuato alla comparsa dei primi sintomi d'infestazione bagnando accuratamente tutta la pianta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari normalmente impiegati sulle colture citate.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

In applicazioni su colture di rose, è raccomandabile eseguire dei saggi preliminari, poiché alcune varietà potrebbero risultare sensibili all'acaricida.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMACEE, DRUPACEE, POMODORO, CETRIOLO - 45 GIORNI PER LA VITE - 60 GIORNI PER GLI AGRUMI.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO KG. 0,100

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

5646

I CLASSE

MONITOR

(LIQUIDO EMULSIONABILE)

INSETTICIDA - ACARICIDA SISTEMICO

Registrazione Ministero Sanità n. 5646 **del** 28.12.83

® Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Methamidophos puro	g. 18
— Coformulanti	q.b. a g. 100

* Contiene glicole etelenico monoetiletere.

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 23 agosto 1968, n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Evitare di respirarne i vapori.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
Rendere inutilizzabili dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto (Per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).
In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione:
Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione; una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare Pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni:
morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

CARATTERISTICHE

Il MONITOR agisce per contatto e per ingestione e viene facilmente assorbito dai tessuti vegetali. Controlla molte specie di acari fitofagi e di insetti ad apparato boccale masticatore e succhiatore, comprese quelle resistenti e quelle difficili da combattere perché protette dalle foglie o perché scavano gallerie in varie parti delle piante.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il MONITOR può essere applicato sulle colture erbacee (patata - barbabietola) e arboree, comprese le piante ornamentali (solo in pieno campo). E' particolarmente indicato nei seguenti settori:
Pero e melo: contro: Carpocapsa, Orgia, Ricamatrici (Cacoecia, Capua, Eulia), neanidi di Cocciniglie, Ragnetto rosso: 200-250 g./hl; contro Afidi: 150 g./hl.
Pesco ed altre drupacee: contro Afidi, Anarsia, Cydia, neanidi della Cocciniglia bianca, Acari: 150-250 g./hl.
Vite: contro Tignole dell'uva, Eulia, Cicaline, Oziorrinco, Acari: 200-250 g./hl.
Barbabietola: contro Altica, Casside, Cleono, Lisso, Mosca, Afidi, Nottue: 1,5-2,5 Kg./ha.
Patata: contro Afidi, Dorifora, Cicaline, Tignola: 2-2,5 Kg./ha.
Ornamentali: contro Bega del garofano, Tripidi, Fillominatori, Aleurodi, Afidi, Acari: 200-250 g./hl.
Per la preparazione della miscela acquosa, versare direttamente la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenendo l'acqua in agitazione.
Alla miscela da irrorare è conveniente aggiungere 50 g./hl del bagnante-adesivo IROL.
Il MONITOR può essere impiegato anche a basso volume purchè venga distribuita, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto che sarebbe stata distribuita con pompe a volume normale.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il MONITOR è compatibile con la maggior parte degli antiparassitari a reazione neutra. Limitatamente alle pomacee il MONITOR non deve essere miscelato con altri antiparassitari. In ogni caso è sconsigliabile la miscela con i polisolfuri e la poltiglia bordolese.
In caso di miscela con altri prodotti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Inoltre, devono essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non impiegare il prodotto su varietà molto sensibili (per es. Golden Delicious). Trattamenti ripetuti possono causare leggeri sintomi di fitotossicità sulle foglie perciò, non applicare il prodotto più di una volta al mese sui fruttiferi. In pesco non applicare su piante sofferenti e non superare la dose di 150 g./hl.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO **KG. 0,100**

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza, 172 - ROMA

5647

PRATOBELLO

Diserbante per manti erbosi di prati ornamentali, costituiti esclusivamente di graminacee, con addizione di concime

COMPOSIZIONE: Mecoprop puro (sotto forma di sale potassico) g 1,0, TBA puro (sotto forma di sale sodico) g 0,12, azoto (N) g 20, di cui g 14 organico di sintesi da IBDU, g 2,5 ammoniacale, g 1,75 nitrico, g 6,75 ureico, anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua g 4, ossido di potassio (K_2O) esente da cloro g 8, coformulanti quanto basta a 100.

CLASSE III

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- conservare la confezione ben chiusa;
- non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
- non operare contro vento;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti (per la distribuzione manuale indossare guanti);
- dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: E' sconsigliata la digitale.

Roussel-Hoechst Agrovet S.p.A.
20100 Milano - Casella Postale 1847
Officina di produzione CIFA - Caravaggio (Bergamo)

Registrazione n. [illegible] del [illegible] del Ministero della Sanità

I logotipi sono marchi registrati rispettivamente della Roussel Uclaf - Parigi e Hoechst Aktiengesellschaft - Francoforte s/Meno

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Prati ornamentali di essenze graminacee: la dose indicativa d'impiego è di

g 30 per metro quadro
kg 3 per 100 metri quadri
kg 300 per ettaro

Il prodotto va distribuito il più uniformemente possibile e l'epoca migliore è qualche giorno dopo una falciatura nella stagione primaverile-estiva. I prati trattati possono essere falciati una settimana dopo. In caso di clima caldo e siccitoso, irrigare circa 3 giorni dopo il trattamento.
Se al trattamento seguono piogge dilavanti o in caso di prati ornamentali fortemente infestati è possibile ripetere il trattamento 6-8 settimane dopo. Distrutte le infestanti possono rivelarsi nei prati piazze senza erba, in tal caso è possibile seminare miscugli di semi di graminacee già quattro-sei settimane dopo il trattamento.

CARATTERISTICHE

PRATOBELLO controlla infestanti quali: ranuncoli, poligonacee, soffione, stellaria, veronica, camomilla, sonco ed altre erbe a foglia larga; fa crescere tappeti erbosi ornamentali di essenze graminacee fitti, resistenti e di un ricco colore verde.

Da non applicare con mezzi aerei.

COMPATIBILITA'

PRATOBELLO può essere mescolato a concimi minerali come pure ad insetticidi o geodisinfestanti granulari. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare in prossimità di rosai, conifere, piante legnose perenni. Non ripetere il trattamento prima di 6-8 settimane. Non impiegare nell'anno di semina.

RISCHI DI NOCIVITA'

Non impiegare l'erba tagliata come foraggio.

ATTENZIONE DA NON USARE SU TERRENI DESTINATI A COLTURE ALIMENTARI.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI CHE POSSONO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO.

15.383 kg 1

5648

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

ALAZIN

(POLVERE BAGNABILE)
DISERBANTE SELETTIVO PER IL MAIS

Registrazione Ministero Sanità n. 5648 del 28.12.83
marchio depositato n.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Alachlor puro	g. 15
Atrazina pura	g. 10
Coformulanti	q.b. a g. 100

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

E' un diserbante in grado di controllare infestanti annuali, caratteristiche delle zone maidicole come: Echinochloa crus galli (Giavone), Panicum dichotomiflorum (Giavone americano), Poa spp (Poe), Digitaria Sanguinalis (Sanguinella), Setaria spp (Setaria), Sorghum halepense da seme (Sorghetta), Veronica spp (Veroniche), Stellaria media (Centocchio), Capsella bursa pastoris (Borsa del pastore), Amarantus spp (Amaranti), Matricaria Chamomilla (Camomilla), Sinapis arvensis (Senape), Chenopodium album (Farinaccio), Poligonum persicaria (Persicaria), Portulaca oleracea (Erba porcellana).

Il prodotto agisce per assorbimento radicale sui semi delle infestanti in via di germinazione.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto può essere applicato su tutta la superficie dell'appezzamento, oppure in forma localizzata lungo le file: in questo caso la dose di impiego va proporzionalmente ridotta alla superficie trattata.

Il prodotto va impiegato subito dopo la semina o alcuni giorni dopo, ma, prima della nascita delle malerbe.

Dosi di impiego: 9 Kg/Ha. diluiti in 4-5 Hl. di acqua.

AVVERTENZE

Affinché il prodotto possa esercitare appieno la sua azione è necessaria una leggera pioggia entro 2 settimane dal trattamento. Qualora ciò non si verificasse, è opportuno effettuare una irrigazione.

Evitare di effettuare lavorazioni sul terreno trattato. Qualora si rendesse necessario rompere la crosta superficiale, è opportuno lavorare il più superficialmente possibile, per evitare di portare in superficie semi posti in profondità e quindi non contaminati dall'erbicida.

Preparare accuratamente il letto di semina, affinché non rimangano zolle.

Non effettuare il trattamento su terreni molto sabbiosi o molto ricchi di sostanza organica.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'

Evitare che il prodotto venga a contatto con colture vicine.

Dal trattamento erbicida alla semina delle colture sensibili, successive al mais, rispettare un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (per es. bietola e tabacco).

Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO **KG. 0,500**

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza, 172 - Roma

5649

II CLASSE

ZEPEX A

(LIQUIDO EMULSIONABILE)

SOSPENSIONE CONCENTRATA CHE CONTIENE UNA MISCELA DELLE TRIAZINE CYANAZINA E ATRAZINA PER IMPIEGHI SU MAIS PER LA LOTTA CONTRO LE INFESTANTI A FOGLIA LARGA E GRAMINACEE, ANCHE SE RESISTENTI AI TRATTAMENTI EFFETTUATI CON LA SOLA ATRAZINA

Registrazione Ministero Sanità n. 5649 del 28.12.83

® Marchio depositato n.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

— Cyanazina pura	g. 30,0
— Atrazina pura	g. 14,5
— Coformulanti	q.b. a g. 100,0

NATURA DEL RISCHIO

Intossicazione grave per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Evitare di respirarne i vapori.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Rendere innocue, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto. (Per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo con calce viva).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi d'intossicazione: depressione, letargia, respirazione rapida e affannosa, vasodilatazione generalizzata.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di ingestione accidentale, provocare subito il vomito, somministrando acqua salata; lavanda gastrica.

In caso di grave contaminazione cutanea, lavare molto bene le parti colpite con acqua e sapone e tenere il paziente a riposo e al caldo.

Terapia sintomatica in base al controllo del bilancio idrico ed elettrolitico, della respirazione e della pressione arteriosa.

CARATTERISTICHE

Lo ZEPEX A in mais-coltura presenta le seguenti caratteristiche:

1) La Cyanazina contenuta nel prodotto è attiva anche contro le infestanti resistenti all'Atrazina quali Digitaria (Sanguinella), Panicum dichotomiflorum (Panico americano), Setaria (Panicastrella).

2) L'aggiunta della Cyanazina all'Atrazina, rispetto ad altri prodotti diserbanti del gruppo delle Triazine, rende questo formulato meno persistente nel terreno.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lo ZEPEX A è un potente inibitore della fotosintesi ed agisce contro le erbe infestanti attraverso l'apparato fogliare, ma soprattutto per via radicale.

Lo ZEPEX A, diluito in 400-600 lt./ha di acqua, si applica come segue sul mais:

a) Infestazione comune per ridurre i rischi di accumulo di Atrazina nel terreno:
Si consiglia di norma di usare il prodotto in pre-emergenza alla dose di 7,0 kg. di formulato per ettaro su terreni sciolti ed alla dose di 8,5 kg. di formulato per ettaro su terreni medi-compatti.

b) Infestazione di erbe resistenti alla sola Atrazina:
Usare il prodotto di norma in pre-emergenza alla dose di 8,5 kg. di formulato per ettaro su terreni sciolti ed in caso di infestazione non grave; alla dose di 10,5 kg. di formulato per ettaro su terreni medi-compatti o in presenza di forte infestazione.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Lo ZEPEX A non è miscibile con olii bianchi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Non trattare in terreni sabbiosi.
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Dal trattamento erbicida alla semina di colture sensibili successive al mais occorre un intervallo di 5 mesi per il frumento e di almeno 10 mesi per altre colture (es.: bietola, tabacco).
Non ripetere il trattamento prima di 7 mesi.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

CONTENUTO KG. 1

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

SILIA S.p.A. - Via di Tor Sapienza, 172 - ROMA

5650

III CLASSE
ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

DIAZINATE

(GRANULARE)

DISERBANTE-INSETTICIDA SELETTIVO, DA APPLICARE IN PRE-SEMINA ED IN POST-EMERGENZA DEL RISO, PER IL CONTROLLO DEL GIAVONE E DEGLI INSETTI DEL TERRENO CHE INFESTANO LE RISAIE

Registrazione Ministero Sanità n. 5650 **del** 28.12.83

marchio depositato n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono

— Molinate puro		g 7,5
— Diazinone puro		g 3,0
— Coformulanti	q.b. a	g 100,0

Contiene glicole dietilenico

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Non operare contro vento.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Tossicità riferibile al diazinone, inibitore delle acetil-colinesterasi.
Tossico per contatto, ingestione, inalazione.
Inizio della sintomatologia tossica dopo 30-60 minuti; massima intensità in 2-8 ore.
Apparato gastroenterico: scialorrea, nausea, vomito, crampi addominali, diarrea, tenesmo.
Apparato neuromuscolare: miosi, cefalea, agitazione psicomotoria, tremori, crampi muscolari, fascicolazioni, convulzioni, sonnolenza fino a coma.
Apparato respiratorio: tosse, secrezioni bronchiali, broncocostrizione, dispnea, depressione respiratoria.
Apparato cardiovascolare: bradicardia, ipotensione, shock cardiogeno.
Cute e occhi: sudorazione, lacrimazione.

CONSIGLI TERAPEUTICI

Ingestione: lavanda gastrica. Purgante salino.
Contatto cute: lavaggio abbondante con acqua e sapone.
Contatto occhi: lavaggio abbondante con acqua e visita oculistica.
Ingestione-inalazione-contatto: atropina dose iniziale 2-4 mg IM, EV; seguita da dosi di 2 mg ogni 3-10 min. in relazione ai sintomi muscarinici.
Nei casi gravi possono essere necessarie dosi fino a 50 mg/die nell'adulto.
Sconsigliato l'uso della pralidossima (PAM - Contrathion).
Terapia di supporto: assistenza respiratoria: O_2 terapia, intubazione, respiro assistito.
Monitoraggio elettrocardiografico della pressione arteriosa e della pressione venosa centrale.
Fluidoterapia neutra.
Controllo dell'equilibrio idro-elettrolitico.
Terapia sintomatica.
Nei casi gravi ricovero in Centro di rianimazione.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un diserbante-insetticida granulare, selettivo per il riso, sia in pre-semina che in post-emergenza; controlla il Giavone (Panicum crus-galli) ed i più comuni insetti che infestano le risaie come: Chironomus spp. (Chironomo rosso, Leccariso), Coppetta. Il prodotto, oltre a controllare gli insetti dannosi per il riso, esplica la sua azione contro le zanzare.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto deve essere distribuito uniformemente sulla superficie da diserbare e disinfestare 15-25 giorni dopo la semina. Il trattamento va effettuato in presenza di acqua che non deve essere tolta prima di 3 giorni dopo l'intervento.

Dose d'impiego:

— terreni leggeri	45 Kg/ha
— terreni medio impasto	50 Kg/ha
— terreni pesanti ed argillosi	55 Kg/ha

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il prodotto, pur essendo compatibile con i fertilizzanti granulari, deve essere applicato da solo, per evitare separazione nella tramoggia, con conseguente disformità di distribuzione.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili; è nocivo per animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SIAPA S.p.A.

prodotto nello stabilimento di

San Vincenzo di Galliera (Bologna)

CONTENUTO KG. 0,500

5651

CLASSE IV

Erbicida in microgranuli solubili per la lotta contro le graminacee infestanti la barbabietola, il riso e le aree incolte

COMPOSIZIONE

TCA sodium puro	g 95
Coadiuvanti e supporti inerti q. b. a	g 100

S.p.A. - Sede legale in Foro Bonaparte 31 - 20121 MILANO

Registrazione Ministero della Sanità N. [illegible] **del** [illegible]

® Marchio registrato

ISTRUZIONI PER L'USO

L'ARTIS è un graminicida specifico che agisce prevalentemente per assorbimento radicale ma anche tramite l'apparato fogliare sulle graminacee annuali e perenni.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

pre-semina:
13-15 kg/ha nelle colture autunnali
7-10 kg/ha nelle colture primaverili

pre-emergenza:
13-15 kg/ha nelle colture autunnali
10-13 kg/ha nelle colture primaverili

Le dosi più elevate vanno adottate nei terreni argillosi.

RISO: su terreno in assenza della coltura
Contro la Serla o Rasparello **(Leersia oryzoides)** e lo Strozza rane od Erba bianca **(Alopecurus geniculatus)**, dopo la raccolta, in autunno od in inverno, sulle stoppie previa asportazione della paglia oppure su terreno arato: 25-30 kg/ha, avendo l'avvertenza di applicarli 60 giorni prima della semina del riso.

AREE INCOLTE

Contro Gramigne, Cannuccia, Avene selvatiche, Giavoni, Digitaria, Setarie, Poe, Logli: 200-300 kg/ha.
Una pioggia od un'irrigazione dopo il trattamento favoriscono l'azione del prodotto

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità

L'ARTIS è miscibile con altri diserbanti specifici contro infestanti a foglia larga quali 2,4-D, MCPA e Pyrazon.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Fitotossicità

Su riso, per evitare fenomeni di fitotossicità è necessario osservare un intervallo di 60 giorni tra il trattamento e la semina della coltura.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Per la sua buona conservazione il prodotto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco.

Norme precauzionali

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.

Durante la manipolazione e l'impiego del prodotto si dovranno indossare abiti e occhiali protettivi ed eventualmente, respiratori o semimaschere.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

5652

BASAGRAN M

Diserbante selettivo del frumento e cereali minori.

COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

Bentazon puro	g. 20,8
MCPA puro (da sale dimetilamminico)	g. 10,4
Coformulanti q.b. a	g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUZIONE E VENDITA

BASF-Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:

BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N.° [illegible] **del** [illegible]

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare altre colture, alimenti o bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Sintomi di intossicazione

Astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso

Abbondante lavaggio gastrico - ossigenoterapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni

E' sconsigliata la digitale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il BASAGRAN M è un diserbante selettivo di post-emergenza, ad ampio spettro di azione, del frumento e dei cereali minori.
L'associazione nel BASAGRAN M dei principi attivi Bentazon, a prevalente azione di contatto e MCPA, ad azione sistematica, consente un elevato controllo delle tipiche dicotiledoni annuali e perennanti infestanti i cereali.
Il BASAGRAN M risulta efficace in particolare su avventizie a foglia larga di difficile controllo quali Matricaria, Gallum, Bifora, Chrysanthemum, Cirsium, Convolvulus, Artemisia.
Il BASAGRAN M non controlla infestanti graminacee annuali o perennanti.
Il BASAGRAN M agisce per contatto e per assorbimento fogliare. E' necessario pertanto intervenire su infestanti già emerse e operare con attrezzature che consentano una buona ed uniforme bagnatura delle avventizie.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Frumento e cereali minori (avena, segale, orzo): 4 l/ha, distribuiti con 300-400 litri di acqua per ettaro.
Effettuare il trattamento nel periodo compreso fra gli stadi di fine accestimento e di fine levata dei cereali.
Si sconsiglia di operare in giornate con temperature inferiori ai 10 °C. Basse temperature al momento del trattamento determinano una eliminazione più lenta delle infestanti.
Precipitazioni piovose nelle 4-5 ore successive all'intervento diserbante possono ridurre l'efficacia del trattamento.
Non operare su colture danneggiate dal freddo e da prolungati ristagni di acqua e quando si prevedono gelate o forti abbassamenti di temperatura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità con altri prodotti nell'impiego agricolo - Il BASAGRAN M è miscibile con CALIXIN, BAVISTIN, BAVISTIN M e CYCOCEL. I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione.
Il BASAGAN M è miscibile inoltre con i fertilizzanti BASFOLIAR 34 e FETRILON COMBI.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per il prodotto più tossico. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Eventuale fitotossicità: Non trattare cereali consociati o da consociare con leguminose foraggere (medica e trifoglio). Evitare che la miscela giunga a contatto con colture vicine sensibili, quali fruttiferi, vite, pioppo, piante ortive e in genere tutte le piante non graminacee, anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Le attrezzature usate per il diserbo devono essere accuratamente e ripetutamente lavate prima di essere utilizzate per gli altri trattamenti.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO 60 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

litri 5

5653

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento grave per ingestione.

Sintomi di intossicazione:
Emorragie cutanee e delle mucose-ematuria. Neutralizzano la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protombrina; la sintomatologia è prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici:
Antidoto specifico: Vitamina K¹, Vitamina C e P; consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

Controindicazioni:
Anticoagulanti.

DA NON VENDERSI SFUSO

OMNIRAT

ESCA TOPICIDA RATTICIDA

PRONTA ALL'USO

CLASSE III

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:

Warfarin puro	gr.	0,025
Coformulanti ed adescanti	q. b. a gr.	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

KOLLANT

KOLLANT - Industrie Chimiche S.p.A.

ISTRUZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO:
OMNIRAT è un esca topicida pronta all'uso per la distruzione di topi e ratti. OMNIRAT svolge la sua azione tossica dopo 4 - 5 ingestioni causando la morte dei roditori per emorragia interna, senza agonia e quindi senza suscitare allarme e diffidenza nei consimili, il che permette la totale disinfestazione. I topi una volta intossicati, presi da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all'aperto.
OMNIRAT va sparso a mucchietti di 50-70 gr. ove si nota presenza o passaggio di topi e ratti, avendo cura di non toccare l'esca con le mani e di mascherarla agli animali domestici.

CAMPI DI IMPIEGO:
OMNIRAT va usato in colture floricole, orticole, arboree in pieno campo o in serra; nei magazzini di raccolta delle derrate e dei mangimi; nelle stalle.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA:
Il prodotto si impiega da solo.

RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame e i pesci.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato.

Registrazione del Ministero della Sanità

n. ...... del

KOLLANT
INDUSTRIE CHIM.CHE S.p.A.
sede: PADOVA, via Fugenes, 52
Officina di produzione propria
VIGONOVO (VE)
via C. Colombo, 7-7/A
Tel. (049) 502.855 - 655.300
Telex 430813 KIC

5654

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici; conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto; non contaminare alimenti, bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Avvelenamento grave per ingestione.

Sintomi di intossicazione:
Emorragie cutanee e delle mucose-ematuria. Neutralizzano la vitamina K per cui a livello epatico si blocca la formazione di protombrina; la tomatologia è prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici:
Antidoto specifico: Vitamina K¹, Vitamina C e P, consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

Controindicazioni:
Anticoagulanti.

DA NON VENDERSI SFUSO

BETTER

ESCA TOPICIDA RATTICIDA

PRONTA ALL'USO

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione: 100 gr. di prodotto contengono:

Warfarin puro	gr.	0,025
Coformulanti ed adescanti	q. b. a gr.	100

KOLLANT

KOLLANT - Industrie Chimiche S.p.A.

ISTRUZIONI E MODALITA' D'IMPIEGO:
BETTER e un'esca topicida pronta all'uso per la distruzione di topi e ratti. BETTER svolge la sua azione tossica dopo 4 - 5 ingestioni causando la morte dei roditori per emorragia interne, senza agonia e quindi senza suscitare allarme e diffidenza nei consimili, il che permette la totale disinfestazione. I topi una volta intossicati, presi da senso di soffocamento, tendono ad andare a morire all'aperto.
BETTER va sparso a mucchietti di 50-70 gr. ove si nota presenza o passaggio di topi e ratti, avendo cura di non toccare l'esca con le mani e di mascherarla agli animali domestici

CAMPI DI IMPIEGO:
BETTER va usato in colture floricole, orticole, arboree in pieno campo o in serra; nei magazzini di raccolta delle derrate e dei mangimi, nelle stalle

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA':
Il prodotto si impiega da solo

RISCHI DI NOCIVITA':
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci se assorbito o ingerito.

ATTENZIONE:
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da un uso improprio del preparato.

Registrazione del Ministero della Sanità

n. del

KOLLANT
INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.
sede PADOVA, via Euganea, 57
Officina di produzione propria
VIGONOVO (VE)
via C. Colombo, 7-7/A
Tel (049) 502 855 - 655 300
Telex 430813 KIC

5655

)

STIPHATE

INSETTICIDA-AFICIDA IN POLVERE SOLUBILE

Da impiegarsi contro afidi, tignole, tortricidi, tripidi, lepidotteri vari e mosche minatrici su: Fruttiferi, vite, colture floreali in pieno campo, arboree ed erbacee.

COMPOSIZIONE 100 gr. di prodotto contengono:	
ACEPHATE puro	42,5 gr.
Coadiuvanti ed inerti	q.b. a 100,0 gr.

CARATTERISTICHE

Lo **STIPHATE** è un insetticida fosforganico che agisce per contatto ed ingestione (con possibilità di citroplsmo); ha una persistenza sulle foglie di 7-10 giorni; possiede una azione rapida contro gli afidi, mentre verso altri insetti, quali per esempio le larve ricamatrici, esplica la sua efficacia qualche giorno dopo il trattamento.

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO:

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave, in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione.
Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti 0,2 - 1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore.
Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrato per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finché è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Lo **Stiphate** si impiega in trattamenti a volume normale alle seguenti dosi per ettolitro d'acqua:
Pomacee: 80 - 120 gr./hl. contro tutti gli afidi; 120 - 150 gr./hl. contro la carpocapsa.
Pesco ed altre drupacee: 80-120 gr./hl. contro tutti gli afidi; 120-150 gr./hl. contro le ricamatrici della frutta e l'anarsia.
Agrumi: 80-120 gr./hl. contro tutti gli afidi; 100-150 gr./hl. contro le cocciniglie.
Colture floreali in pieno campo: 80-120 gr./hl. contro aleurodi e tutti gli afidi; 120-150 gr./hl. contro le mosche minatrici.
Garofano in pieno campo: 120-150 gr./hl. contro bega verde; 80-120 gr./hl. contro tripidi.
Vite: 80-120 gr./hl. contro tignole e cicaline; 120-150 gr./hl. contro nottue.
Olivo: 80-120 gr./hl. contro mosca e tignola; 100-150 gr./hl. contro le cocciniglie.
Fragola: 120-150 gr./hl. contro le tortricidi.
Lo **Stiphate** si impiega alle seguenti dosi per ettaro:
Tabacco: 0,8-1,2 Kg. contro afide verde.
Patata: 0,8-1,2 Kg. contro afide verde.
Barbabietola da zucchero: 0,8-1,2 Kg. contro afide verde e mosca.
Mais: 1,2-1,5 Kg. contro la piralide.
Preparazione della miscela: Stemperare prima il prodotto con poca acqua, quindi versarlo, agitando con cura, nella rimanente quantità d'acqua necessaria a diluirlo alla concentrazione voluta.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA': Lo **STIPHATE** è compatibile con i più comuni prodotti antiparassitari di uso primaverile estivo, eccetto i prodotti fortemente alcalini quali i polisolfuri di bario e di calcio e la poltiglia bordolese.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Per evitare eventuali fenomeni fitotossici, non effettuare sui fruttiferi trattamenti ad intervalli inferiori ai 15 giorni e non eseguire nei mesi estivi interventi sul pesco. Si consiglia inoltre di effettuare saggi varietali su piccola scala ed evitare interventi prima dell'indurimento del nocciolo sulle cultivar più delicate.

RISCHI DI NOCIVITA': Non eseguire trattamenti durante la fioritura essendo il prodotto tossico per gli insetti utili.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI
21 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI COLTURE IN GENERE
30 GIORNI NEL CASO DI OLIVO E POMACEE

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

SOLFOTECNICA ITALIANA - S.p.A

S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A.
Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48100 RAVENNA
Stabilimento di produzione S.T.I. - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via S. Francesco - Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5655 **del** 28-12-83

Peso netto: Kg. 1

5656

KROVAR® I

ERBICIDA PER USO INDUSTRIALE

® Marchio registrato E I. du Pont de Nemours e Co. (Inc.)

COMPOSIZIONE:

Bromacile puro g 40
Diuron puro g 40
Ingredienti inerti quanto basta a g 100.

Classe III

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Mantenere la confezione ben chiusa.
- Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto.
- Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua.
- Non operare contro vento.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
- Lavare accuratamente la pompa con molti risciacqui, lavando separatamente ugelli e filtri per essere certi di aver eliminato qualsiasi traccia del prodotto.
- Non riusare gli imballaggi che contenevano il prodotto, ma distruggerli e sotterrarli.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche generali

L'erbicida KROVAR I è una polvere bagnabile in acqua da impiegare come diserbante totale delle aree non coltivate.
Il KROVAR I controlla le erbe annuali e alle dosi più alte le perenni.
L'effetto sulle perenni è lento da vedersi, cioè fino a quando il prodotto non raggiunge, per mezzo dell'umidità, la zona delle radici delle infestanti.
L'umidità è necessaria per attivare l'erbicida; i migliori risultati si ottengono quando il trattamento viene fatto su terreno umido o quando, dopo il trattamento, cadono delle piogge o vengono praticate delle irrigazioni.
Il grado di efficacia e la durata dell'effetto diserbante variano quindi secondo la quantità di prodotto usata, il tipo di terreno, le piogge e le irrigazioni.
Il trattamento si può effettuare con qualsiasi tipo di pompa fornita di agitatore. Anche dopo aver disciolto il prodotto nella pompa è necessario mantenere attiva l'agitazione per ottenere una perfetta sospensione del prodotto. Prima di trattare, determinare la quantità di acqua necessaria per poter effettuare un trattamento uniforme su tutta la superficie. Secondo la pompa usata, sono necessari da 1.000 a 1.500 l di acqua per ettaro.

Dosi d'impiego

Per un controllo di breve durata di erbe annuali in aree non coltivate, usare da 2 a 6 kg per ettaro di KROVAR I.
Per un controllo più prolungato di erbe annuali ed un controllo di alcune perenni, come gramigna e cipero, usare da 7 a 18 kg per ettaro.
Per un controllo di erbe annuali e perenni difficili da distruggere, usare da 19 a 40 kg per ettaro.

Usare le dosi più elevate nei terreni ad alto potere di assorbimento (terreni con elevato contenuto in materia organica o torbosi).
I migliori risultati si ottengono quando il trattamento viene effettuato subito prima dell'emergenza delle erbe o durante lo stadio iniziale di crescita delle stesse.
Nel caso si avesse ricrescita nelle aree trattate, ripetere il trattamento usando 2-6 kg/ha di KROVAR I.

DA NON USARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il KROVAR I è compatibile con i più comuni erbicidi. Non miscelare con fertilizzanti, insetticidi o fungicidi.
Avvertenza
In caso di miscela con altri formulati, devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Per evitare di danneggiare o distruggere alberi o colture che si desidera mantenere, è necessario attenersi alle seguenti norme:
- Non applicare o scaricare o lavare gli attrezzi sopra o vicino alle piante desiderate, sulle superfici dove si estendono le loro radici, in luoghi dove il prodotto può essere trasportato a contatto delle loro radici.
- Non usare il prodotto su prati, campi sportivi o simili aree.
- Evitare che spruzzi della miscela bagnino le piante che si desidera mantenere.
- Evitare di applicare il prodotto in giornate ventose, per non causare danni alle colture vicine.
- Evitare il contatto con le sementi.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per i pesci.
Tenere lontani, durante i trattamenti, animali domestici, bestiame e persone non protette.

Attenzione: da non usare su terreni destinati ad uso alimentare.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.p.A.

20093 Cologno Monzese (MI) - Via A. Volta, 16 - Tel. (02) 253021.

Officina di produzione

E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Wilmington, Delaware (U.S.A.)

Registrazione n. [illegible] del Ministero della Sanità del [illegible]

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso kg 1

5658

CLASSE III

EVERGREEN®

Concime e diserbante per il prato di essenze graminacee

Composizione per g. 100 di prodotto: 2,4-D g. 0,62 puro e Dicamba g. 0,084 puro entrambi sotto forma di sali di dimetilamina, dispersi in un fertilizzante a base di torba con la seguente analisi: azoto (N) 14%; acido fosforico (P_2O_5) solubile in acqua 3,5%, insolubile in acqua 0,5%; potassa (K_2O) 4%.

" ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA „

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali:

— Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
— Conservare la confezione ben chiusa;
— Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto;
— Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
— Non operare contro vento;
— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
— Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico:

Avvelenamento per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole, aritmia, fibrillazione atriale e ventricolare, ipotensione, dermatiti da contatto, senso di costrizione toracica, cefalea, vertigini, convulsioni, coma.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: abbondante lavaggio gastrico, ossigenoterapia, sedativi, diuretici, solfato di chinidina, pomate cortisoniche per le dermatosi.
Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

Modalità d'impiego:

Perché usare Evergreen della Fisons?

Un tappeto erboso richiede un nutrimento regolare per crescere pulito e restare sano. Le erbacce possono essere un problema in qualsiasi prato ed è necessario un trattamento con erbicida per assicurarne un completo controllo. EVERGREEN Fisons è stato studiato per nutrire e diserbare in una sola operazione. EVERGREEN contiene 2 efficaci diserbanti che sono innocui per il prato, pur uccidendo tutte le maggiori erbe infestanti. La nuova erba riempie velocemente i vuoti lasciati dalle erbacce morte, per produrre un tappeto erboso ricco, verde e libero da erbacce.

Le chiavi del successo

Tagliare regolarmente l'erba del prato e rimuovere l'erba tagliata. Stare attenti a non togliere lo scalpo al prato rasandolo troppo basso. Riapplicare EVERGREEN, se le erbacce persistono. In autunno, rastrellare il prato per rimuovere l'erba morta e forarlo per areare il terreno.

Istruzioni per l'uso

1. Usarlo in qualsiasi momento da aprile a settembre, eccettuato quando l'erba è bagnata o durante la siccità.
2. I risultati sono migliori se il prato non viene tagliato 2-3 giorni prima e dopo il trattamento.
3. Per assicurare una effettiva presa dell'erbicida, evitare di usarlo quando la pioggia è probabile entro le successive 24 ore.
4. I prati nuovi non devono essere trattati con EVERGREEN per i primi 6 mesi.
5. Applicare EVERGREEN uniformemente nella dose di 35 grammi al mq.
6. Se non piove dopo 2 giorni, inaffiare il prato per far penetrare il fertilizzante nel terreno.
7. Non è consigliabile utilizzare l'erba dei primi 4 tagli per concimare, a meno di lasciarla in composto per 6 mesi.

Applicazione a mano

Per una accurata applicazione usare 2 pezzi di corda per segnare una corsia larga un metro lungo il prato. Quindi spargere 35 gr. di prodotto per ogni metro tra le due corde. Spostare quindi alternativamente le corde attraverso il prato affinché l'intera area sarà stata trattata.
Per ulteriori chiarimenti sulla cura del prato, contattare un esperto Fisons.

«Da non applicare con mezzi aerei»

Da non miscelare con altri antiparassitari.
Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali: la vite, gli alberi da frutta, gli ortaggi ecc. Evitare che il prodotto giunga a contatto con tali colture.
Il prodotto è nocivo ai pesci, agli animali domestici e al bestiame.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Registrato da: Fisons S.p.A.
Via Leopoldo Serra, 32
00153 ROMA (Italia)

Fabbricato da: **Fisons Limited**
Horticulture Division
Paper Mill Lane,
Bramford, Ipswich,
(England)

Registrazione del Ministero della Sanità N. .... del ....

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto: kg. 14,0

® EVERGREEN è marchio commerciale della Fisons Limited

5659

CLASSE III
ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

LIQUIDO EMULSIONABILE - diserbante selettivo per la barbabietola da zucchero e lo spinacio.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Cycloate p.a. puro 72,7 g
Tensioattivi e solventi q.b. a 100 g
Contiene «XILOLO»

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
– Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. – Conservare la confezione ben chiusa. – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. – Non contaminare alimenti e bevande o corsi di acqua. – Non operare contro vento. – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. – Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione e per contatto cutaneo (inibitore della colinesterasi).

Sintomi di intossicazione
Nausea - vomito - diarrea - sciallorrea - dispnea - lacrimazione - tremori - convulsioni - miosi - bradicardia - edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima condizionati al caso
Lavaggio gastrico con bicarbonato di sodio - lavaggio cutaneo se vi fu contatto - atropina solfato (mg. 2) ogni quarto d'ora per via intramuscolare da ripetersi secondo il bisogno.
Attenzione a non somministrare dosi eccessive di atropina, specialmente ai bambini. - Ossigenoterapia se vi è cianosi. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al Centro di rianimazione.

Controindicazioni
Ossime (PAM, Contrathion, ecc.) che potrebbero essere nocive.

CARATTERISTICHE
L'EXILIN controlla una vasta gamma di infestanti graminacee ed a foglia larga quali: Lolium sp., Echinochloa spp (Giavone),Digitaria spp. Avena selvatica, Solanum spp., Chenopodium album, Portulacaoleracea, Amaranthus retroflexus, Capsella bursa pastoris, Setaria spp., Lamium spp., Cyperus spp., Dactylis glomerata, Sorghum halepense (da seme).
Il prodotto una volta incorporato nel suolo agisce contro le malerbe principalmente nella fase di germinazione, rispettando la coltura.

MODALITA' DI IMPIEGO
L'EXILIN va impiegato in pre-semina della coltura con incorporamento nel terreno ben livellato e sminuzzato alle seguenti dosi:
– su terreni leggeri e sabbiosi : 5 lt/ha
– su terreni argillosi e ricchi di humus: 7 lt/ha.

Il prodotto va distribuito con una quantità di acqua che varia da 350 a 900 lt per ettaro a pressioni non oltre le 5 atmosfere. L'incorporamento alla profondità di ca. 5-8 cm deve essere eseguito entro la prima mezz'ora dalla distribuzione, con erpici a dischi o a denti o zappe rotanti. Usando erpici è bene eseguire due passaggi incrociati, dopo di che può essere effettuata la semina. Per lo spinacio è necessario eseguire, dopo la semina, una rullatura del terreno per favorire l'emergenza.
In presenza delle colture è possibile una leggera lavorazione del terreno senza superare mai la profondità di incorporamento.
Lavare accuratamente gli utensili agricoli impiegati per il diserbo, se possibile usare una pompa esclusivamente per diserbare.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire il prodotto nella quantità di acqua necessaria al trattamento mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
L'EXILIN non può essere miscelato con fertilizzanti, insetticidi ed anticrittogamici.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Far trascorrere 110 giorni dal trattamento prima di seminare la carota.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano - via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA SPA - Bolzano - via Siemens 12

Registrazione N. del del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto lt 1

5660

CLASSE IV

LENAMON 80 P.B.

POLVERE BAGNABILE
Diserbante per la barbabietola da zucchero e da foraggio e per lo spinacio

CONSCZIONE
100 grammi di prodotto contengono
Lenacil p.a. puro g 80

Bagnanti, disperdenti ed inerti q.b. a g 100

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Il LENAMON 80 P.B. combatte le comuni infestanti da seme in fase di pre- e post-emergenza. Sfuggono al controllo Amaranthus, Galium, Veronica e Euphorbia e tutte le infestanti perenni

MODALITA' DI IMPIEGO
Pre-semina con interramento ad erpice leggero alla profondità di 2-3 cm: terreni di medio impasto Kg 0,75/ha, terreni pesanti Kg 1/ha.
Pre-semina Kg 1/ha
Post-emergenza Kg 0,8 - 1/ha in miscela con il BEDIFAM che completandolo ne aumenta la persistenza. In questo caso la bietola deve avere emesso, al momento del trattamento, le prime due foglie vere. Per lo spinacio non superare mai le dose di Kg 1/ha
E' sconsigliabile l'impiego del LENAMON 80 P.B. nei terreni sciolti o sabbiosi e torbosi.

Avvertenze per l'Impiego: E' essenziale il buon funzionamento degli apparecchi usati per il diserbo e l'uniformità della distribuzione. Evitare di ripassare sul terreno già trattato.
Data la scarsa solubilità in acqua è necessario provvedere, se entro due settimane non sono caduti 10-15 mm' di pioggia, ad una irrigazione a pioggia.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta. A causa della notevole persistenza nel terreno del LENAMON 80 P.B., il terreno trattato può essere destinato solo alla coltura della barbabietola e dello spinacio.

COMPATIBILITA'
Il LENAMON 80 P.B. non è miscibile con sostanze e/o prodotti a reazione alcalina

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 30 gg. prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano - Via Siemens 12

Registrazione N. del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

5661

Sepraform PS

INSETTICIDA IN POLVERE SECCA

Composizione: g 100 di prodotto contengono:
— DIAZINONE puro . . . . g 2
— CARBARYL puro (esente da β-naftolo) . . g 4
— Coformulanti e inerti q.b. a . . . . g 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA!

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi di acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavare accuratamente con acqua e sapone. Evitare di respirare i vapori.
INFORMAZIONI PER MEDICO: avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.
Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialarrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazione muscolari, convulsioni ed edema polmonare.
Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente epossia, con cianosi e dispnea praticare subito respirazione artificiale o assistita ed ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti e 0,2-1 mg per i bambini) ogni 10 minuti fino alla scomparsa dei fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Lavanda gastrica con bicarbonato di sodio e lavaggio cutaneo se vi è stato contatto.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, le ossime, latte, olio e grassi.

Caratteristiche: il **SEPRAFORM** è un insetticità a largo spettro d'azione, adatto per trattamenti a secco sulle colture floreali e ornamentali, in pieno campo e per la disinfezione del terreno destinato a tali colture. Distribuito uniformemente sulle parti delle piante da proteggere, agisce sui parassiti per contatto e per ingestione.
Indicazioni: il **SEPRAFORM** è indicato sui ciclamini, azalee, crisantemo, dalia, garofano, geranio, giacinto, tulipano, gladiolo, iris, pianta di vetro (impatiens), pisello odoroso, rosa, viola del pensiero, aparago ornamentale, edera variegata per **AFIDI;** ciclamino, gladiolo, iris, ortensia, poinsettia, begonia, felci, per **TRIPIDI;** narciso, azalee, geranio, rosa, colens, felci, per **MOSCA BIANCA;** oleandro, poinsettia, rosa, colens, croton, felci, edera variegata, ficus, filodendro, palma, piante grasse (euforbia, aloe, echino-cactus, semprevivum, sanseveria), per **COCCINIGLIE;** crisantemo, ortensia, salvia splendes, per **CIMICI;** giglio, viola del pensiero, asparago ornamentale, per **CRIOCERA;** garofano, per **BEGA VERDE;** dalia, per **FORBICINA;** gladiolo ed iris, per **NOTTUE;** rosa, per **TENTREDINI;** violacciocca, per **ALTICHE;** violacciocca, per **LEPIDOTTERI NINATORI.**
Dosi e modalità d'impiego: kg 30 per ettaro, per trattamento a secco delle colture floreali; per le colture ornamentali aumentare la dose in rapporto alla massa di vegetazione da trattare. E' consigliabile eseguire i trattamenti di primo mattino in quanto la umidità favorisce l'adesione del prodotto: kg 70 per ettaro per geodisinfestazioni contro parassiti del terreno destinato a tali colture.

« DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI »

Compatibilità: il **SEPRAFORM** è compatibile con i più comuni antiparassitari di sintesi.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si vocificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività: il prodotto è novico per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso e pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Reg. Ministero Sanità n. 5661 del 28.12.83

DA NON VENDERSI SFUSO **Peso g 100**

SEPRAN s.r.l.
36033 ISOLA VICENTINA (VI) Via Cogolla, 5
Telefono N.: (0444) 558.169 - 558.199

Stabilimento di Albano S. A.
Prodotto da **« DIACHEM S.p.A. » - Bergamo**

5662

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni per il medico: avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e per contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso: in caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti; 0,2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione, una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore. Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MALAC

INSETTICIDA

Composizione per 100 g. di prodotto:

— Malathion puro g. 50

— Emulsionanti, solventi e bagnanti q. b. a g. 100
Contiene Xilolo

CLASSE III

ATTENZIONE

MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMIA S.p.A.

Prodotto nello stabilimento CHEMIA S.p.A.
di S. Agostino (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Registraz. n. 5662 del 28.12.83 del Ministero della Sanità

Kg. 1

Il MALAC è un insetticida efficace nella lotta contro varie specie di insetti che infestano le seguenti colture:
- melo contro: afidi, carpocapsa, antonomo, ricamatrici, tingidi, tortricidi, mosca;
- pero contro: psilla, tingidi, carpocapsa, ricamatrici, tripidi, tortricidi, tentredini, afidi, mosca;
- pesco contro: cidia, anarsia, tripidi, cocciniglie, afidi mosca;
- susino contro: tignola, mosca, ricamatrici;
- ciliegio contro: mosca, ricamatrici;
- albicocco contro: mosca, afidi, cocciniglie, cidia;
- mandorlo contro: monosteira, afidi, cocciniglie, campa;
- nocciolo contro: afidi, cocciniglie, cimici;
- arancio, mandarino, pompelmo, limone, cedro contro: afidi, cocciniglie, mosca, oziorrinco;
- vite contro: tignola, tignoletta, oziorrinco, sigaraio, cicalina;
- olivo contro: fleotribo, tignola, mosca, oziorrinco;
- platano contro: tingide;
- bietola contro: afidi, mosca, altica, casside;
- patata, pomodoro contro: afidi, cimici, tripidi;
- insalata, radicchio, carciofo, spinacio, cavolo, pisello, fagiolo, fava, zucca, melone, cocomero, carota, cipolla, aglio, prezzemolo, sedano, cardo, fragola contro: afidi, mosche, nottue, cavolaie, tripidi, apionidi, cimici, punteruoli, oziorrinchi, tortrici, fitonomi,
- erba medica contro: fitonomi, misurini, afidi, apionidi;
- grano, orzo, avena, mais contro: afidi, nottue, cecidomie, tripidi;
- rosa, garofano, crisantemo, oleandro, gladiolo, ciclamino, ortensia solo in pieno campo contro: afidi, tripidi, aleurodi, cecidomie, cetonie, bega del garofano, cicaline, criolere, nottue, tentredini, oziorrinchi, tignole, tortrici, cocciniglie negli stadi giovanili.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Il MALAC va disperso in dosi variabili da g. 80 a g. 300 in 100 litri di acqua, secondo i parassiti da combattere ed il grado di infestazione dei medesimi.
Da non applicare con mezzi aerei.

Compatibilità: il MALAC è miscibile con tutti gli antiparassitari che si trovano in commercio, ad eccezione di quelli a reazione alcalina.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: il MALAC è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame. Sospendere i trattamenti 20 gg. prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON VENDERSI SFUSO

5663

Natura dei rischi di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Non operare contro vento - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: astenia di grado notevole - aritmia - fibrillazione atriale e ventricolare - ipotensione - dermatiti da contatto - senso di costrizione toracica - cefalea - vertigini - convulsioni - coma.

Consigli terapeutici: abbondante lavaggio gastrico; ossigeno-terapia - sedativi - diuretici - solfato di chinidina - pomate cortisoniche per le dermatosi.

Controindicazioni: è sconsigliata la digitale.

FITODIS DSD

DISERBANTE TOTALE

Composizione per 100 g. di prodotto:

— Dalapon puro	g. 15
— Simazina pura	g. 35
— 2,4 D puro	g. 5
— Coformulanti	q. b. a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CHEMIA S.p.A.

Prodotto nello stabilimento CHEMIA S.p.A.
di S. Agostino (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Registraz. n 5663 del 28.12.83 del Ministero della Sanità

Peso Kg. 1

Caratteristiche: il FITODIS DSD è un erbicida d'impiego post-emergenza che combatte le erbe infestanti degli incolti, le aree civili ed aree industriali.

EPOCHE E DOSI D'IMPIEGO
Il trattamento può essere effettuato dallo stadio minimo delle infestanti fino all'autunno. Le dosi d'impiego sono FITODIS DSD g. 1,5-3 per mq. di area da diserbare. Il FITODIS DSD si prepara disperdendo il prodotto in acqua, indi distribuirlo con apposita pompa.

Avvertenze ed uso: Il FITODIS DSD non si impiega su nessuna coltura, dopo l'uso lavare accuratamente l'irroratrice e l'attrezzatura impiegata.

Miscibilità: il prodotto va usato da solo.
Da non applicarsi con mezzi aerei.

Fitotossicità: Il prodotto è fitotossico. Evitare che il prodotto giunga a contatto con le colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.
Dal trattamento erbicida alla eventuale semina di colture occorre un intervallo di 7 mesi per il frumento e di almeno 12 mesi per le altre colture.
Non ripetere il trattamento prima di 12 mesi.

Nocività: il prodotto è nocivo per gli insetti utili, animali domestici, pesci e bestiame.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5664

CLASSE I

VELENO

RODAMON® ES

ESCA RODENTICIDA PRONTA PER L'USO E PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE IN APERTA CAMPAGNA

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Chlorophacinone p.a. puro gr. 0,006
Supporti vegetali, conservanti, coloranti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255.

NATURA DEL RISCHIO

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Evitare di respirarne i vapori. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. — Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. — Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrandole in fosse profonde più di un metro e cospargendole con calce viva). — In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento grave per ingestione.

Sintomi di intossicazione: emorragie cutanee e delle mucose - ematuria. Neutralizza la vitamina K, per cui a livello epatico si blocca la formazione di protombina. La sintomatologia è pertanto prevalentemente emorragica.

Consigli terapeutici di massima e condizionati al caso:
vitamina K, vitamine C e P, consigliabili emotrasfusioni in casi gravi.

CARATTERISTICHE:

Il RODAMON® ES è un'esca rodenticida a base di cereali, molto adatta per l'impiego in campo aperto, efficace contro le più comuni specie di ratti e topi.

Questi rodono graminacee e leguminose da foraggio, così nei campi di cereali si formano chiazze nude. Attaccano tuberi di patate, radici di bietole, di rape e non risparmiano nemmeno la corteccia delle radici e del colletto delle piante da frutto. Causano danni tracciando gallerie sottorraneee in ogni direzione. Anche sotto la neve continuano la loro azione scavatrice e roditrice. I roditori, una volta ingerita una sufficiente quantità di esca, muoiono per emorragia interna senza dolorosa agonia

Il RODAMON® ES non provoca nei ratti alcuna repulsione né per l'esca né per il veleno. Essi continueranno a cibarsene finché lentamente ma sicuramente giungeranno a morte

MODALITA' DI IMPIEGO

Distribuire il RODAMON® ES nei luoghi più battuti dai roditori in quantità abbondante - gr. 200-500 per luogo, in modo che tutti i roditori possano cibarsene.
L'esca viene posta in luoghi un po' protetti dalle intemperie, consigliamo di coprirla con una scatola rovesciata ed alzata da un lato, oppure di disporla nei box appositamente studiati a tale scopo. Controllare di tanto in tanto se l'esca è stata completamente mangiata ed in tal caso rinnovarla

Non toccare mai l'esca con le mani perché i ratti ed i topi fiutano e diffidano di ogni odore estraneo.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

RISCHI DI NOCIVITA'

Il RODAMON® ES è tossico per gli animali domestici, il bestiame ed i pesci.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE

AMONN FITOCHIMICA S.p.A. Stabilimento di Bolzano - Via Siemens 12

Registrazione N. del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg. 1

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

5665

CLASSE III

NEBUTRIN® N

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE. Diserbante selettivo di pre-emergenza per i cereali.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
20 gr. di Terbutrin puro
30 gr. di Neburon puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il NEBUTRIN® N è un erbicida specifico per il diserbo dei cereali in pre-emergenza della coltura e delle infestanti. Il NEBUTRIN® N combatte efficacemente infestanti graminacee e dicotiledoni quali Alopecurus, Apera spica-venti, Poa, Echinocloa, Atriplex, Ambrosia, Capsella, Oxalis, Papaver, Polygonum, Portulaca, Sonchus, Chamomillla, Stellaria, Veronica, Lamium, mantenendo una perfetta selettività.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Frumento tenero, segale, orzo, avena - dose media Kg 4-6 per ettaro, distribuiti con almeno 500 lt d'acqua per ettaro. Usare la percentuale più bassa nei terreni sciolti e quella più alta nei terreni più pesanti.

Il trattamento con NEBUTRIN® N va effettuato dopo la semina dei cereali prima dell'emergenza dei cereali e delle infestanti. Non ripetere il trattamento prima di 6 mesi.

L'efficacia erbicida è migliore su terreno ben lavorato, privo di zolle, con elevato grado di umidità del suolo al momento del trattamento o dopo la sua esecuzione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Stemperare il prodotto in poca acqua e quindi portare a volume mescolando bene.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il NEBUTRIN® N è miscibile in via di massima con i più comuni fitofarmaci.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE

AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano - Via Siemens 12

Registrazione N. del del Ministero della Sanità.

DA NON VENDERSI SFUSO

Contenuto Kg 1

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

5666

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

TRICLORAC

Diserbante a base di Tricloroacetato di sodio (TCA) per la distruzione di graminacee infestanti e di piante acquatiche.

Composizione per 100 grammi di prodotto:

— TCA sodio puro g. 95

— Supporti, coadiuvanti . q.b. a g. 100

CLASSE IV

CHEMIA S.p.A.

Prodotto nello stabilimento CHEMIA s.p.a. di S. Agostino (FE) - S.S. 255 - Km. 46

Registraz. N. [illegible] del [illegible] del Ministero della Sanità

Peso Kg. 1 netto

CARATTERISTICHE

Il TRICLORAC è un diserbante con azione specifica contro le più diffuse graminacee annuali e poliennali; viene assorbito dalle erbe per ca. il 30% per via fogliare e per ca. il 70% per via radicale. Mentre le graminacee muoiono completamente dopo un periodo di tempo più o meno lungo, le erbe a foglia larga vengono danneggiate solo temporaneamente. Se si desidera distruggere tutta la vegetazione presente si può impiegare il TRICLORAC in combinazione con diserbanti specifici contro infestanti a foglia larga, per esempio: 2.4-D, MCPA, clorato di sodio, ottenendo in tal modo una azione erbicida totale altamente efficace.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

— **Diserbo acquatico contro:** canna palustre, (Phragmites communis, giunchi e carici, nei canali con acqua preventivamente portata a basso livello. Kg. 200-300 per ettaro in 2000-3000 litri d'acqua.

Con una concentrazione sufficientemente alta il prodotto viene assorbito dalle foglie e particolarmente dalle radici. Dopo alcuni mesi il prodotto provoca la decomposizione del sistema radicale e arresta contemporaneamente lo sviluppo di nuovi getti nella primavera successiva.

Il periodo più favorevole per questo tipo di lotta è in autunno, quando la canna emette le pannocchie; si consiglia di aggiungere alla poltiglia diserbante un bagnante adesivo. La lotta contro i giunchi ed i carici si esegue su terreno umido però non coperto d'acqua.

— **Diserbo di incolti:** per la distruzione delle graminacee su strade, canali di scolo, fossi, aeroporti, campi da gioco, aree industriali. Kg. 200 per ettaro in 600-1000 litri d'acqua.

— Diserbo di superficie destinate a coltivazione di **bietola, colza, fava, medica, lino, patata, pisello** e colture di **melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo, vite** .

— **Bietola:** per la distruzione delle graminacee in pre-semina e pre-emergenza, da solo o in miscela con gli usuali erbicidi ad azione contro le infestanti a foglia larga. Kg./Ha 7-10 in 400-800 litri di acqua per ettaro.

— **Medica:** per la distruzione delle graminacee sui medicai di vecchio impianto, usato da solo, con interventi autunno-invernali Kg. 7-10/Ha in 400-800 litri di acqua per ettaro.

— **Altre colture:** per la distruzione delle graminacee Kg. 30/Ha su terreni leggeri e Kg. 50/Ha su terreni pesanti, sciolti in 800-1000 litri d'acqua per ettaro, a condizione che successivamente si semino sarchiate e oleose e le seguenti altre colture con un intervallo di: 6 settimane per la patata, medica e bietole; 8 settimane per fave e pisello.

Per combattere efficacemente la gramigna ed altre erbe rizomatose su superfici destinate alle colture sopra indicate si raccomanda di eseguire una lavorazione al terreno prima del diserbo. Si consiglia di arare il terreno in modo che la massa predominante dei rizomi venga portata alla superficie o almeno a pochi centimetri di profondità.

Il prodotto verrà quindi irrorato su terreno umido alla dose di 30 Kg./Ha in 600-800 litri d'acqua. Per la distruzione di queste erbe particolarmente moleste e resistenti si consigliano due trattamenti in autunno con un intervallo di 4-6 settimane (1° trattamento 20-30 Kg./Ha; 2° trattamento 15-25 Kg./Ha).

Per il diserbo dei terreni investiti pure a fruttiferi e vite irrorando il TRICLORAC, si deve mantere una distanza di 2-3 metri dalle piante.

I cereali, essendo graminacee, sono molto sensibili al prodotto e quindi non si potrà distribuire neppure una bassa concentrazione di TRICLORAC sul terreno destinato a dette colture.

Il TRICLORAC agisce sicuramente se irrorato su un terreno umido; l'estrema siccità rallenta l'azione erbicida del prodotto. Si consiglia di fare i trattamenti possibilmente dopo una pioggia o una irrigazione.

Il TRICLORAC è facilmente solubile in acqua e pertanto tende ad agglomerarsi qualora sia conservato in un luogo umido senza comunque che la sua efficacia diminuisca in alcun modo; in tal caso prima dell'impiego sarà sufficiente sminuzzare i glomeruli più grossi.

Il TRICLORAC si irrora con le normali pompe irroratrici a medio ed alto volume d'acqua comunemente usate per il diserbo, impiegando ugelli a getto sottile ed uniforme.

Per effettuare la diluizione del prodotto, versarlo direttamente in un certo quantitativo d'acqua predisposto ed agitare energicamente.

Miscibilità: il TRICLORAC, secondo le nostre attuali cognizioni, è miscibile con diserbanti specifici contro infestanti a foglia larga, per esempio 2.4-D, MCPA, DYRAZON, clorato di sodio.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti **20 giorni prima del raccolto.** Durante la manipolazione del prodotto si dovranno indossare abiti ed occhiali protettivi ed. eventualmente respiratori (o semimaschere).

Conservare il prodotto in luoghi asciutti ed in recipienti chiusi.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Avvertenza: il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

5668

TERSOL-G

INSETTICIDA GRANULARE DEL TERRENO

COMPOSIZIONE

— ISOFENFOS puro	gr. 4
— FOXIM puro .	gr. 2
— Inerti	q. b. a gr. 100

Contiene glicole etilenico e dietilenico

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEL RISCHIO

Sostanza pericolosa per inalazione. per ingestione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle. gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione. lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione. inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione: Lacrimazione. miosi. scialorrea. vomito. dolori addominali. diarrea. spasmi bronchiali. dispnea. bradicardia. ipotensione. fibrillazioni muscolari. convulsioni. edema polmonare.

Consigli terapeutici: In caso di evidente ipossia. con cianosi e dispnea. praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia. Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1-2 mg per gli adulti - 0.2-1 mg per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione. una media atropinizzazione può essere continuata per 24-48 ore. Associare pralidossina metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta. Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi. Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina. teofillina. aminofillina. coramina. latte. olio e grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Kg. 12-15 ettaro localizzato lungo le file di semina poi subito interrato.

Kg. 50-60 ettaro a spaglio su tutta la superficie poi subito interrato.

Controlla Elateridi, Grillotalpa. Maggiolini. Mosca del cavolo. della cipolla. del carciofo. dell'asparago. Viene consigliato come geodisinfestante del terreno prima della messa a coltura di: **Patata. Pomodoro. Frumento. Peperone. Cavolo. Melanzana. Cipolla. Aglio. Carciofo. Tabacco.**

Il prodotto si può impiegare solo in **pre-semina** o **pre-trapianto.**

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto è compatibile con tutti i nematocidi e fungicidi del terreno purchè abbiano reazione neutra.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

VISPLANT - CHIMIREN s.r.l.
Castelmaggiore (BO)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (Fe)

Registrazione n. del del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto Kg. 25

5669

AGERPAX 80

Diserbante contro Digitaria, Panico, Setaria e Dicotiledoni annuali nelle coltivazioni di mais.

COMPOSIZIONE:

AMETRINA puro	gr. 80
Coadiuvanti e bagnanti q.b. a	gr. 100

CLASSE III

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio di intossicazione: sostanza pericolosa per ingestione, inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici, conservare la confezione ben chiusa; non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto, non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua; non operare contro vento; evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti; dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Informazioni Mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Modalità d'impiego: effettuare i trattamenti quando non c'è vento per evitare la contaminazione delle colture vicine a quelle trattate. Controllare prima e dopo il trattamento il funzionamento dell'apparecchio irroratore facendolo funzionare con acqua.

Non trattare i mais da seme.

Se l'AGERPAX 80 è usato in post-emergenza la irrorazione deve coprire tutta la superficie del campo compresi i solchi di semina, ma senza toccare le foglie superiori e senza entrare nel cono del mais. Il getto della barra irroratrice deve essere inclinato di circa 45° rispetto al suolo per permettere di passare più facilmente sotto il cono e di avere, nonostante la limitata altezza (20 cm.) una superficie di lavoro sufficiente o usare ugelli schermati. L'AGERPAX 80 è assorbito in modo particolare dalle parti aeree delle foglie delle malerbe, pertanto effettuare una abbondante irrorazione per trattare tutta la vegetazione da distruggere.
Il trattamento deve essere effettuato a bassa pressione e la velocità di avanzamento medio deve essere di 4-5 Km/ora.

Dosi di impiego: Kg. 2-3/ha in terreni leggeri o scarsamente infestati. Kg. 4-5/ha in terreni duri o fortemente infestati. Lo quantità di acqua deve essere 800 litri/ha.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Compatibilità: si consiglia di impiegare l'AGERPAX 80 da solo.

Fitotossicità: il prodotto è fitotossico per la coltura per cui viene proposto. Usare molta precauzione anche applicando ugelli protettori. Inoltre è fitotossico per arboree, fruttiferi e viti e pertanto non contaminare tali colture. Le pompe e gli utensili impiegati per il diserbo non devono essere usati per altri trattamenti antiparassitari se non siano stati preventivamente lavati con acqua e soda.

Nocività: il prodotto è nocivo per i pesci e pertanto non impiegarlo come diserbante acquatico e non contaminare i fiumi, laghi e canali.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGER CHEMICAL s.r.l.

Via Nomentana, 299 - ROMA

Stabilimento di produzione: ANIC AGRICOLTURA S.p.A. - CARRARA-AVENZA (MS)

Registrazione del Ministero della Sanità n. del

DA NON VENDERSI SFUSO

5671

APPONON

FITORMONE

per la prevenzione della cascola di pere e mele e per intensificarne la colorazione

CLASSE III

ATTENZIONE
Manipolare con prudenza

COMPOSIZIONE

g 100 di Apponon contengono:
g 1,8 di NAA puro;
diluenti quanto basta a 100.

Natura del rischio: sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

Norme precauzionali: conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. **Informazioni mediche:** in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Dose d'impiego: su meli e peri si deve intervenire quando si notano i primi sintomi della cascola — generalmente 15-20 giorni prima della raccolta — alla dose dello 0,1%.

N.B. - La dose si riferisce all'impiego con pompe a volume normale.
Sui meli è possibile ripetere l'irrorazione se dovesse continuare la caduta dei frutti.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità: l'Apponon è miscibile con gli antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, ed agli animali.

BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

Officina di produzione: Garbagnate Milanese

Registrazione Ministero Sanità n. 5671 **del** 28-12-83

DA NON VENDERSI SFUSO

Conservare al fresco e al riparo dalla luce

Kg 1

BAYER AG - LEVERKUSEN (GERMANIA)
Divisione Agraria
Concessionaria:
BAYER ITALIA S.p.A. - MILANO

5674

IV CLASSE TOSSICOLOGICA

R 6 STOP F

Fungicida
Polvere bagnabile

Composizione:
Gr. 100 di prodotto contengono:
Gr. 8,4 di Cimoxanil puro.
Gr. 63,99 di Folpet puro.
Sostanze inerti e colorante q.b. a 100.

Norme precauzionali:

- Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici;
- non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua;
- dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione:
Azione irritante sul tratto gastro-intestinale con dolori addominali bruciori gastroesofagei e diarrea.
Eczemi cutanei da fotosensibilizzazione resistenti alle terapie.
Possibilità di collasso cardiocircolatorio con ipotensione, cianosi, aritmia.
Terapia:
Lovanda gastrica con magnesia usta (gr. 30 per litro di acqua) e digitale.

CARATTERISTICHE

L'R6 STOP F è un fungicida in polvere bagnabile efficace contro la peronospora della vite, della patata e del pomodoro.

Agisce sia penetrando nella foglia che per contatto, combattendo sia il micelio nei primissimi stadi di sviluppo, che le zoospore germinanti.

Può essere impiegato in calendario antiperonosporico per tutta la stagione non producendo fenomeni di fitotossicità o rallentamenti e riduzioni vegetative.

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: 00136 ROMA
Viale degli Ammiragli n. 91 - Telefono 63.79.051
UFFICIO TECNICO NAZIONALE: 40138 BOLOGNA
Via B. Provaglia, 3 - Tel. 53.32.68
STAB.: Paganica (L'Aquila)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Formare una pasta semi-liquida sciogliendo la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente tenendo la miscela in costante agitazione.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Peronospora della vite: usare 150 gr. di prodotto ogni 100 lt. di acqua.

Iniziare i trattamenti preventivi non appena la vite ha raggiunto lo stadio vegetativo in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire per il resto della stagione.

Peronospora della patata e del pomodoro: usare 150 gr. di prodotto per 100 lt. d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra e acida. Non è miscibile con poltiglia bordolese, polisolfuri e olio bianco

Avvertenza:
I trattamenti devono essere distanziati di almeno 20 giorni dai trattamenti con prodotti a base di olii minerali e polisolfuri.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per i pesci.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima del raccolto su uve da tavola, patata, pomodoro, e 40 giorni sulle uve da vino, per non ostacolare la fermentazione dei mosti

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

« Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali ».

DA NON VENDERSI SFUSO

Reg. n. 5674 **Ministero della Sanità del** 28-7-84

Contenuto netto kg.

2 83

5675

CLASSE III

LINURON 50 AMONN

ATTENZIONE: DA MANIPOLARE CON PRUDENZA

POLVERE BAGNABILE
Diserbante selettivo per le colture di cereali, mais, patata, carota, sedano, finocchio, prezzemolo, rapa, fagiolo, fagiolino e fragola.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
50 gr. di Linuron puro
Bagnanti, disperdenti ed inerti quanto basta a 100 grammi.

NATURA DEL RISCHIO
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. — Conservare la confezione ben chiusa. — Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. — Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. — Non operare contro vento. — Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. — Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Irritante per la cute. L'ingestione può provocare bruciori gastroesofagei, vomito, diarrea, subittero, albuminuria ed ematuria.

Terapia
Per le dermatosi pomate cortisoniche od antistaminiche. Non è consigliabile la lavanda gastrica. Si consigliano fleboclisi glucosate, potassio, epato-protettori.

CARATTERISTICHE
Il LINURON 50 AMONN è un diserbante selettivo per la distruzione delle specie erbacee annuali infestanti le colture di cereali, mais, patate, carote, sedano, finocchio, prezzemolo, rapa, fagiolo, fagiolino e fragola ed esplica la sua azione sia per via fogliare sia per via radicale.
Le infestanti controllate sono: l'Amarantus retroflexus, Anagallis, Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp., Galinsoga parviflora, Digitaria sanguinalis, Echinocloa crus-galli, Euphorbia spp, Matricaria chamomilla, Mercurialis annua, Papaver, Plantago major, Polygonum convolvulus e persicaria, Portulaca oleracea, Ranunculus, Senecio, Setaria spp, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica spp.
Il LINURON 50 AMONN non controlla le erbe perennanti con apparato radicale bulboso, profondo e rizomatoso come Cynodon dactylon, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Equisetum arvense, Scirpus maritimus, Sorghum halepense, Taraxacum officinalis.
La persistenza del LINURON 50 AMONN è relativamente breve (2-3 mesi) alle normali dosi di impiego e non vi sono pertanto pericoli di effeti residui per le colture che seguono la rotazione.

MODALITA' DI IMPIEGO:
Dosi per ettaro da distribuire in 400-600 litri di acqua.
Frumento, orzo, segale, avena, mais: applicare solo in pre-emergenza, durante o subito dopo la semina (2-3 giorni) alla dose di 2 Kg/ha. La dose può essere ridotta a Kg 1-1,5/ha in terreni leggeri, mentre dovrà essere aumentata fino a Kg 2,5 per ettaro, per terreni pesanti. Seminare il mais a profondità non inferiore a 5 cm e provvedere che sia ben ricoperto.
Patata: intervenire in pre-emergenza fra la semina e l'emergenza impiegando, secondo il tipo di terreno, la dose di Kg 1,5-3/ha.
Carota: in pre-emergenza della coltura e prima della germinazione dei relativi semi che devono essere ben coperti dal terreno, applicare, secondo il tipo di terreno, la dose di Kg 1-2,5/ha. In post-emergenza, quando le carote hanno differenziato il secondo palco fogliare (4 foglie vere) Kg 1,5-2/ha.
Sedano, finocchio, prezzemolo: in pre-emergenza per terreni di medio impasto, subito dopo la semina alla dose di Kg 1,5-2,5/ha, oppure in post-emergenza (escluso prezzemolo) dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto alla dose di Kg 1-2/ha.
Rapa: a partire da 8-10 giorni dal trapianto in pieno campo impiegare la dose di Kg 1,5-2/ha.
Fagiolo, fagiolino: in pre-emergenza o subito dopo la semina della coltura impiegare secondo il tipo di terreno la dose di Kg 0,8-1,5/ha.
Fragola: si impiega su tutta la superficie a partire dal secondo anno d'impianto, poco prima del risveglio vegetativo primaverile alla dose di Kg 1,5-2,5/ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Stemperare il prodotto in poca acqua aggiungendo poi la quantità di acqua necessaria agitando bene.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'
Il LINURON 50 AMONN non deve essere miscelato con insetticidi fungicidi e concimi.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri erbicidi deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto.
Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti - ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Bolzano, Via Piave 2

OFFICINA DI PRODUZIONE
AMONN FITOCHIMICA S.p.A. - Stabilimento di Bolzano - Via Siemens 12
Registrazione N. · del · del Ministero della Sanità.
DA NON VENDERSI SFUSO
Contenuto Kg 1

AMONN FITOCHIMICA SPA
BOLZANO, VIA PIAVE 2

5676

MESTHAN - 25

INSETTICIDA FOSFORGANICO

COMPOSIZIONE

— Metilparathion puro . . . . g. 25
— Coformulanti . . . . q. b. a g. 100

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.

CLASSE I

VELENO

NATURA DEI RISCHI D'INTOSSICAZIONE

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Evitare di respirarne i vapori. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (per esempio interrando in fosse profonde più di un metro e cospargendo di calce viva). In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.
Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti, 0.2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore.
Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.
Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.
Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.
Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO

Il MESTHAN - 25 è un insetticida fosforganico in polvere bagnabile che agisce per contatto, asfissia ed ingestione con un accentuato effetto citotropico. E' consigliato per il controllo di diversi insetti che attaccano numerose colture agricole.

DOSE E APPLICAZIONI

gr. 150 - 200 per q.le acqua contro:

Melo: Carpocapsa, forme mobili di Cocciniglia di S. Josè, Afide verde, A. lanigero, Tentredine, Antonomo, Uova svernanti di Afidi in genere, Cecidomia.

Pero: Psilla, Tingide, Tentredine, Cecidomia, Carpocapsa, forme mobili di Cocciniglia di S. Josè, Antonomo, Uova svernanti di Afidi in genere, Cocciniglia grigia.

Pesco - Ciliegio - Albicocco - Susino: Tentredine del susino, Tignola delle susine e albicocco, Anarsia del pesco, Tignola orientale del pesco, generazioni estive di Diaspis, Afide nero del susino e ciliegio.

Vite: Tignola e Tignoletta della vite, Tortrici, Sigaraio, Cocciniglia cotonosa, Eriofide, Pulvinaria.

Olivo: Tignola, Fleotribo, Cotonello, Cocciniglia mezzo grano di pepe, Fleotripide, Mosca.

Agrumi: Cocciniglia mezzo grano di pepe, Iceria purchasi, Tripidi, Afidi e Mosca.

Pioppo: Stilpnozia, Crisomela, Cimicetta, Afidi, Punteruolo, Saperda, Tarlovespa.

Orticoltura (Patata - Melanzana - Fava - Cavolo - Cavolfiore - Verza - Crucifere - Carciofo - Cipolla - Aglio - Porro - Carota): Afide nero della fava, Cavolaia e Mosca del cavolo, cavolfiore, verza e crucifere in genere; Mosca del carciofo, Punteruolo del cavolo, Tripide, Mosca, Afidi, Criocera e Tignola della cipolla, aglio e porro; Mosca della carota, Dorifora della patata e melanzana; Tignola della patata.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni insetticidi ed anticrittogamici; si devono escludere i preparati a reazione alcalina, come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta. In caso di miscela con olii minerali tale periodo è di 30 giorni.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 5676 del 23 12 82 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 1

5678

ENOTHION

INSETTICIDA A BASE DI MALATHION

COMPOSIZONE

— Malathion puro . .	. . g. 57
— Solventi ed emulsionanti (contiene Xilolo)	q. b. a g. 100

CLASSE III

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

NATURA DEI RISCHI D'INTOSSICAZIONE

Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Avvelenamento acuto per ingestione, inalazione e contatto cutaneo.

Sintomi di intossicazione

Lacrimazione, miosi, scialorrea, vomito, dolori addominali, diarrea, spasmi bronchiali, dispnea, bradicardia, ipotensione, fibrillazioni muscolari, convulsioni, edema polmonare.

Consigli terapeutici

In caso di evidente ipossia, con cianosi e dispnea, praticare subito respirazione artificiale controllata o assistita e ossigeno-terapia.

Nei casi gravi o sospetti gravi ricovero al centro di rianimazione. Iniezioni endovenose di solfato di atropina (1 - 2 mg. per gli adulti, 0.2 - 1 mg. per i bambini) ogni dieci minuti fino alla comparsa di fenomeni di spiccata atropinizzazione: una media atropinizzazione può essere continuata per 24 - 48 ore.

Associare pralidossima metil solfato (Contrathion) somministrata per iniezione endovenosa lenta.

Non somministrare l'atropina finchè è presente la cianosi.

Se vi è stato contatto cutaneo lavare la cute con sapone e soluzioni acquose di bicarbonato di sodio.

Controindicazioni: morfina, teofillina, aminofillina, coramina, latte, olio e grassi.

MODALITA' D'IMPIEGO

L'ENOTHION è un insetticida   che consente agli operatori agricoli di controllare diversi insetti.

DOSI E SETTORI APPLICATIVI

gr. 150 - 200 ogni 100 litri d'acqua contro:

Frumento, Mais e Cereali minori: Afidi, Cecidomie, Tripidi e Nottua gialla.

Erba medica, Trifoglio e foraggere in genere: Afidi, Apion, Misurino, Fitonomo.

Orticoltura: Criocera dell'**asparago**, Cavolaia, Nottua e Punteruolo del **cavolo, cavolfiore, verza e crucifere** in genere, Nottue del **carciofo, cardo, pisello, fava, fagiolo, insalata, indivia, scarola, radicchio, cetriolo, melone, cocomero e peperone.**

Melo e Pero: Afide verde, A. lanigero, Antonomo, Tentredini, Carpocapsa, Cocciniglia di S. Josè, Rinchite, Cacoecia, Pandemis.

Drupacee (Pesco, Susino, Ciliegio, Albicocco): Tignola orientale del pesco, Tentredini delle susine, Afide verde.

Mandorlo: Oplocampa, Afide.

Vite: Cicaline, Pulvinaria, Cocciniglia cotonosa, Sigaraio, Tignola e Tignoletta.

Agrumi (arancio, mandarino, limone, clementino, arancio amaro, bergamotto, cedro): Acaro delle meraviglie, Cimice verde, Afidi.

Olivo: Tignola, Fleotribo, Fleotripide.

Bietola da zucchero: Afide nero, Mosca.

Tabacco: Tripide, Cimice.

Patata e Pomodoro: Afidi.

Garofano in pieno campo: Bega verde, Tripide.

Piante forestali: Afidi, Bombice, Limantria, Processionaria.

Per la difesa delle derrate in magazzino:

Cereali e Leguminose da granella per il controllo di Calandre o Punteruoli, Tignole, Tenebrio, Tribolio, Struggigrano, Silvano, Cappuccino, Tonchi, Trogoderma impiegare Kg. 2,5 di ENOTHION in 100 litri d'acqua necessari per disinfestare 125 tonnellate di granella.

La distribuzione della soluzione viene eseguita al momento dell'immagazzinamento delle derrate cercando di ottenere la massima uniformità nella massa. Per utilizzare le derrate come alimento, sia umano che al bestiame, devono trascorrere almeno 30 giorni dal trattamento.

"Da non applicare con mezzi aerei".

Compatibilità: Il prodotto è miscibile con i più comuni insetticidi ed anticrittogamici, si devono escludere i preparati a reazione alcalina, come i polisolfuri e la poltiglia bordolese.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività: Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta. In caso di miscela con olii minerali tale periodo è di 30 giorni.

"Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi cosentiti; ogni altro uso è pericoloso".

"Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato".

ENOTRIA S.p.A. - Melilli (SR)

Officina di produzione: VISPLANT - CHIMIREN s.r.l. - Renazzo di Cento (FE)

Registrazione N. 5615 del 23.2.83 del Ministero della Sanità

DA NON VENDERSI SFUSO

Peso netto kg. 1

5690

(3266)

RONILAN 20

Fungicida particolarmente efficace contra la Botrite, Monilia e Sclerotinia.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Vinclozolin puro	g 20
Coformulanti q.b. a	g 100

Classe IV

NORME PRECAUZIONALI

— Conservare questo prodotto a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

— Non contaminare alimenti o bevande o corsi d'acqua.

— Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

— Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

RONILAN 20 è un fungicida organico ad azione preventiva e bloccante contro le principali forme di Botrite, Sclerotinia e Monilia.
Il RONILAN 20 è tollerato dalle piante e non conferisce alcun sapore ai raccolti.
RONILAN 20 è una formulazione che si presta per essere utilizzata sia diluita in acqua per trattamenti liquidi (irrorazione) sia miscelata con prodotti polverulenti per trattamenti a secco (polverizzazione).

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Vite: contro Botrite

350-450 g/100 l impiegando per la distribuzione almeno 1000 l di acqua per ettaro:
oppure 4-5 kg/ha per trattamenti a secco (polverizzazione) in miscela con zolfi ventilati (20-25 kg/ha) per la lotta contemporanea contro botrite e oidio.
Il numero di interventi è strettamente dipendente dalle condizioni climatiche. Possono essere richiesti 3 o 4 trattamenti da effettuare nelle seguenti epoche: fine fioritura, prima della chiusura del grappolo, inizio invaiatura, tre-quattro settimane prima della raccolta.
Il RONILAN 20 non influisce sulla fermentazione del mosto.

Fragola: contro Botrite

250-350 g/100 l impiegando per la distribuzione almeno 1000 l di acqua per ettaro.
Si interviene nei seguenti stadi vegetativi: pre-fioritura, prima fioritura e tre settimane prima della raccolta.

Drupacee (Mandorlo, Susino, Albicocco, Ciliegio e Pesco): contro Monilia

250-350 g/100 l. Agli stadi vegetativi: boccio florale appena visibile, inizio fioritura, piena fioritura: sei e quattro settimane prima della raccolta.

Insalate (Lattuga, Indivia e Radicchio): contro Sclerotinia e Botrite

200-250 g/100 l. Trattare iniziando dopo il trapianto quando le piantine hanno superato lo stadio di 6-8 foglie e ripetere eventualmente l'intervento. Distribuire il prodotto con almeno 1 l d'acqua per 10 mq.

Pomodori: contro Botrite

100-200 g/100 l. Trattare iniziando dopo la prima fioritura e ripetere l'intervento ad intervalli di 10-15 giorni.
Il volume d'acqua da impiegare è calcolato in funzione dello sviluppo e della fase fenologica della pianta in modo da distribuire: fino al 2° palco florale 600-800 l/ha e successivamente 1000-1500 l/ha di poltiglia.

Botrite e Marciume Bianco (Sclerotium) delle liliacee e iridacee: Aglio, Cipolla, Gladiolo e Tulipano in pieno campo

Aglio: 10-12 g di prodotto per kg di bulbilli (concia a secco).

Cipolla: 25 g di prodotto per kg di seme (concia a secco).

Bulbose da fiore: 700 g/100 l trattamento per immersione per circa 15'.

Botrite delle colture floricole in pieno campo: Gerbera, Ciclamino, Geranio

100-200 g/100 l. Trattamenti preventivi ripetuti.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Il RONILAN 20 è miscibile con i più comuni fungicidi attualmente in commercio come ad esempio il Polyram Combi, Kumulus S, Zolfi ventilati e prodotti rameici. Il RONILAN 20 è miscibile anche con i fertilizzanti fogliari Hakaphos e Basfoliar 34. Si sconsiglia di miscelare il prodotto a poltiglie fortemente alcaline.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Kg. 1

Distribuzione e vendita in Italia
BASF - Agritalia S.p.A. - Milano

Officina di produzione:
BASF Aktiengesellschaft
6700 Ludwigshafen/Rhein
(Germania Federale)

Reg. Min. San. N° .... **del** ....

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651090/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.